1 **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL**

2 **FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA**

3 **PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS**

4

5

6

7

8

9 **KARINE CASANOVA DA SILVA**

10

11

12

13

14 **SUPLEMENTAÇÃO COM GORDURA PROTEGIDA E TAXA DE PRENHEZ**
15 **DE BÚFALAS SUBMETIDAS À IATF**

16

17

18

19

20 **CAMPO GRANDE - MS**

21

2018

22

KARINE CASANOVA DA SILVA

23

24

25

26

27

28

29

30

SUPLEMENTAÇÃO COM GORDURA PROTEGIDA E TAXA DE PRENHEZ

31

DE BÚFALAS SUBMETIDAS À IATF

32

33

34

35

Exame de qualificação apresentado
ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Veterinárias como requisito
parcial para obtenção do título de
Mestre em Ciências Veterinárias.

36

37

38

39

40

41

42

Orientador: Prof. Dr. Ériklis Nogueira

43

44

45

CAMPO GRANDE – MS

46

2018

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

***“Plante seu jardim e decore sua alma, ao invés
de esperar que alguém lhe traga flores.”***

65

66

William Shakespeare

AGRADECIMENTOS

67

68

69

70 Agradeço primeiramente a Deus por me conceder o dom da vida, por me
71 orientar e me guiar em minhas horas difíceis, principalmente não deixando
72 desistir dos meus objetivos, colocando sempre ao meu lado pessoas do bem.

73 Aos meus pais **Adalício e Maria Lucia**, por me incentivarem a nunca desistir
74 de nada nessa vida. Embora distantes, sempre dando o apoio que lhes
75 cabiam,

76 A **Felipe Barbosa**, além de meu companheiro, também melhor amigo,
77 embora distante, sempre me apoiou e esteve presente em todos os
78 momentos. Muito obrigada pelos conselhos, pelas broncas e pela paciência.
79 Sempre esteve disposto a me ajudar, e a não me deixar desistir, pois foram
80 tantas às vezes em que tive vontade, meu muito obrigada.

81 À minha amiga **Nathalia Anache**, pois eu não sei o que seria dela sem mim
82 (rsrsrs brincadeira amiga). Sempre acordando cedo para me acompanhar
83 nas atividades e amando voltar para casa com cheirinho de búfala “rsrsrs”.
84 Obrigada pelos risos, e pelas broncas.

85 Aos meus **amigos e familiares**, que sempre estiveram presentes, me
86 incentivando e me apoiando sempre que possível.

87 Ao amigo e orientador Prof^o Dr^o **Érikliis Nogueira**, pela paciência, pelos
88 trabalhos, pela parceria e pela dedicação. Obrigada por mostrar como ser um
89 exemplo de profissional e ser humano. Sempre pronto a ajudar, mesmo
90 estando com pouco tempo, pois tem muitas obrigações. Foi embora pros
91 “States”, mas espero que retorne em breve. É muito importante a sua
92 presença para nós “desorientados”.

93 Ao meu tio e Msc. **Ailson Sebastião**, por sempre estar disposto a ajudar, nos
94 experimentos, no trabalho. Por me ensinar tudo que hoje sei, na prática, em
95 reprodução animal. Sempre dando oportunidade para quem quer realmente
96 aprender. Pois esta é sua paixão, sua vida, e é dela que vem seu sustento.

97 A prof^a Dr^a **Fabiana Sterza** e minha amiga **Mariane**, que sempre me
98 ajudaram no início dessa fase de Mestrado, nos experimentos, nas correrias
99 de abatedouros. Obrigada por ceder um pedacinho da vida de vocês para me
100 ajudar.

101 Obrigada aos colegas de Pós-Graduação: **Alexandre, Christopher** e
102 **Nathalia**, pelo auxílio nos trabalhos e experimentos. Pelas conversas sérias e
103 pelas risadas.

104 Ao Médico veterinário **André Caleffi**, proprietário da fazenda, por nos ceder
105 os animais, colocando funcionários e fazenda à disposição e por nos auxiliar
106 nos dias de manejo. Obrigada pelos queijos e mussarelas. Obrigada pela
107 confiança em nos deixar trabalhar em sua propriedade.

108 Aos integrantes do nosso Grupo de Pesquisa "**Vuco-Vuco**": **Alexandre,**
109 **Christopher, Ériklis, Jean, Nathalia e Witis**. Agora o grupo contém mais
110 integrantes, mas estes são a quem agradeço pela parceria e dedicação.

111 Ao **Fernando** (da secretaria), pela calma e paciência, com os mestrandos
112 desorientados que ligavam todos os dias e toda semana, para incomodar e
113 pedir alguma orientação. Obrigada por me socorrer várias vezes. Obrigada
114 por ser educado todas às vezes, tanto nas ligações quanto pessoalmente.
115 Parabéns por ser assim.

116 À EMBRAPA pelo apoio e financiamento de parte da pesquisa.

117 À KEMIN pelo apoio e financiamento de parte da pesquisa

118

119

SUMÁRIO

120

121

122	RESUMO	x
123	ABSTRACT.....	xi
124	1.INTRODUÇÃO.....	12
125	2.OBJETIVOS.....	13
126	2.1. Objetivo Geral.....	13
127	2.2. Objetivos Específicos.....	13
128	3.REVISÃO DE LITERATURA.....	13
129	3.1. Produção de leite de búfalas no Brasil.....	13
130	3.2. Fisiologia da reprodução da búfala e a Inseminação Artificial em Tempo Fixo	
131	– IATF.....	15
132	3.2.1. Anatomia dos ovários	15
133	3.2.2. Foliculogênese.....	15
134	3.2.3. Dinâmica Folicular.....	16
135	3.2.4. Ciclo estral.....	17
136	3.3 Efeito da suplementação de gordura sobre a IATF, produção e qualidade do	
137	leite.....	19
138	3.3.1 Gordura Protegida	19
139	3.3.2 Óleo de palma	20
140	3.3.3 Inseminação Artificial em Tempo Fixo.....	21
141	3.3.4. EnerFAT®	21
142	4.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	25
143	CAPÍTULO 1.....	30

144	Abstract	30
145	Resumo	31
146	Introdução.....	32
147	Material e Métodos	33
148	Local de realização do experimento.....	33
149	Animais	33
150	Protocolo para IATF	33
151	Coleta e análise dos parâmetros sanguíneos.....	34
152	Diagnóstico de Gestação.....	35
153	Coleta e análise do leite.....	35
154	Análise estatística	35
155	Resultados	35
156	Discussão.....	38
157	Conclusão.....	42
158	Agradecimentos.....	42
159	Referências.....	43
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		

168

169

170

LISTA DE TABELAS

171

172

173 Tabela 1. Diferenças anatômicas e fisiológicas entre a búfala e a
174 vaca..... 18

175 Tabela 2. Ácido graxo presente no óleo de palma..... 22

176 Tabela 3. Ácidos graxos que compõem o EnerFAT (Kemin®)..... 25

177

178 **CAPÍTULO 1**

179 Figura 1. Programação e execução do experimento..... 40

180 Tabela 1. Taxa de prenhez entre os grupos Gordura e Controle na IATF e
181 Ressincronização..... 41

182 Tabela 2. Efeito do tratamento em relação a parâmetros produtivos e
183 metabólicos sanguíneos de búfalas em lactação..... 43

184 Tabela 3: Efeito do tratamento em relação aos parâmetros produtivos do
185 leite de búfalas em lactação..... 46

186

187

188

189

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

C E R T I F I C A D O

Certificamos que a proposta intitulada "Suplementação com gordura protegida nas taxas de prenhez de búfalas submetidas a protocolos hormonais com benzoato de estradiol e progesterona", registrada com o nº 883/2017, sob a responsabilidade de **Ériklis Nogueira** - que envolve a utilização de animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata, para fins de pesquisa científica – encontra-se de acordo com os preceitos da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS/CEUA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/UFMS, na 7ª reunião ordinária do dia 15/08/2017.

FINALIDADE	() Ensino (x) Pesquisa Científica
Vigência da autorização	1º/09/2017 a 1º/12/2019
Espécie/Linhagem/Raça	<i>Bubalus bubalis</i> / Murrah
Nº de animais	80
Peso/Idade	03 a 08 anos / 593kg
Sexo	Fêmea
Origem	Fazenda Ouro Negro/MS

Joice Stein

Vice-coordenadora da CEUA/UFMS
Campo Grande, 15 de agosto de 2017.

Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA
<http://www.propp.ufms.br/ceua>
ceua.2000@gmail.com
fone (67) 3345-7925

191 **RESUMO**

192 Foram avaliados os efeitos da suplementação com fonte de gordura protegida
193 no rúmen (GPR) (óleo de palma - EnerFAT[®]) em búfalas leiteiras, sobre as
194 taxas de prenhez à IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo), parâmetros
195 metabólicos, produção e composição do leite. O experimento foi realizado em
196 propriedade comercial, produtora de leite de búfalas e derivados, e foram
197 selecionadas 80 búfalas lactantes, dispostas em dois grupos experimentais,
198 Grupo Gordura que recebeu suplementação com EnerFAT[®], (GG - 150 g de
199 EnerFAT[®]/dia), e Grupo Controle (GC) (0 g EnerFAT[®]). As búfalas foram
200 submetidas a protocolos de IATF (P4 e BE), com ressincronização e nova IATF
201 após o diagnóstico de gestação por ultrassonografia, realizado 30 dias após. A
202 taxa de prenhez para a primeira IATF foi de 62,2% (23/37) para Grupo Gordura
203 e 51,2% (22/43) para Grupo Controle (P= 0,4171). Na ressincronização, a taxa
204 de prenhez no Grupo Gordura foi de 55,6% (5/9) e a taxa de prenhez do Grupo
205 Controle foi de 66.7% (8/12). A taxa de prenhez final foi 60.9% e 54.5%
206 (P=0,6484), respectivamente para GG e GC. Não houve diferença estatística
207 da pesagem de leite corrigida para 4% de gordura aos 30 (P= 0,5811), 60 dias
208 (P= 0,8461) e aos 90 dias de lactação (P=0,8631). Não houve diferença
209 entre os níveis de concentração de albumina (P= 0,07) e colesterol total (P=
210 0,36). Porém, houve diferença entre os grupos em relação a concentração de
211 ureia (P<0.0001) e glicose (P= 0,03). Em relação à composição do leite, não
212 houve diferença significativa nos parâmetros gordura, sólidos não gordurosos,
213 densidade, proteína, lactose e pH, de acordo com os tratamentos (P>0,05). A
214 suplementação com gordura protegida, fornecida diariamente na quantidade de
215 150g/animal, não apresentou efeito significativo nas taxas de prenhez e
216 produção de leite de búfalas.

217 Palavras-chave: EnerFAT[®], IATF, leite, ressincronização.

218

219

220

221

222

223

224

225 **ABSTRACT**

226

227 The effects of supplementation with rumen fat source (GPR) (palm oil -
228 EnerFAT ®) for dairy buffaloes, on pregnancy rates for IATF (Fixed Time
229 Artificial Insemination), metabolic parameters, milk. The experiment was carried
230 out on commercial property, producing milk and derivatives of buffaloes. A total
231 of 80 suckling buffaloes were selected from two experimental groups,
232 supplemented with EnerFAT ®, Fat Group (GG - 150 g EnerFAT ® / day), and
233 Control Group (CG) (0 g EnerFAT). The buffaloes were submitted to IATF
234 protocols (P4 and BE), with resynchronization and new IATF after the diagnosis
235 of gestation by ultrasonography, performed 30 days later. The pregnancy rate
236 for the first IATF was 62.2% (23/37) for Fat Group and 51.2% (22/43) for
237 Control Group ($P = 0.4171$). At resynchronization, the pregnancy rate in the Fat
238 Group was 55.6% (5/9) and the pregnancy rate of the Control Group was 66.7%
239 (8/12). The final pregnancy rate was 60.9% and 54.5% ($P = 0.6484$),
240 respectively for GG and GC. There was no statistically significant difference in
241 milk weighing at 4% fat at 30 days of lactation ($P = 0.5811$) at 60 days ($P =$
242 0.8461) and at 90 days ($P = 0.8631$). There was no difference between levels of
243 albumin concentration ($P = 0.07$) and total cholesterol ($P = 0.36$). However,
244 there was difference between the groups in relation to the concentration of urea
245 ($P < 0.0001$) and glucose ($P = 0.03$). Regarding the composition of the milk,
246 there was no significant difference in the parameters fat, non-greasy solids,
247 density, protein, lactose and pH, according to the treatments. Supplementation
248 with protected fat, provided daily in the amount of 150 g / animal, did not
249 present a significant effect on the rates of pregnancy and milk production of
250 buffaloes.

251

252 Key words: EnerFAT®, FTAI, milk, resynchronization

253

254

255

256

257

258

259

260 1. INTRODUÇÃO

261 A adição de fontes de gordura protegida vem sendo amplamente estudada, uma
262 vez que o principal objetivo da sua utilização é aumentar o fornecimento de energia ao
263 animal. O aumento do fornecimento de energia está diretamente relacionado às respostas
264 produtivas e reprodutivas dos animais. A origem da gordura pode influenciar nessas
265 respostas, mediante seus efeitos sobre ingestão de alimentos, fermentação ruminal e
266 digestão dos nutrientes.

267 A inclusão de lipídeos insolúveis, além de aumentar a densidade calórica da dieta
268 sem comprometimento da degradação da fibra, possibilita maior ingestão e melhor
269 eficiência de utilização da energia (KRONFELD et al., 1980). Pode-se adicionar a gordura
270 em até 3% da ração total, porém, 5%, é considerado o limite benéfico em rebanhos de
271 alta produção (SCHAUFF et al., 1992).

272 Em bubalinos poucos trabalhos apresentam relação com o auxílio da adição de
273 suplementação para melhoria dos índices de taxa de prenhez, juntamente com o aumento
274 de produção e qualidade do leite. A introdução de gordura na dieta das búfalas pode ser
275 uma alternativa para melhorar estes parâmetros. Esta gordura pode ser manufaturada em
276 forma de gordura protegida ruminal (GPR), para ter pouco ou nenhum efeito na
277 fermentação do rúmen (SARTORI; MOLLO, 2007), como exemplo, sais de cálcio de óleo
278 de palma, que contém ácidos graxos saturados de cadeia longa, como o ácido palmítico
279 (óleo de palma) e, insaturados como o linoleico e linolênico. Assim, a suplementação da
280 dieta com GPR ajuda a repor os ácidos graxos importantes no desempenho reprodutivo.

281 Em vacas de alta produção leiteira diversos estudos têm apresentado efeitos
282 benéficos na adição de fontes lipídicas na dieta desses animais, com aumento na
283 produtividade do rebanho, como aumento na quantidade de leite produzido por dia,
284 aumento na concentração de gordura no leite, melhoria no metabolismo e produção de
285 hormônios da reprodução, como a prostaglandina e progesterona.

286 Uma das fontes desse ácido graxo é o Enerfat[®], um suplemento energético composto
287 por sais de cálcio de ácidos graxos derivados de óleo de palma, protegido da ação
288 ruminal e não apresenta impacto negativo sobre a microbiota ruminal. Possui baixo índice
289 de dissociação ruminal (biohidrogenação), não interfere na digestibilidade da fibra, possui

290 alta concentração de ácido palmítico, é palatável, de fácil manuseio e, devido ao seu
291 formato granular pode ser fornecido juntamente com ração de consumo diário dos animais
292 (KEMIN[®], 2017).

293 Uma vez que poucos estudos têm sido conduzidos com bubalinos neste sentido, a
294 presente pesquisa objetivou o estudo dos efeitos da suplementação lipídica com gordura
295 protegida (óleo de palma – Enerfat[®]), sobre os parâmetros produtivos e taxas de prenhez
296 na IATF de búfalas da raça Murrah em lactação.

297 **2. OBJETIVOS**

298

299 **2.1. Objetivo Geral**

300

301 O objetivo deste projeto foi avaliar os efeitos da suplementação com fonte de
302 gordura protegida no rúmen (GPR) (óleo de palma – Enerfat[®]), sobre a produção de leite
303 e taxa de prenhez à IATF, de búfalas leiteiras em lactação.

304

305 **2.2. Objetivos Específicos**

306

- 307 ● Avaliar a taxa de prenhez à IATF de búfalas suplementadas com GPR.
- 308 ● Avaliar os níveis séricos de albumina, colesterol, glicose, e ureia de búfalas
309 leiteiras, suplementadas com GPR.
- 310 ● Avaliar o efeito da suplementação com GPR sobre a produção e características
311 físico-químicas do leite.

312

313

314 **3. REVISÃO DE LITERATURA**

315

316 **3.1. Produção de leite de búfalas no Brasil**

317

318 O leite de búfala tem características físico-químicas particulares como, por
319 exemplo, teores de matéria seca, gordura e caseína, 41,1; 88,5 e 47,7% superiores,
320 respectivamente, ao do leite bovino. A industrialização possibilita o desenvolvimento de
321 produtos como a mozzarella italiana, provolone, ricota, entre outros produtos com
322 características diferentes aos oriundos do leite bovino (JORGE et al., 2002). Outra
323 vantagem do leite de búfala é o maior rendimento na fabricação de derivados, por
324 apresentar elevados teores de proteína, gordura e sólidos totais. Com o crescimento
325 desse setor, há necessidade de estudos de novas alternativas para melhorar a produção
326 leiteira das búfalas (ANDRIGHETTO et al., 2005).

327 Características marcantes do leite de búfala são a sua coloração totalmente
328 branca, devido à ausência total de pigmentos carotenóides, o que também confere
329 coloração branca à manteiga e ao queijo produzido e, o sabor levemente adocicado
330 (TEIXEIRA et al., 2005). O leite das búfalas é cerca de 40-50% mais produtivo na
331 elaboração de derivados (queijos, iogurte, doce de leite, etc.) que o leite bovino (SILVA et
332 al., 2003). Uma série de fatores pode influenciar a produção e a composição do leite,
333 como a genética dos animais, manejo, nutrição e condições climáticas, os quais
334 promovem variações na produtividade dos rebanhos bubalinos (LAMONTAGNA;
335 FRANZOLIN, 2009).

336 Entre as primeiras 8 a 12 semanas de lactação, os animais estão em balanço
337 energético negativo (BEN), pois a ingestão de energia é insuficiente para atender aos
338 requisitos de manutenção. Para superar o BEN, a densidade de energia da dieta deve ser
339 aumentada com grãos. No entanto, isso geralmente causa fermentação ruminal
340 indesejável e deprime a síntese de gordura do leite. A gordura protegida, no entanto,
341 tende a aumentar a densidade de energia da dieta sem causar impactos negativos na
342 fermentação do rúmen associada à alimentação excessiva de grãos e concentrados
343 (MARKUS et al., 1996).

344

345 **3.2. Fisiologia da reprodução da búfala e a Inseminação Artificial em Tempo** 346 **Fixo - IATF**

347 **3.2.1. Anatomia dos ovários**

348 Os ovários apresentam, em média, comprimento de 25 a 30 mm e largura de 14
349 mm (SIQUEIRA et al., 2009), são sólidos, ovoides e sua superfície apresenta-se irregular
350 em virtude da projeção dos folículos e corpos lúteos. A porção cranial de cada ovário une-
351 se ao ligamento largo do útero pelo mesovário. Além da diferença macroscópica de
352 tamanho e peso, sendo menor que os de bovinos, os ovários das búfalas são mais
353 alongados e mais firmemente seguros pelo mesovário (CARVALHO, 2006; FERRAZ,
354 2008). Segundo Carvalho (2006), as novilhas bubalinas apresentam um reduzido número
355 de folículos primordiais e maior taxa de atresia folicular, em relação aos ovários de
356 bovinos.

357 O corpo lúteo (CL) das búfalas é profundamente incorporado ao estroma ovariano,
358 sendo seus valores máximos para peso (2,3 g) e diâmetro (15,0 mm) menores que em
359 bovinos. A distribuição da ovulação entre o ovário esquerdo (51,2%) e direito (48,8%) é de
360 ocorrência similar, o qual é indicado pela presença do CL (FERRAZ, 2008).

361 A avaliação do CL fornece informações importantes sobre o estado reprodutivo da
362 fêmea e possibilita a adequação de procedimentos de manipulação ou sincronização do
363 ciclo estral. O CL, quando presente no ovário de búfalas, ocupa uma grande área do
364 ovário, restando menos tecido ovariano para o desenvolvimento folicular, fator
365 responsável pelo desenvolvimento de menos folículos superficiais em búfalas gestantes
366 (SIQUEIRA et al., 2009).

367 **3.2.2 Foliculogênese**

368 A vida útil reprodutiva das fêmeas de mamíferos é determinada antes do
369 nascimento (PEPLING, 2012), pois é durante a vida fetal que são formados todos os
370 folículos primordiais.

371 É de fundamental importância estudar a foliculogênese em bubalinos, sendo os
372 folículos ovarianos de menor qualidade e quantidade, assim apresentando uma resposta

373 insatisfatória às biotecnologias reprodutivas de Superovulação – Transferência de
374 Embrião (SOV-TE) e Aspiração Folicular – Produção de Embriões *in vitro* (OPU-PIVE)
375 (GIMENEZ, 2010).

376 Os fatores responsáveis pelo início do crescimento folicular são desconhecidos e
377 representam um dos enigmas da biologia ovariana (FERRAZ, 2008). Porém, sabe-se que
378 após a maturidade sexual, folículos primordiais são selecionados e começam a crescer
379 por um processo conhecido como ativação folicular. Alguns desses folículos ativados,
380 eventualmente, morrem por um processo denominado atresia folicular e os que
381 sobrevivem são designados à ovulação (PEPLING, 2012).

382 Os ovários dos bubalinos apresentam menor quantidade de folículos primordiais e
383 maior taxa de atresia folicular quando comparamos aos ovários dos bovinos (DANELL,
384 1987; LE VAN TY et al., 1989; FERRAZ, 2008). São encontrados, em novilhas bubalinas
385 cíclicas cerca de 10 mil folículos primordiais, já em fêmeas não cíclicas 12 mil. Sendo este
386 menor em relação aos encontrados em bovinos na mesma faixa etária, que é de
387 aproximadamente 150 mil (VALE e RIBEIRO, 2005).

388 Estruturalmente o folículo pré-antral de búfalos é semelhante ao estudado em
389 outros mamíferos, contendo algumas características espécie-específicas, como a
390 quantidade de vesículas citoplasmáticas, o formato e o conteúdo interno das
391 mitocôndrias, o desenvolvimento da zona pelúcida e a junção das células da granulosa
392 com o oócito (SIQUEIRA, 2009).

393 **3.2.3 Dinâmica folicular**

394 Os primeiros trabalhos relacionados ao crescimento folicular em bubalinos foram
395 realizados em 1984, onde os pesquisadores observaram a presença de estruturas
396 ovarianas durante o ciclo estral em novilhas da raça Surti. Os autores constataram que
397 65,4% das novilhas cíclicas apresentavam folículos maiores que 8,0 mm no meio do ciclo,
398 entre o 9º e o 13º dia. Outros registros de dinâmica folicular demonstram que esta espécie
399 apresenta desenvolvimento ovariano semelhante aos bovinos, apesar de o número de
400 folículos recrutados por onda de crescimento folicular ser menor em búfalas do que em
401 fêmeas bovinas (FERRAZ, 2008; SIQUEIRA et al., 2009).

402 Vários trabalhos realizados com o intuito de desvendar os padrões de ondas dos
403 bubalinos, foram feitos e descobriu-se que o desenvolvimento folicular ocorre num padrão
404 de ondas, similar aos bovinos. Sendo em maior ocorrência o padrão de duas ondas
405 foliculares, porém, também foram identificados padrões de 1 a 3 ondas.

406

407 **3.2.4 Ciclo estral**

408 A busca dos profissionais em melhorar a eficiência reprodutiva em búfalas está
409 diretamente relacionada com a sua produtividade, sendo atribuída a interações entre o
410 genótipo e o meio ambiente, incluindo-se o clima, o manejo, a nutrição e as doenças
411 (FILHO et al., 2009). Dentre os fatores relacionados a esse desempenho reprodutivo
412 estão maturidade tardia inerente, pobre expressão de cio no verão, padrão reprodutivo
413 sazonal e intervalo entre partos prolongado. A baixa detecção de cio é o fator que mais se
414 destaca, já que as fêmeas apresentam sintomatologia discreta e há necessidade de mão
415 de obra capacitada (ou técnico) para sua identificação.

416 A grande variação da duração do estro dos bubalinos torna o manejo de sua
417 detecção mais trabalhoso e dificulta o emprego da inseminação artificial. Baruselli (1994)
418 verificou duração média de $14,7 \pm 7,3$ horas, com a ovulação ocorrendo $16,9 \pm 6,5$ horas
419 após o final do cio. Pode-se dizer que os búfalos são poliéstricos estacionais de dias
420 curtos, semelhante aos ovinos e caprinos. Devido a esta característica, no centro-sul do
421 país, onde existe variação anual na duração de horas de luz conforme a estação do ano é
422 observada uma concentração maior das manifestações de cio no período do outono
423 (PEREIRA et al., 2007).

424 Semelhante aos bovinos, o ciclo estral da búfala apresenta quatro fases distintas:
425 pró-estro, estro, metaestro e diestro. Entretanto, a expressividade dos sinais clínicos,
426 dentro das diferentes fases, difere em alguns aspectos daqueles expressos pela vaca
427 taurina e zebuína (VALE e RIBEIRO, 2005). Algumas características anatômicas e
428 fisiológicas estão listadas na tabela 1 e, podendo nos proporcionar conhecimento entre as
429 semelhanças e diferenças entre as espécies.

430 Tabela 1. Diferenças anatômicas e fisiológicas da reprodução, entre a búfala e a vaca.

Característica	Vaca (Bos taurus)	Búfala (Bubalus)
Ovário	Comprimento = 3,5 - 4,5 cm Largura = 2,5 cm Peso = 15 - 20g	Comprimento = 2,5 - 3,0 cm Largura = 1,4 cm Peso = 4,6g
Corpo Lúteo	Amarelo claro, projetando-se até o meio do ciclo para a superfície do ovário	Marrom/avermelhado, profundamente incorporado ao estroma ovariano. Difícil proeminência
Tuba uterina	Comprimento = 25 - 26 cm.	C = 19 - 24 cm.
Cornos uterinos	Rígidos e tortuosos; tônus na fase estrogênica.	Mais rígidos e tortuosos que nos bovinos; maior tônus na fase estrogênica.
Corpo do útero	Comprimento = 6,35 - 12,70 cm.	Comprimento = 5,3 - 8,0 cm
Cérvix	Muscular e tortuosa, 2 - 4 anéis cervicais, abertos durante o estro.	Menor e com mais anéis cervicais 3 - 5, que mesmos no estro são de difícil dilatação.
Tipo de placenta	Cotiledonária, epitélio corial.	Cotiledonária, epitélio corial.
Folículos primordiais	100 mil	12 mil
Duração do ciclo	20 - 24 dias (média= 21 dias).	20 - 24 dias. Depende da raça e do manejo.
Duração do estro	12,5 - 27,8 horas	14,7 ± 7,3 horas
Sinais do estro	Pronunciados, atividade homossexual intensa, deixa-se montar, descarga de muco límpido	Menos pronunciados, pouca atividade homossexual, pouca descarga de muco; forte contratilidade uterina.
Período de gestação	265 - 280 dias.	Depende da raça; Carabao 325 - 335 dias; Murrah e outras 293 - 318 dias.
Perfil endócrino		
Progesterona na fase luteínica	6,0 - 7,0 ng/ml.	Carabao 1,5 - 2,6 ng/ml Murrah 2,6 - 6,0 ng/ml.
17β-Estradiol na fase folicular	25 - 30 pg/ml.	Carabao 8 - 10 pg/ml Murrah 30 - 32 pg/ml.
LH	Ondas pulsáteis, fase luteínica: 0,3 - 1,8 ng/ml; meio do ciclo: 1,2 - 7,0 ng/ml, início do cio 15 - 65 ng/ml	Ondas pulsáteis ainda não estabelecidas. Níveis basais durante o ciclo 0,72 - 2,0 ng/ml, no início do cio

FSH	Ondas pulsáteis irregulares durante o ciclo (entre 10 - 400ng/ml), com a secreção máxima de 78 – 600 ng/ml no estro	Onda pulsátil média de 12,0 ng/ml, com valor máximo de 60ng/ml no dia do estro
------------	---	--

431 Fonte: Adaptado de Vale e Ribeiro, 2005.

432

433 **3.3 Efeito da suplementação de gordura sobre a IATF, produção e** 434 **qualidade do leite**

435 Os efeitos da suplementação lipídica devem ser melhores estudados, por termos
436 poucos trabalhos aplicados nesta área em bubalinos. A suplementação com sais de cálcio
437 de ácidos graxos de cadeia longa é um bom método para aumentar a densidade de
438 energia da dieta para melhorar a produção e reprodução destes animais (PIRES e
439 GRUMMER, 2008).

440 **3.3.1 Gordura Protegida**

441 Podemos definir a gordura protegida como ácidos graxos de cadeia longa
442 (saturados ou insaturados) que reagem com sais de cálcio unidos na forma de um sal e,
443 forma o sabão de cálcio. Os sabões de cálcio por serem produtos altamente estáveis em
444 água e temperatura, são digeridos no organismo animal em meio ácido. No rúmen o meio
445 é apenas ligeiramente ácido o que faz com que ele permaneça inalterado e, quando
446 chega ao abomaso, o meio torna-se extremamente ácido ocorrendo desdobramento do
447 sabão cálcico com liberação para o intestino de ácidos graxos e íons de cálcio que serão
448 absorvidos pela corrente sanguínea (PIZZUTI, 2011).

449 Como sua dissociação completa ocorre apenas nas condições ácidas do abomaso,
450 ocorre o aumento na densidade energética da dieta sem afetar a utilização da forragem.
451 Com isso pode-se pensar que a utilização desta fonte alternativa de energia, na dieta de
452 ruminantes, pode melhorar as características reprodutivas e produtivas (FERREIRA et al.,
453 2009).

454 Podem ocorrer variações nas concentrações dos ácidos graxos presentes na
455 gordura protegida, sendo modificadas de acordo com os fabricantes. A gordura protegida

456 apresenta aproximadamente 6,52Mcal/kg de Energia Bruta, o que corresponde a um valor
457 três vezes maior que a energia do milho, fato que explica a utilização deste insumo ser
458 feita em níveis baixos e de forma estratégica (FRANCO, 2007).

459 Segundo Hess et al. (2008), o objetivo primário da utilização de suplementação
460 com gordura é aumentar o fornecimento de energia ao animal, a origem da gordura pode
461 influenciar a resposta produtiva, mediante seus efeitos sobre ingestão de alimentos,
462 fermentação ruminal e digestão dos nutrientes. A inclusão de lipídeos insolúveis, além de
463 aumentar a densidade calórica da dieta sem comprometimento da degradação da fibra,
464 possibilita maior ingestão e melhor eficiência de utilização da energia (KRONFELD et al.,
465 1980). Pode-se adicionar a gordura em até 3% da ração total, porém, 5%, é considerado
466 o limite benéfico em rebanhos de alta produção (SCHAUFF et al., 1992).

467 Devido ao processo de biohidrogenação presente no rúmen, a maior parte dos
468 ácidos graxos de cadeia longa, incorporados por bactérias e protozoários é do tipo
469 saturado (MARQUES, 2003; MEDEIROS et al., 2015). Há diversas formas de incorporar
470 ácidos graxos na dieta dos ruminantes, com isso diversos óleos podem ser utilizados na
471 forma de gordura protegida, dentre eles, o óleo de palma (óleo de dendê), sendo obtido
472 da polpa do fruto do dendezeiro. O óleo de palma possui aproximadamente 50% de
473 ácidos graxos saturados e 50% de ácidos graxos insaturados, sendo rico em
474 carotenóides, vitamina E e antioxidantes (CESCO et al., 2013).

475 **3.3.2 Óleo de palma**

476 O teor de ácidos graxos encontrados em sementes oleaginosas varia de 18 % a
477 40 %, e a maior parte dos lipídios encontrados em plantas é do tipo insaturado. Na
478 maioria dos cereais e oleaginosas há predominância de ácido linoleico (18:2 n - 6) e, no
479 caso de óleo de palma, há uma predominância de ácido palmítico, oléico e linoléico
480 (PALMQUIST; MATTOS, 2006).

481 A espécie de palma (*Elaeis guineensis* Jacq.) é a cultura mais produtiva de óleo em
482 todo o mundo, resultando em uma média de 5 t de óleo vegetal por hectare, superando as
483 demais oleaginosas cultivadas (SANTOS, 2008). De acordo com United States
484 Departamento of Agriculture (2014), a produção de óleo vegetal no mundo na safra
485 2014/2015 foi de 62,35 milhões de toneladas (BRASIL, 2013).

486 Segundo Cottrell (1991) e Sambanthamurthi et al. (2000), o óleo de palma contém
 487 aproximadamente 50 % de ácidos graxos saturados, com 44 % de ácido palmítico (C16 :
 488 0) , 5 % de ácido esteárico (C18 : 0). Assim como apresentado na Tabela 2, descrita por
 489 Santos e D'ávila (1998). Os ácidos graxos insaturados são cerca de 40 % de ácido oleico
 490 (C18 : 1) e 10 % de ácido linoleico poliinsaturado (C18 : 2) e ácido linolênico (C18 : 3)
 491 (COTTRELL, 1991; SAMBANTHAMURTHI et al., 2000).

492 Tabela 2. Ácido graxo presente no óleo de palma.

Ácido Graxo	m%
<i>Insaturados</i>	
Ácido oleico (18:1)	39,0
Ácido linoleico (18:2)	10,5
Ácido palmitoléico (16:1)	0,1
<i>Saturados</i>	
Ácido palmítico (16:0)	44,3
Ácido esteárico (18:0)	4,6
Ácido mirístico (14:0)	1
Ácido láurico (12:0)	0,1
Outros	0,4

493 Santos e D'Ávila 1998

494

495 3.3.3 Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF)

496 Em bubalinos, desde o final da década de noventa, foram realizadas pesquisas
 497 com o objetivo de avaliar a eficácia de diferentes protocolos de sincronização da ovulação
 498 para IATF. Os dados são indicativos de que é possível obter resultados satisfatórios com
 499 o emprego dessa tecnologia. Porém, a estacionalidade reprodutiva pode interferir na
 500 eficiência dos protocolos de IATF. Durante a estação reprodutiva (outono e inverno), em

501 rebanhos com alta taxa de ciclicidade, nota-se que as búfalas respondem adequadamente
502 ao protocolo Ovsynch (GnRH/PGF₂α/GnRH)(BARUSELLI et al., 2009).

503 A inseminação artificial, de maneira geral, visa à melhoria da qualidade e
504 quantidade da produção de carne e leite da espécie. Além de apresentar vantagens
505 como, maior aproveitamento de reprodutores que apresentam características
506 melhoradoras, aumento do número de proles podendo produzir 5000 ou mais
507 produtos/ano, facilitar a seleção genética do rebanho, controlar todo o rebanho e
508 determinar os índices de fecundação, natalidade, eficiência reprodutiva, número de
509 serviços por concepção e eliminar animais com fertilidade inferior à do rebanho. Porém,
510 possui algumas limitações, como, a exigência de profissionais habilitados, inseminador
511 capacitado e responsável, com conhecimento anatomo-fisiológico dos bubalinos. Também
512 há necessidade de um manejo adequado, com boa alimentação e mineralização correta
513 (BARUSELLI, et al. 1993). Após a IA, as búfalas apresentam satisfatórias taxas de
514 concepção (em torno de 50%), semelhantes àquelas obtidas em fêmeas bovinas
515 submetidas à IATF (CARVALHO et al., 2011).

516 Baruselli et al. (2009), em um estudo de sincronização da ovulação durante as
517 estações favoráveis e desfavoráveis para reprodução, avaliaram a eficiência do protocolo
518 Ovsynch na sincronização da ovulação para IATF em búfalas e, concluíram que este
519 protocolo tem apresentado aceitáveis taxas de prenhez à IATF em búfalas ciclando
520 durante a estação reprodutiva favorável. Além dessa possibilidade, tratamentos com
521 progesterona/progestágeno em associação ao benzoato de estradiol, eCG e GnRH
522 possibilitam a utilização da IATF durante a estação reprodutiva desfavorável,
523 proporcionando o retorno à atividade reprodutiva de búfalas em anestro. Atualmente,
524 existe tecnologia para o emprego da IATF durante o ano todo, garantindo satisfatórias
525 taxas de concepção e distribuição das parições, conforme a demanda do mercado.

526 Em um estudo envolvendo vacas holandesas em uma leiteria comercial na Flórida,
527 suplementadas com gordura enriquecida com sais de cálcio (óleo de peixe) (1,5% da MS
528 da dieta) a partir do 30 dias pós-parto, apresentaram melhores taxas de prenhez aos 60
529 dias pós-IA quando comparadas à vacas alimentadas com um sal de cálcio de óleo de
530 palma (53 vs. 46%), ajustadas para duas IATFs (SILVESTRE et al., 2008).

531 Petit e Twagiramungu (2006), em um experimento buscando determinar os efeitos
532 da suplementação de gordura na ciclicidade, concentração de progesterona,
533 desenvolvimento folicular, taxa de concepção, mortalidade embrionária e concentrações
534 plasmáticas de prostaglandina F metabólito (PGFM) em bovinos, utilizaram 138 vacas,
535 divididas em 3 grupos, suplementadas com as bases de linhaça (FLA), Megalac (MEG) ou
536 soja micronizados (soja). As taxas de concepção foram semelhantes entre os
537 tratamentos. Entretanto, a mortalidade embrionária total foi menor para vacas alimentadas
538 com FLA (0%) em comparação com aqueles alimentados com MEG (15,4%) ou soja
539 (8,0%). O tamanho médio do CL medido durante um ciclo estral completo foi menor para
540 as vacas alimentadas com soja (16.3 mm) em comparação com aqueles alimentados com
541 FLA (19.1 mm), ou MEG (18,3 mm). Concluindo, assim, que a perda de gestação pode
542 ser reduzida pela alimentação de linhaça como resultado dos seus efeitos sobre
543 diferentes fatores, tais como a modulação da concentração de progesterona e tamanho
544 do CL.

545 **3.3.4 EnerFAT®**

546 Enerfat® é um suplemento energético composto por sais de cálcio de ácidos
547 graxos derivados de óleo de palma (Tabela 3), protegido da ação ruminal e não apresenta
548 impacto negativo sobre a microbiota ruminal. As gorduras que não estão protegidas
549 causam alterações físicas e químicas na fermentação microbiana dos alimentos que são
550 geralmente negativas e a alimentação de gordura livre ou desprotegida acima do nível de
551 1% tem um efeito deprimente sobre a atividade microbiana celulolítica do rúmen
552 (PALMQUIST, 1991).

553 Esse suplemento possui baixo índice de dissociação ruminal (biohidrogenação),
554 não interfere na digestibilidade da fibra, possui maior concentração de ácido palmítico do
555 mercado, é palatável (possui aromatizantes), de fácil manuseio e, devido ao seu formato
556 granular e pode ser fornecido juntamente com ração diária dos animais (KEMIN, 2017).

557 Os benefícios deste produto, de acordo com o fabricante (KEMIN, 2017), é o
558 aumento na densidade energética da dieta, aumento na produção de leite e leite corrigido
559 para gordura, além de promover a melhoria de eficiência alimentar.

560 Tabela 3. Ácidos graxos que compõem o EnerFAT (Kemin®)

Acido Graxo	EnerFAT
Palmítico (16:0)	48 – 52,2
Esteárico (18:0)	3,9
Oleico (18:1)	30,8
Linoleico (18:2)	6,6
Linolênico (18:3)	-

561

562 Em busca de alcançar melhores resultados, faz-se necessário o conhecimento da
563 importância que a nutrição tem sobre os parâmetros produtivos e reprodutivos dos
564 animais. Essa busca incansável por produtores e pesquisadores, vem de longa data.
565 Entretanto, estudos têm trazido novas perspectivas e informações mais detalhadas desta
566 relação, permitindo um ajuste fino nas manipulações de dietas com o propósito de
567 aumentar a produção e a reprodução em ruminantes. Apesar disso, ainda há sérios
568 problemas de fertilidade de ordem multifatorial, mas com grande envolvimento nutricional.
569 Por outro lado, adição de certos ingredientes à dieta, como gordura rica em ácidos
570 graxos, vem resultado em incremento nos índices reprodutivos em bovinos leiteiros e de
571 corte (SARTORI e GUARDIEIRO, 2010).

572

573

574

575

576

577

578

579

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

580

581

582 ANDRIGHETTO, C., JORGE, A. M., GOMES, M. I. F. V., HOCH, A., PICCININ, A. **Efeito**
583 **da Monensina Sódica sobre a Produção e Composição do Leite, a Produção de**
584 **Mozzarella e o Escore de Condição Corporal de Búfalas Murrah.** Revista Brasileira de
585 Zootecnia. V.34. n.2, p.573-581, 2005.

586 BARUSELLI, P. S. **Basic requiriments for artificial insemination and embryo transfer**
587 **in buffaloes.** Buffalo J, v.2, suppl.2, p.53-60, 1994.

588 BARUSELLI, P.S.; CARVALHO, N.A.T.; JACOMINI, J.O. **Eficiência uso da inseminação**
589 **artificial em búfalos.** Rev Bras Reprod Anim Supl, Belo Horizonte, n.6, p.104-110, dez.
590 2009. Disponível em www.cbra.org.br.

591 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Anuário estatístico de**
592 **agroenergia 2012: statistical yearbook of agrienergy.** Brasília: Secretaria de Produção
593 e Agroenergia, 2013. 284 p.

594 CARVALHO, N.A.T. **Avaliação anatomofuncional do sistema genital de fêmeas**
595 **bubalinas (*Bubalus bubalis*), e suas implicações na múltipla ovulação e**
596 **transferência de embriões.** Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
597 Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
598 de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Medicina Veterinária. São Paulo-SP,
599 2006.

600 CARVALHO, N.A.T.; BOMBONATO, P.P.; D'ANGELO, M.; BARUSELLI, P.S.
601 **Caracterização anatomofuncional do sistema genital de fêmeas bubalinas (*Bubalus***
602 **bubalis) e suas implicações na múltipla ovulação e transferência de embriões.** Rev.
603 Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.35, n.2, p.95-103, abr./jun. 2011.

604 CESCO, G. O.; BIANCHI, A. E.; MACEDO, V. P. **Produção e composição química de**
605 **leite de ovelhas lacaune alimentadas com gordura protegida.** Synergismus scyentifica
606 U T F PR , Pato Branco, 08 (2). XVI Simpósio Paranaense de Caprinocultura. IV Simpósio
607 Sul Brasileiro de Ovinos e Caprinos (UENP/CLM, Bandeirantes). 2013.

608 COTTRELL, R. C. **Introduction: nutritional aspects of palm oil.** The American Journal
609 of Clinical Nutrition, v. 53,n.4, p. 989S–1009S, 1991.

610 DANELL, B. **Oestrous behaviour, ovarian morphology and cyclical variation in**
611 **follicular system and endocrine pattern in water buffalo heifers.** Thesis (Doctorat) -

- 612 Faculty of Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala,
613 Sweden. 1987. 124p.
- 614 FERRAZ, M.L. **Efeitos do intervalo entre aspirações foliculares e do tratamento com**
615 **somatotropina bovina recombinante na população folicular e na produção in vitro**
616 **de embriões bubalinos**. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em
617 Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
618 de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Medicina Veterinária. São Paulo-
619 SP, 2008.
- 620 FERREIRA, C. B.; SANTOS L. A.; AGUIAR V. A.; MEDEIROS S. L. S. **Utilização de**
621 **gordura inerte na dieta de ruminantes**. II Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG
622 campus Bambuí II Jornada Científica. 2009.
- 623 FILHO, S.T.R.;RIBEIRO, H.F.L.;VALE, W.G.; PICANÇO, N.S.; BARBOS, E.M.;
624 FERREIRA, R.N. **Desempenho reprodutivo de fêmeas bubalinas criadas em sistema**
625 **misto (várzea e pastagem artificial) no estado do Pará. I. Idade a primeira cria,**
626 **intervalo entre partos, época de parição, eficiência reprodutiva e taxa de prenhez.**
627 *Ciência Animal Brasileira*, v. 10, n. 3, p. 754-763, jul./set. 2009.
- 628 FRANCO, M. **Gordura protegida é boa fonte de energia**. *Revista DBO*. Ano 26, n 321,
629 p. 45, 2007.
- 630 GIMENES, L. U. **Taxa de recuperação in vivo e competência in vitro de oócitos**
631 **bubalinos, zebuínos e taurinos aspirados em diferentes fases da onda de**
632 **crescimento folicular**. Programa de Pós Graduação Tese Doutorado. Faculdade de
633 Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. São Paulo – SP. 2010.
- 634 HESS, B.W.; MOSS, G.E.; RULE, D.C. **A decade of developments in the area of fat**
635 **supplementation research with beef cattle and sheep**. *Journal of Animal Science*. v.86.
636 p.188-204. 2008.
- 637 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Produção da**
638 **Pecuária Municipal**. Rio de Janeiro, v. 41, p. 30, p.1-108, Brasil. 2015.
- 639 JORGE, A.M.; GOMES, M.I.F.V.; HALT, R.C. **Efeito da utilização da somatotropina**
640 **bovina recombinante (bST) sobre a produção de leite em búfalas**. *Revista Brasileira*
641 *de Zootecnia*, v.31, n.3, p.1230-1234, 2002.
- 642 KEMIN - INSPIRED MOLECULAR SOLUTIONS. **EnerFAT™**. Disponível em:
643 <https://www.kemin.com/pt/south-america/products/enerfat>. 2017.

- 644 KRONFELD, D. S.; DONOGHUE, S.; NAYLOR, J. M.; JOHNSON, K.; BRADLEY, C. A.
645 **Metabolic effects of feeding protected tallow to dairy cows.** Journal of Dairy Science,
646 Champaign, v. 63, n. 4, p. 545-552, 1980.
- 647 LAMONTAGNA, C., FRANZOLIN, R. **Níveis de proteína não degradável na dieta sobre**
648 **a produção e qualidade do leite de búfalas em pastagem.** Rev. Bras. Saúde Prod. An.,
649 v.10, n.2, p.322-332 abr/jun, 2009.
- 650 LE VAN TY, D. C., CHUPIN, D., DRIANCOURT, M. A. **Ovarian follicular populations in**
651 **buffaloes and cows.** Anim Reprod Sci, v.19, p.171-178, 1989.
- 652 MARKUS, S.B., WITTENBERG, K.M., INGALLS, J.R., UNDI, M. **Production responses**
653 **by early lactation cows to whole sunflower seed or tallow supplementation of a diet**
654 **based on barley.** J. Dairy Sci. 79: 1817-1825. 1996.
- 655 MARQUES, D. C. **Criação de Bovinos.** 7ª Ed. Belo Horizonte: CVP – Consultoria
656 Veterinária e Publicações, 586 p., 2003.
- 657 MATTOS, R.; STAPLES, C.R.; THATCHER, W.W. **Effects of dietary fatty acids on**
658 **reproduction in ruminants.** Rev. Reprod. 5, 38-45, 2000.
- 659 MEDEIROS, S. R. de; ALBERTIN, T. Z.; MARINO, C. **Lipídios na nutrição de**
660 **ruminantes.** Embrapa Gado de Corte. Parte de livro. 2015.
- 661 PALMIQUIST, D. L. **Influence of source and amount of dietary fat on digestibility in**
662 **lactating cows.** Journal of Dairy Science, 74, 4, 1354-1360. 1991.
- 663 PALMQUIST, D.L.; MATTOS, W.R.S. **Metabolismo de lipídeos.** In: BERCHIELLI, T.T. et
664 al. **Nutrição de ruminantes.** Jaboticabal: FUNEP. Cap.10, p.287-310. 2006.
- 665 PEPLING, M.E. **Follicular assembly: mechanisms of action.** Reproduction review.
666 Society for Reproduction and Fertility, 2012.
- 667 PEREIRA, R.G.A.; CLÁUDIO RAMALHO TOWNSEND, C.R.; NEWTON DE LUCENA
668 COSTA, N.L.; JOÃO AVELAR MAGALHÃES, J.A. **Eficiência reprodutiva de búfalos.**
669 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro de Pesquisa Agroflorestal de
670 Rondônia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Documentos123 Porto
671 Velho, RO 2007.
- 672 PETIT, H.V.; TWAGIRAMUNGU, H. **Taxa de concepção e função reprodutiva de vacas**
673 **leiteiras alimentadas com diferentes fontes de gordura.** Theriogenology, resumo.
674 Junho, 2006.
- 675 PIRES, J.A.A. AND R.R. GRUMMER. **Micronutrients and their impact on high**
676 **performing dairy cows - A focus on niacin and choline.** In Proceedings of Southwest

- 677 Nutrition and Management Conference, Department of Animal Sciences, University of
678 Arizona. 2008.
- 679 PIZZUTI, L. A. D. **Suplementação com farelo de arroz integral e/ou gordura protegida**
680 **na recria de novilhas de corte em pastagem de aveia-preta e azevém.** Dissertação de
681 Mestrado em Zootecnia. Santa Maria. Rio Grande do Sul - RS. 2011.
- 682 SAMBANTHAMURTHI, R.; SUNDRAM, K.; TAN, Y. **Chemistry and biochemistry of**
683 **palm oil.** Progress in Lipid Research, v. 39, n. 6, p. 507–558, 2000.
- 684 SANTOS, A. M. **Análise do potencial do biodiesel de dendê para a geração elétrica**
685 **em sistemas isolados da Amazônia.** 2008. 224 f. Dissertação de Mestrado em Ciências
686 em Planejamento Energético. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
687 2008.
- 688 SANTOS, M. A. S., D'ÁVILA, J. L. **O comportamento do Mercado do Óleo de Palma no**
689 **Brasil e na Amazônia.** Estudos Setoriais 11, Belém – Pará, 1998.
- 690 SARTORI, R.; GUARDIEIRO, M. M. **Fatores nutricionais associados à reprodução da**
691 **fêmea bovina.** Revista Brasileira de Zootecnia. v.39. p.422-433. 2010.
- 692 SARTORI, R.; MOLLO, M.R.; **Influência da ingestão alimentar na fisiologia**
693 **reprodutiva da fêmea bovina.** Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.31.p.197-204.
694 2007.
- 695 SCHAUFF, D.J.; ELLIOTT, J.P.; CLARK, J.H. et al. **Effect of feeding lactating dairy**
696 **cows diets containing extrude soybeans and calcium salts of long-chain fatty acids.**
697 Journal of Dairy Science, v.75, p.3003-3019, 1992.
- 698 SILVA, M. S. T., LOURENÇO J. R. J. B., MIRANDA H. A., ERCHESEN R., FONSECA, R.
699 F. S. R., MELO, J. A., COSTA, J. M. **Programa de incentivo a criação de búfalos por**
700 **pequenos produtores – PRONAF.** Belém, PA: CPATU, 2003.
- 701 SILVESTRE, F. T., CARVALHO, T. S. M., SANTOS, J. E. P.; STAPLES, C. R.;
702 THATCHER, W. W. **Effects of differential supplementation of calcium salts of fatty**
703 **acids (CSFAs) on dairy cows.** In: Joint ADSA-ASAS Annual Meeting, Indianapolis, IN.
704 Journal Dairy Science. v.91. p. 76-77. 2008. 2008. J. Dairy Sci. 91, 76-77.
- 705 SIQUEIRA, J.B.; LEAL, L.S.; OBA, E. **Dinâmica folicular ovariana na espécie bubalina.**
706 Rev Bras Reprod Anim, Belo Horizonte, v.33, n.3, p.139-148, jul./set. 2009. Disponível em
707 www.cbra.org.br.

708 TEIXEIRA, L. V., BASTIANETTO, E., OLIVEIRA, D. A. A. **Leite de búfala na indústria de**
709 **produtos lácteos.** Rev Bras Reprod Anim, Belo Horizonte, v.29, n.2, p.96-100, abril/jun.
710 2005. Disponível em www.cbra.org.br.

711 UNITED STATES. Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. **Oilseeds:**
712 **world market and trade.** 2014.

713 VALE, W.G.; RIBEIRO, H.F.L. **Características reprodutivas dos bubalinos:**
714 **puberdade, ciclo estral, involução uterina e atividade ovariana no pós-parto.** Rev
715 Bras Reprod Anim, Belo Horizonte, v.29, n.2, p.63-73, abril/jun. 2005.

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737 **CAPÍTULO 1**

738

739 **Normatizado segundo Periódico: Reproduction in Domestic Animals**740 [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/\(ISSN\)1439-0531/homepage/ForAuthors.html](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1439-0531/homepage/ForAuthors.html)

741 Mestrado em Ciências Veterinárias, UFMS, Campo Grande, Brasil.

742

743 **Supplementation of protected fat in buffaloes: effects on milk production and pregnancy rate**
744 **to TAI.**

745

746 **Suplementação de búfalas com gordura protegida: efeitos na produção leiteira e taxa de**
747 **prenhez à IATF.**748 Karine Casanova da Silva¹

749

750 **Abstract**

751 The effects of lipid supplementation with protected fat (palm oil -Enerfat®) on the productive
752 parameters, metabolic profile and pregnancy rates in the FTAI of lactating murrh buffaloes were
753 evaluated. The experiment was carried out in a rural property, producing buffalo and derived milk,
754 located in the city of Bandeirantes (MS). A total of 80 lactating buffaloes were divided into two
755 experimental groups: Fat Group (GORD) (EnerFAT® - 150 g / animal / day, n = 37), Control
756 Group (CONTR) (0 g EnerFAT, n = 43). The buffaloes of both groups were submitted to FTAI
757 protocols (P4 and BE), with resynchronization and new FTAI after the diagnosis of gestation
758 performed 30 days after the first FTAI, by means of ultrasonographic examination. The pregnancy
759 rate for the first FTAI was GORD 62.2% and CONTR 51.2% (P = 0.417), and total (IATF+Resinc)

¹ 1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
Campo Grande, MS, Brasil.

Karine_casanova@hotmail.com

760 was: GORD- 60,9% e CONTR- 54,5% ($P>0,05$). There was no difference between the groups in the
761 milk weighing at 4% fat at 30 days of lactation ($P = 0.5811$), 60 days ($P = 0.8461$) and at 90 days (P
762 $= 0.8631$). There was no difference between blood levels of albumin ($P = 0.07$) and total cholesterol
763 ($P= 0.36$), but differences between groups were observed in relation to the urea concentration level
764 ($P <0.0001$) and glucose ($P = 0.03$), higher for the Fat group. Regarding milk composition, there
765 were no differences in the parameters, fat, non - greasy solids, density, protein, lactose and pH,
766 according to the treatments ($P>0.05$). Supplementation with protected fat, provided daily in the
767 amount of 150 g / animal, did not present a significant effect on the rates of pregnancy and milk
768 production of buffaloes.

769 Key words: EnerFAT®, FTAI, milk, resynchronization

770 **Resumo**

771 Foram avaliados os efeitos da suplementação lipídica com gordura protegida (óleo de palma-
772 Enerfat®), sobre os parâmetros produtivos, perfil metabólico e taxas de prenhez à IATF de búfalas
773 em lactação da raça murrah. O experimento foi realizado em uma propriedade comercial, produtora
774 de leite de búfalas e derivados, e foram selecionadas 80 búfalas lactantes, dispostas em dois grupos
775 experimentais: Grupo Gordura (GORD) (EnerFAT® - 150 g/animal/dia, n=37), Grupo Controle
776 (CONTR, n= 43). As búfalas de ambos grupos foram submetidas a protocolos de IATF (P4 e BE),
777 com ressincronização e nova IATF após o diagnóstico de gestação realizado 30 dias após a primeira
778 IATF. A taxa de prenhez total (IATF+Resinc) à IATF foi: GORD - 60,9% e CONTR - 54,5%
779 ($P>0,05$). Não houve diferença entre os grupos na pesagem de leite corrigida para 4% de gordura,
780 aos 30 dias de lactação ($P= 0,5811$), 60 dias ($P= 0,8461$) e aos 90 dias ($P= 0,8631$). Não houve
781 diferença entre os níveis de concentração sanguínea de albumina ($P=0,07$), colesterol total ($P=0,36$),
782 porém houve diferença entre os grupos, em relação a concentração de ureia ($P<0.0001$) e glicose

783 (P=0,03), maior para o grupo Gordura. Em relação à composição do leite, não houve diferença dos
784 parâmetros, gordura, sólidos não gordurosos, densidade, proteína, lactose e pH, de acordo com os
785 tratamentos (P>0,05). A suplementação com gordura protegida, na quantidade de 150g/animal, não
786 apresentou efeito significativo nas taxas de prenhez e produção de leite de búfalas.

787 Palavras-chave: EnerFAT[®], IATF, leite, ressincronização.

788

789 **Introdução**

790 A adição de fontes de gordura protegida vem sendo estudada para ruminantes, sendo o
791 principal objetivo dessa suplementação, aumentar o fornecimento de energia ao animal, que por sua
792 vez está diretamente relacionado às respostas produtivas e reprodutivas dos animais. A origem da
793 gordura pode influenciar nessas respostas, mediante seus efeitos sobre ingestão de alimentos,
794 fermentação ruminal e digestão dos nutrientes.

795 A introdução de lipídeos insolúveis, além de aumentar a densidade calórica da dieta sem
796 comprometimento da degradação da fibra, possibilita maior ingestão e melhor eficiência de
797 utilização da energia (Kronfeld et al., 1980). Pode-se adicionar a gordura na forma não protegida
798 em até 3% da ração total (Schauff et al., 1992) e no entanto, o sabão de cálcio pode ser fornecido
799 até 10-15% da ingestão de matéria seca (800-1,000 g d⁻¹) sem qualquer efeito adverso na utilização
800 de nutrientes (Alexander et al., 2002; Kumar et al., 2006).

801 Em bubalinos poucos trabalhos apresentam relação com o auxílio da adição de
802 suplementação para melhoria dos índices de taxa de prenhez, juntamente com o aumento de
803 produção e qualidade do leite. A introdução de gordura na dieta das búfalas pode ser uma
804 alternativa para melhorar estes parâmetros, e esta gordura pode ser manufaturada em forma de
805 gordura protegida ruminal (GPR), para ter pouco ou nenhum efeito na fermentação do rúmen
806 (Sartori; Mollo, 2007), como exemplo, sais de cálcio de óleo de palma, que contém ácidos graxos
807 saturados de cadeia longa, como o ácido palmítico e, insaturados como o linoleico e linolênico.
808 Assim, a suplementação da dieta com GPR ajuda a repor os ácidos graxos importantes no
809 desempenho reprodutivo.

810 A inclusão de ácidos graxos na dieta de animais de alta produção (Ferreira et al., 2009), podem
811 ter efeitos benéficos sobre a reprodução, atuando na hipófise, no útero e nos ovários (Mattos et al.,
812 2000), em especial sobre a síntese de hormônios como progesterona e prostaglandina (Wathes et al.,
813 2007; Gregory et al., 2009), no tempo de luteólise, número e tamanho dos folículos (Wathes et al.,
814 2007). A esteroidogênese, o desenvolvimento de folículos pré-ovulatórios e a maturação dos oócitos
815 também são alterados positivamente após suplementação com 200% das exigências de manutenção,
816 em dietas com alta energia disponível (Armstrong et al., 2001; 2002 ; Nogueira et al.,2012).

817 O experimento avaliou os efeitos da suplementação lipídica com gordura protegida (óleo de
818 palma – Enerfat[®]), sobre os parâmetros produtivos e taxa de prenhez à IATF de búfalas em lactação
819 da raça Murrah.

820

821 **Material e Métodos**

822 *Local de realização do experimento*

823 O experimento foi realizado em uma propriedade comercial, produtora de leite de búfalas e
824 derivados, no município de Bandeirantes, MS. Os animais permaneceram em piquetes, sob pastejo
825 rotacionado de *Panicum maximum* cv. Mombaça, na lotação de 3 UA ha⁻¹, além do fornecimento de
826 água em pilhetas de concreto e sal mineralizado “*ad libitum*”.

827 *Animais e tratamentos*

828 Foram selecionadas 80 búfalas da raça Murrah recém-paridas e média de peso de 595 ± 57,6
829 kg, com idade entre 3 a 8 anos e divididas em dois tratamentos: Controle (CONTR (N = 43),
830 animais receberam suplementação de 2 kg animal/dia de concentrado (20% proteína bruta(PB)),
831 sem adição de GPR; Gordura (GORD (n= 37), receberam a suplementação com GPR (Óleo de
832 palma - EnerFAT[®] - 150 g animal/dia) adicionado ao concentrado (20%PB - 2 kg animal/dia). O
833 fornecimento do concentrado foi realizado através da distribuição diária, após as duas ordenhas. Os
834 animais permaneceram sob pastejo rotacionado durante toda a estação reprodutiva. Antes de
835 iniciados os manejos da IATF, todos os animais passaram por avaliação ginecológica por
836 ultrassonografia, onde foi identificada a ciclicidade dos animais e, permaneceram durante 15 dias
837 em período de adaptação da suplementação (Figura 1).

838 *Protocolo de IATF*

839 Após 40 dias de suplementação, os animais foram submetidos ao protocolo de IATF
840 utilizado em ambos grupos, conforme descrito a seguir:

841 No dia 0 (D0), foi inserido o dispositivo intravaginal de progesterona com 0,6 g de P4
 842 (Cronipress Monodose ®, Biogenesis- Bago, Curitiba, PR) e aplicado 2 mg de Benzoato de
 843 Estradiol IM (RIC-BE®, Agener União, Brazil). No dia 9 (D9), os dispositivos de P4 foram
 844 retirados concomitantemente com a aplicação de 150 µg D-Cloprostenol IM (Prolise®, Arsa,
 845 Argentina) e 300 UI IM de Gonadotrofina Coriônica Equina (Folligon® 5000UI, MSD, São Paulo,
 846 Brasil). No dia 10 (D10), foi aplicado 1 mg de BE, e no dia 12 (D12), foi realizada a inseminação
 847 no período da manhã.

848 Após o diagnóstico de gestação da primeira IATF, as búfalas não-prenhas, foram
 849 ressincronizadas, com o mesmo protocolo de IATF. Foi utilizado sêmen de 3 touros raça Murrah
 850 para as inseminações das búfalas. Os touros foram selecionados de acordo com os critérios da
 851 propriedade, sendo esta com aptidão leiteira.

Figura 1. Programação e execução do experimento.

852

853 *Coleta e análise dos parâmetros sanguíneos*

854 Antes do fornecimento da suplementação e, no momento da realização da IATF, foram
 855 colhidas amostras de sangue através da veia coccígea, para obtenção de plasma sanguíneo para
 856 quantificação de metabólitos. O sangue foi coletado e armazenado em tubos contendo heparina, os
 857 quais foram mantidos em gelo para posterior centrifugação, a 1500g durante 10 minutos. Após a
 858 centrifugação, as amostras foram acondicionadas em microtubos de 1,5 ml e armazenadas até a
 859 avaliação das concentrações plasmáticas de glicose, uréia, albumina e colesterol. A avaliação das
 860 concentrações plasmáticas, foi feita através da utilização dos kits comerciais Lab Test®,
 861 envolvendo reações enzimáticas colorimétricas com o uso de espectrofotômetro. As análises foram

862 realizadas no laboratório de patologia clínica da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do
863 Sul).

864 *Diagnóstico de gestação*

865 A avaliação da prenhez foi realizada 30 dias após a realização das IATFs, através de
866 ultrassonografia transretal, utilizando o equipamento *Ultrasound System Mindray DP-20* com
867 *transdutor 7.5MHz*.

868 *Coleta e análise do leite*

869 Foram coletadas amostras de leite, durante a ordenha mecanizada, e armazenadas em frascos
870 estéreis de plástico de 80 ml (mesmo utilizado para coleta de urina), congelados e armazenados em
871 freezer na temperatura de -20°C , até posterior análise dos parâmetros de qualidade. As quais foram
872 realizadas através da metodologia ultrassônica do aparelho Ekomilk. Após as coletas das amostras,
873 foi realizada a pesagem do leite, para avaliação da produção de leite corrigido para 4% de gordura,
874 nos dias 30, 60 e 90 de lactação.

875 *Análise estatística*

876 O delineamento empregado no estudo foi inteiramente casualizado, sendo as variáveis
877 incluídas no modelo: tratamento, touro, categorial animal, inseminador, dias em lactação, produção
878 de leite corrigido para 4% de gordura. Para taxa de gestação, assumiu-se uma distribuição binomial
879 (prenhe e vazia), utilizando PROC GLIMMIX do pacote estatístico SAS (SAS Institute Inc., Cary,
880 NC, USA). As covariáveis não significativas ($P > 0,10$) foram removidas do modelo estatístico. Os
881 resultados foram expressos como média $\pm$ se ou percentagens. Em todas as análises, as diferenças
882 foram consideradas significativas quando $p \leq 0,05$, enquanto as diferenças entre $p > 0,05$ e $p \leq 0,10$
883 foram consideradas tendências.

884 **Resultados**

885 O diagnóstico de gestação foi realizado aos 30 dias pós-inseminação (IATF) e a taxa de
886 prenhez para o Grupo Gordura foi de 62,2% (23/37) e de 51,2% (22/43) para o Controle ($P=0,417$).
887 Embora exista diferença numérica, não houve diferença estatística entre os grupos, já na
888 ressincronização, a taxa de prenhez no Grupo Gordura foi de 55,6% (5/9) e do Grupo Controle de
889 66,7% (8/12). Os resultados de taxa de prenhez, somando as duas IATFs, são respectivamente para
890 o grupo gordura e grupo controle, de 60,9% e 54,5% ($P=0,6069$) (Tabela 1). A adição de 150 g d^{-1}

891 de EnerFAT[®] na dieta, fornecidas neste experimento, não promoveu aumento significativo nas
 892 taxas de prenhez das búfalas.

893

894 Tabela 1. Taxa de prenhez entre os grupos Gordura e Controle na IATF e Ressincronização.

	IATF % (prenhe/total)	RESSINC % (prenhe/total)	IATF + RESSINC (prenhe/total)
GORDURA	62.2 ^a (23/37)	55.6 ^a (9/5)	60.9 ^a (28/46)
CONTROLE	51.2 ^a (22/43)	66.7 ^a (8/12)	54.5 ^a (30/55)

895 ^a valores iguais nas colunas, não diferem significativamente (P>0,05).

896

897 Para efeito de casualização, os animais foram pesados antes de iniciar o experimento e não
 898 houve diferença entre os grupos em relação ao peso corporal inicial (P= 0,11), tabela 2.

899 A avaliação do peso em Kg de leite, é feita com base na curva de lactação dos bubalinos e,
 900 apresentou característica típica dos animais leiteiros, com uma fase de produção crescente até o
 901 pico, depois declínio. A pesagem do leite foi obtida durante o período de lactação, sendo esta com
 902 duração de 90 dias, as amostras foram coletadas a cada 30 dias, distribuída nas duas ordenhas e uma
 903 média obtida. Não houve diferença entre os grupos na pesagem de leite corrigido para 4% de
 904 gordura aos 30, 60 e 90 dias de lactação (Tabela 2).

905 Não houve diferença entre os tratamentos em relação aos níveis de concentração sanguínea
 906 de albumina (P =0,07) e colesterol total (P= 0,36), porém, constataram-se diferenças entre os
 907 grupos, em relação às concentrações de uréia (P<0.0001) e glicose (P= 0,03), maiores para o grupo
 908 GORD, Tabela 2.

909

910

911

912

913

914

915 Tabela 2: Efeito do tratamento em relação a parâmetros produtivos e metabólicos sanguíneos de
 916 búfalas em lactação.

	<i>CONTROLE</i>	<i>GORDURA</i>	
	<i>Med ± DP</i>	<i>Med ± DP</i>	<i>P</i>
Dados produtivos			
<i>Peso inicial (kg)</i>	<i>613,85 ± 73,08</i>	<i>579,56 ± 69,09</i>	<i>0,117</i>
<i>Prod. leite 30 (l/dia) cor. 4% de gordura</i>	<i>11,66 ± 4,71</i>	<i>11,96 ± 3,90</i>	<i>0,5811</i>
<i>Prod. leite 60 (l/dia) cor. 4% de gordura</i>	<i>11,52 ± 4,92</i>	<i>11,21 ± 4,34</i>	<i>0,8461</i>
<i>Prod. leite 90 (l/dia) cor. 4% de gordura</i>	<i>11,09 ± 4,64</i>	<i>10,70 ± 3,76</i>	<i>0,8631</i>
Metabólicos sanguíneos			
<i>Albumina (g/L)</i>	<i>26,62 ± 8,05</i>	<i>32,40 ± 6,68</i>	<i>0,07</i>
<i>Colesterol (g/dL)</i>	<i>108,28 ± 36,03</i>	<i>121,40 ± 25,88</i>	<i>0,36</i>
<i>Uréia (g/dL)</i>	<i>28,60 ± 6,11</i>	<i>47,97 ± 9,28</i>	<i><0.0001</i>
<i>Glicose (g/dL)</i>	<i>54.17</i>	<i>65.61</i>	<i>0,03</i>

917

918 A adição de 150 g de EnerFAT® não influenciou nos níveis de gordura no leite, sólidos não
 919 gordurosos, densidade, proteína, lactose e pH ($P>0,05$), nos grupos de tratamento (Tabela 3).

920

921

922

923 Tabela 3: Efeito do tratamento em relação aos parâmetros produtivos do leite de búfalas em
 924 lactação.

	<i>CONTROLE</i>	<i>GORDURA</i>	
	<i>Med ± DP</i>	<i>Med ± DP</i>	<i>P</i>
Dados produtivos (%)			
<i>Gordura no Leite</i>	<i>5,15 ± 1,63</i>	<i>5,42 ± 1,56</i>	<i>0,4740</i>
Sólidos não Gordurosos	<i>10,35 ± 1,73</i>	<i>10,05 ± 1,86</i>	<i>0,3708</i>
Densidade	<i>37,22 ± 7,21</i>	<i>36,12 ± 7,20</i>	<i>0,3843</i>
Proteína	<i>4,75 ± 1,41</i>	<i>4,82 ± 2,65</i>	<i>0,8211</i>
Lactose	<i>4,82 ± 0,19</i>	<i>4,82 ± 0,14</i>	<i>0,8960</i>
PH	<i>6,85 ± 0,07</i>	<i>6,84 ± 0,13</i>	<i>0,9961</i>

925

926 **Discussão**

927 Ao utilizarmos fontes de GPR na dieta dos animais, esperamos que ocorra o aumento da
 928 disponibilidade de energia a fim de melhorar índices produtivos e reprodutivos do rebanho. Zatta
 929 (2014) realizou uma pesquisa utilizando fonte de GPR à base de óleo de palma, na dieta de vacas de
 930 raça holandesa. Encontrando um aumento nas taxas de prenhez dos animais suplementados com
 931 GPR, conforme aumentava a disponibilidade do produto fornecido que era de 0g, 250g e 500g de
 932 Magnapac[®] (óleo de palma). Porém o Magnapac[®] possui um perfil de ácidos graxos em relação aos
 933 saturados e insaturados de 50:50. Já o EnerFAT[®] possui um perfil diferente em relação aos ácidos
 934 graxos, sendo de 60:40, respectivamente, não sendo encontrada diferença significativa na taxa de

935 prenhez das búfalas em lactação submetidas à IATF, apesar de 6,4% de superioridade no grupo
936 suplementado com GPR, quando somada a primeira e segunda IATF. Os resultados de prenhez de
937 60.9 % e 54.5% para os grupos GORD e CONT, respectivamente foram superiores aos encontrados
938 por Baruselli et al. (2009), utilizando o mesmo protocolo hormonal para IATF em búfalas, obtendo
939 uma média de taxa de prenhez de 50%.

940 Muitos estudos têm sido conduzidos com base na suplementação com fontes energéticas em
941 bovinos, porém, em bubalinos os trabalhos ainda são poucos, possivelmente pelo tamanho do
942 rebanho no Brasil, mesmo estando em constante crescimento. Lopes et al. (2007) suplementou 451
943 primíparas nelore com Megalac-E (100 g d⁻¹), do início do protocolo de IATF até o diagnóstico de
944 gestação, e comparou com o grupo controle (n= 459), o qual recebia um mineral proteico (100 g d⁻¹
945 ¹). As vacas foram sincronizadas com protocolo de IATF, e as taxas de prenhez foram de 50,8%
946 (229/451) no grupo que recebeu o Megalac-E e 39,7% (182/459) no grupo controle. Concluindo que
947 essa fonte de gordura protegida aumenta a taxa de prenhez em primíparas Nelore lactantes. Com
948 uma grande quantidade de animais em estudo, o autor obteve diferenças entre os grupos
949 experimentais, além disso, a fonte de gordura protegida utilizada contém altas concentrações de
950 ácidos graxos insaturados de cadeia longa (linoleico e linolênico).

951 Além da taxa de prenhez, também avaliamos os dados produtivos das búfalas lactantes. Não
952 foi encontrada diferença, entre os grupos experimentais, na produção de leite corrigida para 4% de
953 gordura ao redor do pico de lactação e após. Segundo (Eltawil et al., 1976; Hafeez & Naidu, 1981;
954 Alim, 1982), a maior produtividade ocorre no terço inicial da lactação e diminui após o pico que
955 ocorre em torno da sexta semana de lactação e em todas as classes de idade (Catillo et al., 2002) ou
956 na quarta semana, segundo Kholif (1997). Em estudo feito por Andrighetto et al. (2004), onde
957 foram utilizados dados de produção de leite de 24 búfalas da raça Murrah, compreendendo as

958 primeiras 20 semanas de lactação, as búfalas receberam dieta balanceada com disponibilidade de
959 forragem e concentrado, para produção de 4kg de leite e 7% de gordura. Verificou-se que o pico de
960 lactação ocorre por volta do primeiro mês de lactação (4^a semana).

961 Zatta (2014) em um estudo com 27 vacas da raça holandesa, com o intuito de avaliar níveis
962 de inclusão de gordura protegida de óleo de palma (Magnapac® - Madrid, Espanha) na alimentação
963 de vacas leiteiras. Observou que os níveis séricos de albumina no sangue das vacas, não diferiram
964 significativamente com valor médio de 2,90 mg dL⁻¹. Em relação à concentração de uréia no sangue
965 os dados apresentados não variaram significativamente (P>0,05).

966 A suplementação de gordura é geralmente associada ao maior nível de colesterol (Son et al.,
967 1996). Ranjan (2012), utilizando EnerFAT® em búfalas da raça Murrah, encontrou aumento
968 progressivo no nível de colesterol sérico com o aumento do nível de gordura, de 0,7% (100 g / dia)
969 a 1,4% (200 g / dia) da dieta, a concentração de colesterol HDL aumentou (P <0,05) sem alteração
970 no nível de colesterol LDL, indicando que a suplementação pode ter um papel benéfico na saúde
971 dos animais, devido a maior absorção de ácidos graxos dietéticos. Não avaliamos as concentrações
972 de HDL e nem de LDL no sangue das búfalas lactantes, porém, avaliamos os níveis séricos de
973 colesterol total e, ao utilizarmos 150 g animal⁻¹ d⁻¹ não observamos diferença estatística entre os
974 grupos experimentais (P = 0,36).

975 Oliveira et. al (2008), em um estudo utilizando diversas fontes de lipídeos em búfalas
976 lactantes observaram que, as fontes de lipídeos não interferiram na quantidade de leite produzidos
977 por dia, porém os autores relataram que a adição das fontes lipídicas afetaram positivamente a
978 produção de leite corrigida para 4% de gordura. Lopez et al. (2006) em um estudo experimental
979 utilizando vacas da raça Jersey, também analisaram o efeito da suplementação de diferentes fontes
980 lipídicas sobre a produção e composição do leite. As fontes lipídicas utilizadas foram sebos, gordura

981 protegida e grãos de soja integral triturado, onde as vacas que receberam gordura protegida
982 apresentaram maior produção de leite corrigida para 4% de gordura, porém, nenhuma das fontes
983 lipídicas alteraram as concentrações e produções de gordura, proteína e lactose, nem as
984 concentrações de ureia, sólidos totais e energia do leite. Diferenças variáveis foram encontradas por
985 diversos autores, em relação a composição do leite e produção de leite corrigido para 4% de
986 gordura. Porém não obtivemos diferenças estatísticas quando comparamos os animais que
987 receberam a fonte de gordura protegida EnerFAT[®] com as que não receberam. Direcionando-nos a
988 concluir que essa fonte lipídica não interfere nos parâmetros produtivos do leite.

989 Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB, 2007), a glicose no
990 sangue aumenta quando ocorre o período de transição, da fase catabólica (perda de peso), no início
991 da lactação, para a fase anabólica (ganho de peso), já que a glicose é a fonte de energia das células.
992 Isso é proveniente da alimentação no chamado período de balanço energético positivo, ou seja,
993 quando a búfala torna-se novamente capaz de ingerir nutrientes em quantidades maiores que as
994 necessárias para seu metabolismo e produção. Em resposta ao aumento de glicose sanguínea, o
995 pâncreas libera o hormônio insulina que tem por finalidade permitir a entrada da glicose nas células,
996 onde será utilizado como fonte de energia ou transformado em reservas (gordura).

997 Quando os animais estão em balanço energético negativo (BEN), as concentrações de ureia
998 aumentam, enquanto que IGF-I, glicose e insulina encontram-se em níveis baixos, sendo esses
999 últimos destinados à síntese de leite. Essa alteração nos níveis séricos dessas substâncias está
1000 geralmente associada ao comprometimento da função ovariana e fertilidade. As concentrações dos
1001 metabólicos, na corrente sanguínea das búfalas lactantes suplementadas com EnerFAT[®], de ureia
1002 (g/dL) são de, 47.97 ± 9.28 e 28.6 ± 6.11 ($P < 0.0001$) e glicose (g/dL) de, 65.61 e 54.17 ($P = 0.03$),
1003 para os grupos GORD e CONT, respectivamente. Dado que a disponibilidade de pastagem de capim

1004 Mombaça na propriedade, sendo este rico em percentagem de PB e, além dessa fonte também foi
1005 fornecida uma dieta com 20% PB, explicam-se os níveis de ureia aumentados no grupo GORD. O
1006 qual poderia indicar que os animais estariam em BEN, se os níveis de glicose encontrados não
1007 fossem inversamente proporcionais aos relatados na literatura, não caracterizando o BEN.

1008 O teor de sólidos não gordurosos e proteína bruta no leite, não sofreram alterações entre os
1009 grupos. Estes resultados são semelhantes aos encontrados por Oliveira et al. (2008), utilizando
1010 fontes de lipídeos na dieta de búfalas em lactação. A percentagem de gordura no leite foi de $5,15 \pm$
1011 $1,63$ para o grupo Controle e $5,42 \pm 1,56$ para o grupo Gordura, sem diferença entre os grupos
1012 experimentais. Assim como Polidori et al. (1997), ao utilizar adição de ácidos graxos de cadeia
1013 longa, na dieta de búfalas em lactação.

1014

1015 **Conclusão**

1016 A suplementação com gordura protegida, fornecida diariamente na quantidade de 150 g
1017 $\text{animal}^{-1} \text{d}^{-1}$, não apresentou efeito nas taxas de prenhez à IATF, produção e composição química do
1018 leite corrigida para 4% de gordura. Não apresentou efeitos nos níveis séricos de albumina e
1019 colesterol, porém apresentou efeitos nos níveis séricos de glicose e ureia.

1020

1021 **Agradecimentos**

1022 A fazenda Ouro Negro, agradeço pela compreensão e colaboração, por ceder os animais e
1023 instalações.

1024 A Embrapa pelo financiamento de parte da pesquisa.

1025 A Kemin[®] pelo fornecimento de parte do suplemento utilizado.

1026

1027 **Referências**

1028 Alexander, G, Prabhakara RZ, Rama Prasad, J (2002). **Effect of supplementing sheep with**
1029 **sunflower acid oil or its calcium soap on nutrient utilization.** Asian-Australasian Journal of
1030 Animal Sciences, 15, 1288-1293.

1031 Alim, KA (1982). **Aspects of milking technique and productivity of udder quarters in buffalo.**
1032 World Rev Anim Prod, v.18, p.33-41.

1033 Andrighetto, C; Piccinin, A; Gimenez, JN; Jorge, AM; Móri, C (2004). **Curva de lactação de**
1034 **búfalas Murrah ajustadas pela função gama incompleta.** V Simpósio da Sociedade Brasileira de
1035 \melhoramento Animal. 8-9 Julho. Pirassununga – SP.

1036 Armstrong, DG.; Gong, JG; Gardner, JO (2002). **Steroidogenesis in bovine granulosa cells: the**
1037 **effect of short-term changes in dietary intake.** Reproduction, v.123, p.371-378.

1038 Armstrong, DG; Mcevoy, TG; Baxter, G (2001). **Effect of dietary energy and protein on bovine**
1039 **follicular dynamics and embryo production in vitro: associations with the ovarian insulin-like**
1040 **growth factor system.** Biology of Reproduction, v.64, p.1624-1632.

1041 Associação Brasileira de Criadores de Búfalos – ABCB (2007). **Manejo de búfalas leiteiras.**

1042 Baruselli, PS; Carvalho, NAT; Jacomini, JO (2009). **Eficiência uso da inseminação artificial em**
1043 **búfalos.** Rev Bras Reprod Anim Supl, Belo Horizonte, n.6, p.104-110. Disponível em
1044 www.cbra.org.br.

1045 Catillo, G; Macciotta, NP; Carretta, A; Cappio-Borlino, A (2002). **Effects of age and calving**
1046 **season on lactation curves of milk production traits in Italian water buffaloes.** Journal of Dairy
1047 Science 85 (5): 1298-306.

- 1048 Eltawil, EA; Moukhtar, SA; Galal, ESE; Khishin, ES (1976). **Factors affecting the production**
1049 **and composition of Egyptian buffaloes milk.** Trop Anim Hlth Prod, v.8, p.115-121.
- 1050 Ferreira, CB.; Santos, LA.; Aguiar, VA.; Medeiros, SLS (2009). **Utilização de gordura inerte na**
1051 **dieta de ruminantes.** II Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG campus Bambuí. II Jornada
1052 Científica 19 a 23 de Outubro.
- 1053 Gregory, RM; Cardona, JCA; Patin Ospina, M; Hernandez Ramirez, M; Mattos, RC; Jobim, MIM
1054 (2009). **Ácidos graxos poliinsaturados e seus efeitos no desempenho reprodutivo da vaca.**
1055 Revista Brasileira de Reprodução Animal, Suplemento, p.153-156.
- 1056 Hafeez, A & Naidu, KN (1981). **Relation of udder size with milk yield in buffaloes.** Indian J.
1057 Dairy Sci., v.34, p.45-48.
- 1058 Kholif, AM (1997). **Effect of number and stage of lactation on the yield, composition e**
1059 **properties of buffaloes milk.** Egyp. J. Dairy Sci., v.25, p.25-39.
- 1060 Kronfeld, DS; Donoghue, S; Naylor, JM; Johnson, K; Bradley, CA (1980). **Metabolic effects of**
1061 **feeding protected tallow to dairy cows.** Journal of Dairy Science, Champaign, v. 63, n. 4, p. 545-
1062 552.
- 1063 Kumar, R, Sivaiah, K, Reddy, YR, Ekambram, B, Reddy, TJ. And Reddy, GVN (2006). **Effect of**
1064 **supplementation of dietary protected lipids on intake and nutrient utilization in Deccani**
1065 **lambs.** Tropical Animal Health Production, 38, 151-158.
- 1066 Lopes, CN; Pais, MART; Araújo, TPB; Oliveira, LOF; Vasconcelos, JLM (2007). **Efeito de**
1067 **suplementação mineral protéica com megalac-e® na taxa de prenhez em primíparas nelore.**
- 1068 López, S.; López, J.; Stumpf Junior, W (2006). **Produção e composição do leite e eficiência**
1069 **alimentar de vacas da raça Jersey suplementadas com fontes lipídicas.** Faculdade de
1070 Agronomia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

- 1071 Mattos, R; Staples, CR; Thatcher, WW (2000). **Effects of dietary fatty acids on reproduction in**
1072 **ruminants**. Rev. Reprod. 5, 38-45.
- 1073 Nogueira, E; Silva, AS; Amaral, TB; Ítavo, LCV; Dias, AM; Mingoti, GZ (2012). **Follicular**
1074 **dynamics and production of oocytes in young Nellore heifers with energetic supplementation**.
1075 R. Bras. Zootec., v.41, n.9, p.2012-2017.
- 1076 Oliveira, RL; Bagaldo, AR; Ladeira, MM; Barbosa, MAAF; Oliveira, RL; Oliveira, GJC (2008).
1077 **Desempenho produtivo e custos com alimentação de búfalas lactantes submetidas a dietas**
1078 **com diferentes fontes de lipídeo**. Revista Brasileira de Zootecnia. v.37. n.8. p. 1503 – 1508.
- 1079 Polidori, F; Sgoifo, RCA; Senatore, EM; Savoini, G; Dell'orto, V (1997). **Effect of recombinant**
1080 **bovine somatotropin and calcium salts of long-chain fatty acids on milk from Italian buffalo**.
1081 Journal Dairy Science. Sep;80(9):2137-42.
- 1082 Ranjan, A; Sahoo, B; Singh, VK. Srivastava, S; Singh, SP; Pattanaik, AK (2012). **Effect of bypass**
1083 **fat supplementation on productive performance and blood biochemical profile in lactating**
1084 **Murrah (Bubalus bubalis) buffaloes**. Trop. Anim. Health Prod. University of Veterinary and
1085 Fishery Sciences. Kolkata - India.
- 1086 Sartori, R & Mollo, MR (2007). **Influência da ingestão alimentar na fisiologia reprodutiva da**
1087 **fêmea bovina**. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.31.p.197-204.
- 1088 Schauff, DJ; Elliott, JP; Clark, JH; et al. (1992). **Effect of feeding lactating dairy cows diets**
1089 **containing extrude soybeans and calcium salts of long-chain fatty acids**. Journal of Dairy
1090 Science, v.75, p.3003-3019.
- 1091 Son, J, Grant, RJ; And Larson, LL (1996). **Effects of tallow and escape protein on lactational**
1092 **and reproductive performance of dairy cows**. Journal of Dairy Science, 79, 822-830.
- 1093 Wathes, DC; Abayasekara, DR; Aitken, RJ (2007). Minireview: **Polyunsaturated fatty acids in**
1094 **male and female reproduction**. Biology of Reproduction 77: 190-201.

- 1095 Zatta, MR (2014). **Suplementação com gordura protegida de óleo de palma na alimentação de**
1096 **vacas leiteiras.** Dissertação de mestrado. 62 p. Programa de Pós-graduação em Zootecnia.
1097 Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Área do conhecimento: Nutrição de Ruminantes.
1098 Dois Vizinhos – PR.
1099