**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
CURSO DE DOUTORADO**

**CARBONO NO SOLO, ESTRUTURA DO PASTO E
DESEMPENHO DE BOVINOS EM CAPIM-MARANDU
MANEJADO COM DIFERENTES TAXAS DE LOTAÇÃO**

Diego Martins da Silva Echeverria

**CAMPO GRANDE, MS
2020**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
CURSO DE DOUTORADO**

**CARBONO NO SOLO, ESTRUTURA DO PASTO E
DESEMPENHO DE BOVINOS EM CAPIM-MARANDU
MANEJADO COM DIFERENTES TAXAS DE LOTAÇÃO**
CARBON IN THE SOIL, PASTURE STRUCTURE AND CATTLE
PERFORMANCE IN MARANDU GRASS MANAGED WITH DIFFERENT
LOTATION RATES

Diego Martins da Silva Echeverria

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Menezes Dias

Tese apresentada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como requisito à obtenção do título de Doutor em Ciência Animal.

Área de concentração: Produção Animal.

CAMPO GRANDE, MS
2020

DEDICO

Aos meus pais,

pai (**Aurélio Echeverria**) e mãe (**Nilza Martins da Silva Echeverria**), pois foram eles que me fizeram ser o que sou e me orgulho disso, se pudesse escolher em outras vidas, seriam os senhores novamente. Deram-me o alicerce em todos os aspectos para que todas essas etapas até o momento fossem concretizadas.

Ao meu irmão:

Diogo Martins da Silva Echeverria

AGRADECIMENTOS

Sempre e primeiramente a **Deus**, por andar comigo, por me dar a vida e a sabedoria para continuar nessa caminhada, sem me deixar cair ao longo do percurso.

Aos **meus pais** por sempre me apoiarem e terem as condições emocionais e financeiras de me aguentarem por 32 anos. Tudo isso é por vocês, espero nunca decepcioná-los, esse título dedico aos senhores, um pouco da minha retribuição.

Ao **meu irmão** pela amizade verdadeira, e por acreditar e dar vozes de confiança a mim.

Ao meu **amigo** Jailson Batista da Silva, por fazer parte da minha vida, me apoiar e fazer com que meus dias fossem mais fáceis e me ajudar a me tornar uma pessoa melhor, e Deus ter dado a oportunidade a ele da vida, nasceu de novo!!!

Ao meu orientador Prof. Dr. Alexandre Menezes Dias pelo aceite de orientação.

Ao amigo e Prof. Dr. Luís Carlos Vinhas Ítavo, pelo exemplo de expor o conhecimento e por sempre estar pronto a atender no que fosse necessário, rodar a estatística e compartilhar seu conhecimento.

Ao amigo e Prof. Dr. Gelson dos Santos Difante, por ser um exemplo no seu profissionalismo, líder de uma equipe e por me atender de maneira muito acolhedora e me fazer sentir estar na área certa de trabalho, um espelho de profissional, parabéns pelo seu trabalho.

Ao Prof. Dr. Valter Joost Van Onselen por ter me ajudado na estatística e contribuído com toda sua atenção e conhecimento.

Aos membros da banca de qualificação Professores Doutores Alexandre Menezes Dias (presidente), Luís Carlos Vinhas Ítavo (Titular) e Gelson dos Santos Difante (Titular).

Aos membros da banca de defesa da tese Professores Doutores Alexandre Menezes Dias (presidente), Elson Martins Coelho (titular externo), Erikliis Nogueira (titular externo), Gelson dos Santos Difante (titular), Luís Carlos

Vinhas Ítavo (Titular), Rodrigo Gonçalves Mateus (suplente), e João Virgínio Emerenciano Neto (suplente).

À Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), especialmente ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, e a todos os professores do programa que fizeram parte do profissional que me tornei.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de Doutorado, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado Mato Grosso do Sul (FUNDECT).

A MACAL Nutrição Animal pelo patrocínio dos bebedouros e fornecimento da suplementação utilizada durante todo o período experimental, em especial a Poliana Veis Leite.

Ao Grupo de Forragicultura e Pastagens, especialmente Luciana Junges pela mulher batalhadora e vencedora, ao Cleiber Daril Montagna (pelo trabalho braçal, em especial a construção dos piquetes e pela instalação dos postes e fios nos piquetes, isso sempre gera muita risada entre nós, e mental para comigo), a Pamela Kerlyane Tomaz, Iesa Pereira de Andrade pela ajuda de campo e os demais Ana Paula Viscardi da Silva (amizade e apoio), Fabiane Ortiz do Carmo Gomes Coca, Anderson Ramires Candido, Eva Nara Oliveira Gomes, Juliana Oliveira Batistoti, e a todos os estagiários (Luan, João, Natalia, Yasmin, Leticia, Tais) por toda a ajuda na condução dos experimentos. Tive imenso prazer de ter trabalhado com cada um. Minha eterna gratidão a todos.

A todos os funcionários da Fazenda Escola da UFMS José Maciel Costa, Heitor Henrique Costa Valeriano, Arnoud Correa da Silva, Vicente de Gois, Marcos Antônio Medina da Silva, Luiz Gonzaga Bitencourt Ovando, Erivelton da Silva Ovando e Claudemiro dos Santos Maranhão e a todos os funcionários da FAMEZ, desde o da limpeza até aos motoristas que nos levavam para a Fazenda Escola.

As técnicas do Laboratório de Nutrição Animal Aplicada: Tallyta Ananda da Silva Maeda (essa pessoa em especial por ser uma excelente profissional e amiga, que sempre esteve disposta a auxiliar no experimento, participou do experimento de campo e ter me aturado por todo esse tempo), Lucimara Modesto

e ao Rafael Rodrigues Godoy, por todo o auxílio, paciência e disponibilidade durante a condução dos experimentos e das análises laboratoriais.

Ao secretário do curso de Pós-Graduação em Ciência Animal (UFMS) Ricardo de Oliveira dos Santos, por toda ajuda e boas conversas, meu muito obrigado.

A professora Alda Izabel de Souza e a toda equipe do Laboratório de Patologia Clínica.

Aos discentes Antônio Leandro Chaves Gurgel e Carolina Marque Costa, orientados do Professor Doutor Gelson dos Santos Difante pelo auxílio na utilização do SAS e disponibilidade de tempo, companheirismo e atenção prestada, estão de parabéns!!!!

A todos os colegas do curso de doutorado pela força e amizade.

Por fim, gostaria de agradecer a todos meus amigos e família, que contribuíram de alguma forma para a realização desse trabalho.

MINHA ETERNA GRATIDÃO

*Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos
para o sucesso.*

*Se estivermos possuídos por uma inabalável determinação,
conseqüiremos superá-los.*

*Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre
humildes, recatados e despidos de orgulho.*

Dalai Lama

Resumo

ECHEVERRIA, D. M. S. **CARBONO NO SOLO, ESTRUTURA DO PASTO E DESEMPENHO DE BOVINOS EM CAPIM-MARANDU MANEJADO COM DIFERENTES TAXAS DE LOTAÇÃO**. 2020. 118 f. Tese (Doutorado em Ciência Animal) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 2020.

A revisão bibliográfica apresenta base para o conhecimento teórico e prático da forma com que as pastagens brasileiras têm sido manejadas, as respostas em relação à produtividade e qualidade de forragem, nível de produção animal e a contribuição no estoque de carbono no solo. O artigo I teve o objetivo de avaliar o efeito das taxas de lotação animal no estoque de carbono, na estrutura do pasto e na produtividade animal em pastos de capim-marandu manejado sob lotação contínua no bioma Cerrado. O artigo II objetivou-se o efeito das taxas de lotação animal no estoque de carbono, na estrutura, produtividade e valor nutricional do pasto e na produtividade animal em pastos de capim-marandu manejado sob lotação contínua no bioma Cerrado. Ambos os experimentos, os tratamentos foram as diferentes taxas de lotações de 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹, e três repetições, cada piquete possuía 0,5 ha, totalizando uma área de 6 ha. No primeiro artigo o experimento foi de outubro de 2017 a março de 2018 e no segundo artigo foi de outubro de 2018 a março de 2019. Os animais utilizados no primeiro ano foram 30 novilhas e no segundo ano 30 novilhos, ambos de recria e com peso de entrada de aproximadamente 200 kg de peso vivo. Os pastos foram formados pela *Brachiaria brizantha* cv. Marandu e receberam nos dois anos de avaliação adubação nitrogenada de 150 kg de N ha⁻¹ ano⁻¹. No primeiro experimento as novilhas receberam suplementação proteica energética comercial com 24% de PB e 70% de NDT recomendada para bovinos em fase de crescimento e engorda com consumo de 0,3 % do peso vivo. A maior produção de massa verde média observada foi com 0,8 UA ha⁻¹ (14554,16 kg ha⁻¹). As médias de massa seca total foram de 5861,98; 4584,57; 4638,88 e 3185,67 kg MS ha⁻¹ nos pastos com 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹, respectivamente. Foram observadas médias de ganho médio diário por área passando de 1,206 para 3,660 kg ha⁻¹ dia⁻¹ e GPT por área de 213,52 para 647,80 kg ha⁻¹ nas taxas de lotação de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹. Em abril de 2018, os pastos com taxas de lotações distintas apresentaram estoques de carbono orgânico total e associado aos minerais superiores aos observados na área de vegetação nativa (21,71 e 15,62 t ha⁻¹, respectivamente). Realizar o manejo de pastejo sob lotação contínua entre 1,6 e 2,4 UA ha⁻¹ de novilhas

encontra-se equilíbrio de produção de forragem, ganho médio diário e por área de peso vivo recebendo suplemento proteico energético e adubação de manutenção de 150 kg de N ha⁻¹ ano⁻¹. No artigo II, o experimento foram novilhos e receberam suplementação proteica energética comercial com 20% de PB e 75% de NDT recomendada para bovinos em fase de terminação com consumo de 0,7% do peso vivo. Foi observado efeito quadrático para a massa verde, com ponto mínimo de 6538,79 kg ha⁻¹ com 2,4 UA ha⁻¹. Efeito linear decrescente foi observado para massa seca total de folha, a maior foi com 0,8 UA ha⁻¹ com 1369,46 kg ha⁻¹. Houve aumento no teor de proteína bruta da folha de 5,10% para 7,81% e de 5,28 para 11,99% de outubro a dezembro e de janeiro a março, nas taxas de lotações de de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹. Os ganhos passaram de 0,867 para 0,657 kg dia⁻¹ de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹. O maior ganho peso total individual (150,83 kg) foi no pasto com 0,8 UA ha⁻¹ e diminuiu (114,25 kg) com 3,2 UA ha⁻¹. O carbono orgânico total (29,94 g kg⁻¹), particulado (4,65 g kg⁻¹) e associado aos minerais (25,29 g kg⁻¹) foram superiores na vegetação nativa comparada as demais áreas. A produção em quantidade e qualidade do capim-marandu manejado sob lotação contínua de 2,4 a 3,2 UA ha⁻¹ na estação chuvosa refletiu em melhor desempenho animal tanto individual quanto por área sem prejudicar a planta.

Palavras-chave: altura dossel, capim-marandu, carbono, efeito estufa, intensidade de pastejo, massa de forragem

Abstract

ECHEVERRIA, D. M. S. **CARBON IN THE SOIL, PASTURE STRUCTURE AND CATTLE PERFORMANCE IN MARANDU GRASS MANAGED WITH DIFFERENT LOTATION RATES**. 2020. 118 f. Thesis (Doctorate in Animal Science) - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, State University of Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 2020.

The bibliographic review presents a basis for theoretical and practical knowledge of the way in which Brazilian pastures have been managed, the responses in relation to forage productivity and quality, level of animal production and the contribution to the carbon stock in the soil. Article I aimed to evaluate the effect of stocking rates on carbon stock, pasture structure and animal productivity in marandu grass pastures managed under continuous stocking in the Cerrado biome. Article II aimed at the effect of stocking rates on the carbon stock, on the structure, productivity and nutritional value of the pasture and on the animal productivity in pastures of marandu grass managed under continuous stocking in the Cerrado biome. In both experiments, the treatments were the different stocking rates of 0.8; 1.6; 2.4 and 3.2 AU ha⁻¹, and three replications, each paddock had 0.5 ha, totaling an area of 6 ha. In the first article the experiment was from October 2017 to March 2018 and in the second article it was from October 2018 to March 2019. The animals used in the first year were 30 heifers and in the second year 30 steers, both reared and weighed input weight of approximately 200 kg live weight. Pastures were formed by *Brachiaria brizantha* cv. Marandu and received nitrogen fertilizer of 150 kg of N ha⁻¹ year⁻¹ in the two years of evaluation. In the first experiment, heifers received commercial protein supplementation with 24% CP and 70% TDN recommended for growing cattle and fattening with consumption of 0.3% of live weight. The highest average green mass production observed was 0.8 AU ha⁻¹ (14554.16 kg ha⁻¹). The averages of total dry mass were 5861.98; 4584.57; 4638.88 and 3185.67 kg DM ha⁻¹ in pastures with 0.8; 1.6; 2.4 and 3.2 AU ha⁻¹, respectively. Average daily gain averages were observed per area from 1.206 to 3.660 kg ha⁻¹ day⁻¹ and TWG per area from 213.52 to 647.80 kg ha⁻¹ at stocking rates from 0.8 to 3.2 AU ha⁻¹. In April 2018, pastures with different stocking rates showed stocks of total organic carbon and associated minerals higher than those observed in the area of native vegetation (21.71 and 15.62 t ha⁻¹, respectively). Grazing management under continuous stocking between 1.6 and 2.4 AU ha⁻¹ of heifers is a balance of forage production, average daily gain and by area of live weight

receiving energy protein supplement and maintenance fertilizer of 150 kg of N ha⁻¹ year⁻¹. In article II, the experiment was steers and received commercial energy protein supplementation with 20% CP and 75% TDN recommended for finishing cattle with consumption of 0.7% of live weight. A quadratic effect was observed for the green mass, with a minimum point of 6538.79 kg ha⁻¹ with 2.4 AU ha⁻¹. Decreasing linear effect was observed for total dry leaf mass, the highest was 0.8 AU ha⁻¹ with 1369.46 kg ha⁻¹. There was an increase in the crude protein content of the leaf from 5.10% to 7.81% and from 5.28 to 11.99% from October to December and from January to March, in the stocking rates from 0.8 to 3, 2 AU ha⁻¹. The gains went from 0.867 to 0.657 kg day⁻¹ from 0.8 to 3.2 AU ha⁻¹. The greatest gain in total individual weight (150.83 kg) was in the pasture with 0.8 AU ha⁻¹ and decreased (114.25 kg) with 3.2 AU ha⁻¹. The total organic carbon (29.94 g kg⁻¹), particulate (4.65 g kg⁻¹) and associated with minerals (25.29 g kg⁻¹) were higher in native vegetation compared to the other areas. The production in quantity and quality of marandu grass managed under continuous stocking from 2.4 to 3.2 AU ha⁻¹ in the rainy season reflected in better animal performance both individually and by area without harming the plant.

Keywords: canopy height, marandu grass, carbon, greenhouse effect, grazing intensity, forage mass

Lista de Figuras

Revisão Bibliográfica

- Figura 1. Evolução de pastagens e da produtividade da pecuária brasileira (IBGE, 2019).....6
- Figura 2. Relação entre taxa de lotação (X) e ganho por animal (Y) e por área (Z), Mott, 1960.....10

Artigo I

- Figura 1. Temperaturas média, mínima e máxima e precipitação mensal durante o período experimental. 51
- Figura 2. Relação entre lotação animal (X), ganho de peso individual (Y) e ganho de peso por área (Z) 60

Artigo II

- Figura 1. Temperaturas média, mínima e máxima e precipitação mensal durante o período experimental 88
- Figura 2. Relação entre lotação animal (X), ganho de peso individual (Y) e ganho de peso por área (Z) 97

Lista de Tabelas

Revisão Bibliográfica

Tabela 1. Estoques de C, taxas de acúmulo e perdas na camada de 1 m de profundidade no solo sob Cerrado e sob outros usos e manejo da terra (modificado de Corazza et al., 1999).....	15
---	----

Artigo I

Tabela 1. Textura e teores de nutrientes do solo da área experimental da camada de 0-20 cm (setor bovinocultura de leite) da Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia UFMS antes do experimento (Setembro 2017) e final do experimento (Abril 2018).....	52
Tabela 2. Estrutura do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado.....	53
Tabela 3. Composição química do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado	54
Tabela 4. Teores médios de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) e digestibilidade <i>in vitro</i> da massa seca da folha e do colmo do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado	55
Tabela 5. Matéria seca e matéria orgânica da simulação de pastejo de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado ..	56
Tabela 6. Desempenho de novilhas em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação sob lotação contínua no Bioma Cerrado	57
Tabela 7. Valores médios dos teores de carbono orgânico total (COT), carbono orgânico particulado (COp) e carbono orgânico associado aos minerais (COam), na camada 0-20 cm em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado.....	58
Tabela 8. Valores médios dos estoques de carbono orgânico total (Est. COT), carbono orgânico particulado (Est. COp), carbono orgânico associado aos minerais (Est. COam), e, índice de manejo de carbono, na camada 0-20 cm em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado.....	59

Artigo II

Tabela 1. Textura e teores de nutrientes do solo da área experimental da camada de 0-20 cm (setor bovinocultura de leite) da Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia UFMS antes do experimento (Setembro 2018) e final do experimento (Abril 2019)	89
Tabela 2. Estrutura do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado	90
Tabela 3. Composição química do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado	91
Tabela 4. Teores médios de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) e digestibilidade <i>in vitro</i> da massa seca da folha e do colmo do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado	92
Tabela 5. Matéria seca e matéria orgânica da simulação de pastejo de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.....	93
Tabela 6. Desempenho de novilhos em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação sob lotação contínua no Bioma Cerrado	94
Tabela 7. Valores médios dos teores de carbono orgânico total (COT), carbono orgânico particulado (CO _p) e carbono orgânico associado aos minerais (CO _{am}), na camada 0-20 cm em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.....	95
Tabela 8. Valores médios dos estoques de carbono orgânico total (Est. COT), carbono orgânico particulado (Est. CO _p), carbono orgânico associado aos minerais (Est. CO _{am}), e, índice de manejo de carbono, na camada 0-20 cm em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.....	96

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. REVISÃO DE LITERATURA	3
2.1 <i>Brachiaria brizantha</i> (A. Rich.) Stapf. cv. Marandu.....	3
2.2 Pastagens brasileiras	5
2.3 Manejo de pastagem	7
2.3.1 Implantação do sistema	7
2.3.2 Taxa de lotação	8
2.3.3 Adubação nitrogenada	10
2.3.4 Suplementação a pasto.....	12
2.4 Estoque de carbono no solo	13
3. REFERÊNCIAS	16
ARTIGO I- Estoque de carbono do solo, estrutura do pasto e produtividade de novilhas em capim-marandu manejado sob lotação contínua no bioma Cerrado....	24
INTRODUÇÃO	25
MATERIAL E MÉTODOS	27
RESULTADOS	31
DISCUSSÃO	35
CONCLUSÃO	44
REFERÊNCIAS	44
ARTIGO II- Estrutura do pasto, desempenho de novilhos de corte e estoque de carbono em pastos de capim-marandu no bioma Cerrado	61
INTRODUÇÃO	62
MATERIAL E MÉTODOS	64
RESULTADOS	68
DISCUSSÃO	72
CONCLUSÃO	80
REFERÊNCIAS	80

1. INTRODUÇÃO

O sistema brasileiro de criação de bovinos em pasto é o mais eficiente economicamente. No entanto, nos últimos anos a população tem tido mais conhecimento e preocupação com os efeitos da produção animal no meio ambiente. O que resulta numa pressão cada vez maior tanto aos pesquisadores quanto aos produtores rurais a terem um sistema de produção cada vez mais adequado, com produção animal mais eficiente e que assegure sustentabilidade no sistema solo-planta-animal.

O Brasil, por ser um país tropical e possuir duas estações bem definidas (águas (estação primavera verão) e secas (estação outono inverno)), faz com que a produção das forrageiras não seja homogênea durante o ano denominado de estacionalidade produtiva. Várias estratégias podem ser utilizadas para minimizar esses efeitos, dentre elas, o controle da produção de forragem através do uso de taxas de lotação, o que irá refletir tanto na produção animal de qualidade e eficiente quanto na produção forrageira em quantidade e qualidade suficiente, porém, é necessário entender as mudanças na estrutura do pasto de acordo com a estratégia de manejo adotada.

Manter a oferta de forragem em quantidade e qualidade que atenda as exigências de manutenção e produção dos animais em pastejo se torna um ponto chave do manejo, pois é essencial que se melhore o desempenho do animal, ao mesmo tempo em mantenha condições favoráveis para longevidade das plantas forrageiras que estão sofrendo desfolha (manutenção de quantidade de folhas suficientes para garantir rebrotação rápida e vigorosa) (Genro; Silveira, 2018).

Assim, com o adequado manejo adotado, conseguindo garantir a produção de forragem no período das águas o resultado da produção é de aumentar a taxa de lotação e o ganho de peso por área. O intuito de intensificar a produção é uma necessidade nos dias atuais dentro da porteira, pois dessa forma poderá haver uma diluição dos custos fixos de produção e diminuindo o tempo de permanência dos lotes de animais na propriedade gerando um aumento na produção de arrobas/ha/ano. Fernandes et al. (2010) defendem que para conseguir reduzir a idade de abate dos bovinos mantidos em pasto para 22 meses, seria necessário que o ganho médio diário dos animais no período das águas fosse acima de 0,8 kg/dia. Algumas práticas de manejos podem ser adotadas para alcançar esse objetivo, uma delas, seria com adubação nitrogenada para otimizar a produção de forragem e outra o uso de suplementação dos animais para otimizar o desempenho dos animais.

No mercado há 35 anos, a *Brachiaria brizantha* (A. Rich.) Stapf. cv. Marandu tem se destacado nas áreas cultivadas dos pastos brasileiros e fazer parte do capim do gênero

35 *Brachiaria*, que são as forrageiras mais utilizadas como volumoso na dieta de bovinos criados
36 em sistemas de produção em pasto.

37 O manejo adequado das pastagens também está atrelado ao uso de adubações de
38 estabelecimento e manutenção de acordo com as exigências da planta forrageira e do nível
39 tecnológico do sistema de produção. O nitrogênio é o nutriente mais impactante em termos de
40 ganhos, na produção de forragem. Sua utilização é imprescindível para a manutenção da
41 produtividade e da sustentabilidade da pastagem, sendo sua deficiência considerada um fator
42 relevante para desencadear o processo de degradação (Faria et al., 2015; Viana et al., 2011).

43 O uso de suplementação proteica ou energética tem apresentado resultados excelentes
44 no desempenho animal quando comparadas com a suplementação mineral, compensando as
45 perdas decorrentes nos períodos de baixa produção (Goes et al., 2003).

46 Outra preocupação que tem chamado atenção do mundo é às mudanças do clima no
47 planeta, principalmente, as relacionados com as emissões de dióxido de carbono (CO₂), o
48 principal dos gases do efeito estufa (GEE) (Carvalho et al., 2010). Parece que a intensificação
49 do uso das pastagens de modo adequado traz benefícios relacionados ao sequestro de carbono
50 (C) atmosférico, o que contribuiria para minimizar o aumento do efeito estufa e suas
51 consequências ao meio ambiente devido ao aquecimento global. Apesar dos estudos
52 mostrarem o potencial das pastagens cultivadas para sequestrar CO₂ atmosférico (Soussana et
53 al., 2007), não existe praticamente nenhuma informação sobre metas de manejo do pastejo
54 para reduzir os efeitos de gases do efeito estufa, e ao mesmo tempo garantir sistemas de
55 produção de bovinos eficiente (Braga, 2010).

56 Diante disso o presente trabalho é composto por três capítulos, sendo o primeiro uma
57 revisão de literatura, o segundo e o terceiro capítulos apresentados na forma de artigo
58 científico, redigido de acordo com normas da revista Grass and Forage Science, intitulados
59 “Estoque de carbono do solo, estrutura do pasto e produtividade de novilhas em capim-
60 marandu manejado sob lotação contínua no bioma Cerrado e Estrutura do pasto, desempenho
61 de novilhos de corte e estoque de carbono em pastos de capim-marandu no bioma Cerrado”,
62 respectivamente.

63

64 **2. REVISÃO DE LITERATURA**

65 **2.1 *Brachiaria brizantha* (A. Rich.) Stapf. cv. Marandu**

66 As principais espécies de forrageiras que compõem as pastagens do Brasil e de maior
67 valor agrônômico são originárias da África Oriental, sendo a *B. brizantha* a de maior
68 utilização devido a maior intensidade de coleta dessa forrageira e por ela possuir o maior

69 número de representantes nas coleções de germoplasma (Valle et al., 2008). Os historiadores
70 contam que essa forrageira chegou ao Brasil junto com os escravos nos navios, pois elas
71 serviam de colchão para eles deitarem de forma mais confortável no chão das embarcações.

72 As gramíneas do gênero *Brachiaria* ocupam cada vez mais os territórios de pastagens
73 brasileiros, pois se adaptam as mais variadas condições de solo e clima, gerando produções
74 satisfatórias de forragem em solos com baixa e média fertilidade (Soares Filho, 1994). A área
75 de maior plantio e cultivo da *Brachiaria* se encontra na região Centro-Oeste, estando sujeitas
76 a grandes alterações de estacionalidade de temperatura e umidade. O período chuvoso da
77 região tem como características elevadas temperaturas e índices pluviométricos, dessa forma,
78 altas taxas de evapotranspiração (Costa et al., 2005).

79 Nessa região do Brasil, as forrageiras são bem expostas a estacionalidade o que
80 caracteriza por mudanças de disponibilidade e qualidade da forragem em respostas das
81 condições climáticas, isso evita que elas tenham um crescimento uniforme durante o ano
82 (Reis; Rosa, 2001).

83 A *Brachiaria brizantha* (A. Rich.) Stapf. cv. Marandu recebeu esse nome, pois
84 Marandu significa “novidade” no idioma guarani, foi que melhor lhe representava, dando
85 destaque a essa nova opção de forrageira para o Cerrado (EMBRAPA, 1984). A cultivar se
86 mostrou resistente ao ataque de cigarrinhas-das-pastagens, bom valor nutritivo, alta produção
87 de massa verde, alta produção de sementes viáveis e apresentou grandes perspectivas de
88 utilização nas fases de desmama e engorda de bovino.

89 A cultivar Marandu é uma forrageira perene de hábito de crescimento cespitoso e
90 forma touceira de até 1,0m de diâmetros e perfilhos com altura de até 1,5m, seus rizomas são
91 curtos duros, curvos, cobertos por escamas glabras de cor amarela e púrpura, as raízes
92 alcançam boa profundidade, o que lhe garante longevidade nos períodos seco do ano
93 prolongado (Guerra Filho, 2012).

94 A cv. Marandu não suporta solos encharcados, o que a torna recomendada para áreas
95 de media a boa fertilidade, embora tolere acidez do solo. A temperatura ótima para seu
96 desenvolvimento fica entre 25 a 30°C, sendo 15°C o mínimo para limitar o seu crescimento,
97 mesmo a forrageira tolerar bem a ocorrência de geada (Skerman; Riveros, 1992).

98 No entanto o valor nutritivo de uma forrageira não é conseguido só pela fertilidade do
99 solo, condições climáticas, idade e manejo que é submetida, mas também é avaliado pela sua
100 digestibilidade e pelos seus teores de proteína bruta (PB) e de parede celular, ou seja, baixo
101 valor nutritivo esta associado com menores teores de PB e de minerais, e alto conteúdo de
102 fibra (fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e a baixa

103 digestibilidade (Costa et al., 2005; Van Soest, 1994)). Fernandes et al. (2010) trabalhando
104 com *Brachiaria brizantha* cv. Marandu para bovinos de corte no período das águas e seco do
105 ano observaram independentemente do período, a composição química da forragem
106 disponível permaneceu constante (FDN=70%; FDA=40%), porém, a PB apresentou variação
107 ao longo do ano (12% no início das chuvas, 13% no final das águas e 8% durante período de
108 seca). No entanto com as mudanças climáticas, se faz necessárias pesquisas nesses períodos
109 quando as pastagens são pastejadas de forma mais ou menos intensa.

110

111 **2.2 Pastagens brasileiras**

112 A formação das pastagens da início a eficiência da produção animal, pois o pasto se
113 torna o principal insumo da pecuária brasileira, o que a obriga se apresentar com
114 produtividade, qualidade, aceitabilidade da forragem produzida e longevidade, algumas
115 formas para que esses objetivos sejam alcançados foram descritos por Kichel; Kichel (2001) e
116 Amaral et al., (2012):

117 - Realizar o diagnóstico da área: seja ela realizada por análise química e física,
118 classificação de solo, clima, topografia, pragas, plantas invasoras, impedimentos físicos ou
119 mecânicos, histórico da área e outros, para a escolha da espécie forrageira mais adaptada e
120 produtiva nas condições edafoclimáticas existentes em uma região específica;

121 - Considerar a produtividade desejada, o nível tecnológico a ser adotado, o objetivo da
122 produção e a época de utilização da espécie forrageira. Também devem ser adotadas práticas
123 de limpeza da área, conservação, preparo do solo, correção da acidez (calagem) e fertilização
124 do solo com macro e/ ou micronutrientes (as quantidades a serem utilizadas dependem da
125 espécie forrageira e do nível de produtividade desejado);

126 - Semear e/ou plantar espécie adequada e época da operação, seguido do controle de
127 pragas e de plantas invasoras;

128 - Adubar na formação com macro e/ou micronutrientes;

129 - Adubação de manutenção (com macro e/ou micronutrientes) a ser utilizada
130 anualmente e que está diretamente relacionada à produtividade da pastagem;

131 No entanto, a natureza também tem sua participação, ou seja, as produções das plantas
132 forrageiras possuem sazonalidade de produção, que refletem em suas deficiências
133 nutricionais, sendo esta a base do sistema de criação brasileira e caracteriza a pecuária
134 nacional. Existe um pico de produção no período das águas (verão) e um déficit durante o
135 período seco do ano (inverno), ocorrendo o mesmo em todos os anos.

136 As áreas de pastagens no Brasil tem sofrido uma queda abrupta nas últimas décadas
 137 (Figura 1), sendo que no ano de 1990 possuía aproximadamente 192 milhões de hectares e
 138 decaindo até que no último censo (2018) chegou há um pouco menos de 163 milhões de
 139 hectares, no entanto a produtividade animal por área cresceu nesse período passando de
 140 aproximadamente 1,5 @ ha⁻¹ ano⁻¹ para um pouco mais de 4,5@ ha⁻¹ ano⁻¹ (IBGE, 2019).

141 Segundo Dias-Filho (2014) a justificativa para o baixo crescimento médio das áreas de
 142 pastagens nas últimas três décadas foi devido principalmente pela expansão das áreas
 143 agrícolas, de reflorestamento e da urbanização sobre as áreas originais de pastagem.

144

145

146 Figura 1. Evolução da área de pastagens e da produtividade da pecuária brasileira (IBGE,
 147 2019).

148

149 Manejar corretamente a pastagem é um investimento primordial para mantermos a
 150 sustentabilidade da pecuária e aumentar os ganhos de produtividade. O governo possui ações
 151 implementadas para incentivar a recuperação de pastagens degradadas, dentre eles, o
 152 programa ABC (Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na
 153 Agricultura) tem por objetivo deixar disponíveis recursos financeiros aos produtores rurais
 154 para fazerem o uso de tecnologias mitigadoras de emissões de gases de efeito estufa. A meta
 155 estipulada no programa ABC está à recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens
 156 degradadas e a implantação de 4 milhões de hectares destinados à integração Lavoura-
 157 Pecuária-Floresta (CNA, 2012). Outro Programa, chamado de Mais Carne no Plano Mais
 158 Pecuária (Brasil, 2014) compreende dobrar a capacidade de suporte médio das pastagens, que

159 hoje gira em torno de 1,3 bovinos/hectare, podendo o Brasil produzir 40% mais carne sem a
160 necessidade de expansão da fronteira agrícola além de liberar 46,2 milhões de ha para outras
161 atividades.

162 Diante desse cenário é explícito que o número de produtores existentes e que tem tido
163 crescimento na área tem dado um novo direcionamento a pecuária desenvolvida em sistemas
164 de pastagens, aprimorando e refinando suas técnicas de manejo, com objetivo de alcançar
165 maior produtividade por intensificação dos sistemas (Dias-Filho, 2011; Martha Júnior et al.,
166 2012).

167

168 **2.3 Manejo de pastagens**

169 **2.3.1 Implantação do sistema**

170 No intuito da manutenção e recuperação dos recursos naturais, tem sido visto
171 alterações nos agro ecossistema por meio de adoções de práticas agroecológicas e de
172 conservação do solo (Rocha Júnior et al., 2013). São épocas históricas em que a sociedade
173 tem tido a consciência em exigir produtos que possuam segurança alimentar, que valorize o
174 trabalho do campo e que ainda sejam ambientalmente corretos, de forma com que deixe de
175 existir associações com insustentabilidade produtiva (Theodoro et al., 2011).

176 Rocha Júnior et al. (2013) chamam atenção que pastagens bem manejadas resultam em
177 proteção do solo, com cobertura e combate a processos erosivos do solo, no entanto, quando o
178 manejo ocorre de forma errônea, seja por meio de excesso de pisoteio e a altas taxas de
179 lotação podem, conseqüentemente, tornar as pastagens escassas, gerando sérios problemas do
180 ponto de vista dos conservacionistas, e ainda mais graves, tornar o sistema insustentável no
181 aspecto econômico. Segundo os mesmos autores, os motivos pelas quais tem causado
182 degradação de pastagens são variantes de cada ocasião, pois mais de uma causa pode estar
183 relacionada, portanto, para definir ao certo a causa de degradação é importante que se tenha
184 uma visão holística do problema para que se possam analisar os diversos fatores envolvidos.

185 Macedo (1999) desenvolveu uma representação gráfica do processo de degradação das
186 pastagens cultivadas durante o tempo, onde ela começa diminuindo sua produtividade e vigor
187 devido à diminuição de nitrogênio (N) e fósforo (P) no solo, e depois a degradação da
188 pastagem em si com conseqüente perda de produtividade e qualidade, ataque de invasoras,
189 pragas, e doenças e assim deixando solo descoberto, dando início a degradação do solo
190 através de compactação e erosão, podendo esses ser decorrentes do manejo incorreto.

191 O essencial para entender as respostas das plantas quando submetidas ao pastejo é
192 analisar parâmetros relacionados ecofisiologia dos pastos quando submetidas a regimes de

193 desfolhação. É recomendado é buscar o balanço entre a manutenção de área foliar suficiente
194 para fotossíntese e a colheita de elevadas quantidades de folhas antes que estas venham a
195 senescer, de forma a favorecer uma exploração racional e eficiente das pastagens (Difante et
196 al., 2011).

197 Cada espécie forrageira que é lançada no mercado tem uma categoria, espécie animal e
198 um tipo de solo que ela se adequa melhor, por isso é importante que se tenha atenção quanto a
199 esse item. A *Brachiaria brizantha* foi desenvolvida e recomendada como mais uma opção
200 para solos de média a alta fertilidade, bem drenados, em regiões com ou sem cigarrinhas
201 (Kichel et al., 1999). A qualidade das sementes e as recomendações técnicas de plantio são
202 importantes para ser levado em consideração, assim, o número aproximado de sementes/
203 grama para a espécie é de 150 e a taxa de semeadura de 2,80 kg ha⁻¹ de sementes puras
204 viáveis (Souza, 1993).

205 Com relação com o manejo de pastagem a redução da área foliar provocado pela
206 desfolhação durante o pastejo, reflete em consequências nos carboidratos de reserva, no
207 perfilhamento, no crescimento das raízes e de novas folhas, o que prejudica o seu crescimento
208 (Nascimento Júnior et al., 1994), no entanto intervalo de descanso muito prolongado pode
209 resultar em menor produção de forragem (Peron; Evangelista, 2004), o que torna necessárias
210 pesquisas relacionadas à intensidade de pastejo adotada.

211

212 **2.3.2 Taxas de lotação**

213 A divergência entre a taxa de lotação animal e a capacidade de suporte de uma
214 pastagem pode resultar em degradação da pastagem por não ser possível à planta se recuperar
215 do pastejo, o que torna inevitável que se conheça a capacidade de suporte de uma pastagem
216 para que seja possível estudar pontos-chaves que ajudem a evitar ou até mesmo reverter essas
217 degradações (Allen et al., 2011; Euclides et al., 2019).

218 O ponto adequado da utilização da pastagem, beneficiando a produção animal, sem
219 causar prejuízos entre as espécies que integram a pastagem é definido como a intensidade
220 ótima de pastejo (Peterson, 1961). Por isso, a definição da taxa de lotação é o número de
221 animais mantidos em uma unidade de área por um determinado tempo. Dessa forma é
222 possível definir uma produção animal por área em uma área pastejada em função da produção
223 por animal e da taxa de lotação, resultando na fórmula:

224
$$\text{Produção animal ha}^{-1} = \text{produção por animal} \times \text{número de animais ha}^{-1}$$

225 Nas forrageiras, a determinação da densidade populacional de perfilhos é decorrente
226 dos processos de aparecimento e mortalidade de perfilhos, ou seja, da dinâmica da população

227 e dos padrões de ocorrência combinados (balanço entre morte e aparecimento) (Caminha et
228 al., 2010). A renovação de perfilhos esta diretamente relacionada pela capacidade da planta
229 em repor ou manter perfilhos vivos, e este dependente das características genéticas, fatores de
230 crescimento (água, temperatura, luz e disponibilidade de nutrientes) e estratégias de manejo
231 (Caminha et al., 2010).

232 Quando se tem como princípio fazer o manejo das pastagens com base no ajuste da
233 intensidade de pastejo é possível ter como resultados altos rendimentos por animal e por área
234 (Blaser, 1988; Humphreys, 1997), sendo possível esse tempo de manejo ser expressos de
235 diversas maneiras: pressão de pastejo, oferta de forragem, massa de forragem residual, índice
236 de área foliar (IAF) residual, altura, entre outras (Reis et al., 2009). Independente das
237 maneiras que serão expressas, o objetivo é o mesmo, ajustar a massa de forragem e a taxa de
238 lotação, para que se possa ter o controle simultaneamente da qualidade e da quantidade de
239 forragem para manter a sustentabilidade da produção. A variação da intensidade de pastejo é
240 muito grande, podendo ser de uma hora para ou outra ou de um dia para o outro, mas nunca
241 permanece a mesma, sendo fortemente influenciada pela taxa de consumo pelos animais e
242 pelo crescimento das plantas (Reis et al., 2009).

243 A mesma variação ocorre para a qualidade da forragem (Blaser, 1988), porém o
244 manejo do pastejo busca estabelecer faixas adequadas em função das metas de cada situação.
245 E para que os objetivos sejam alcançados, vale ressaltar o conhecimento das relações entre a
246 intensidade de pastejo, quantidade e qualidade da forragem e o desempenho animal. Mott
247 (1960) determinou a relação exponencial entre o ganho por animal e a taxa de lotação, e a
248 função quadrática entre a produção por área e o número de animais mantidos na pastagem.
249 Com a taxa lotação foi muito baixa, denominado de subpastejo com elevada oportunidade de
250 seleção da dieta, foi observado desempenho por animal superior quando comparado os valores
251 observados na ótima pressão de pastejo (Figura 2).

252

253

254 Figura 2. Relação entre taxa de lotação (X) e ganho por animal (Y) e por área (Z), Mott, 1960.

255

256 No entanto quando a taxa de lotação foi muito alta, denominada a situação de
 257 superpastejo, o ganho por área foi superior quando comparado à pressão ótima de pastejo.

258 Porém, sem o equilíbrio por um período de tempo estendido, esse ganho animal seja
 259 ele individual ou por área, com certeza será comprometido pela queda da quantidade (hipótese
 260 de superpastejo) ou pela qualidade (hipótese de subpastejo) da forragem produzida. Daí, a
 261 importância de se conseguir alcançar o balanço entre a produção de forragem e a taxa de
 262 lotação a ser utilizada no sistema de produção para que o retorno seja alcançado.

263 Flores et al. (2008) trabalhando as intensidades de pastejo com os capins marandu e
 264 xaraés, observando desempenho animal, verificaram que produção de forragem e as
 265 características estruturais obtiveram maiores produções de matéria de forragem seca e verde,
 266 ofertas de matéria seca e de lamina foliares, ganho de peso por animal em ambas as
 267 cultivares em menores intensidades de pastejo (40 cm), no entanto, ao avaliar o ganho de peso
 268 por área as intensidades de pastejo menor e a intermediária (25 cm) resultaram em melhores
 269 índices produtivos.

270

271 2.3.3 Adubação nitrogenada

272 Maiores produções de matéria seca, incremento no valor nutritivo, sobre tudo, no teor
 273 de proteína bruta podem ser alcançados através do aumento da disponibilidade de nitrogênio

274 (N) em sistemas de produção pecuária sobre pastagens tropicais (Campos et al., 2016), e,
275 consequente, aumento na capacidade de suporte da pastagem (Assmann et al., 2004).

276 Quando os nutrientes do solo estão em equilíbrio e em níveis que atendam as
277 exigências do desenvolvimento da forrageira utilizada, o nitrogênio (N) tem papel
278 fundamental no sistema, sendo ele o responsável pela produtividade e sustentabilidade da
279 produção do sistema em pastejo (Euclides et al., 2008).

280 Dentre os vários benefícios da adubação nitrogenada nas pastagens, podemos citar os
281 principais que são: aumentar a produtividade e a qualidade da forragem (Basso et al., 2010);
282 contribuir no rendimento animal mais elevado nas pastagens (Barbero et al., 2010); redução
283 do teor de carboidratos solúveis, proporcionando incremento no teor proteico e diminuindo o
284 teor de fibra (Brennecke et al., 2007); aumentar a densidade da forragem e, especialmente, a
285 disponibilidade de folhas e aumentar a produção de matéria seca do pasto (Paris et al., 2009);
286 e ainda, nutrir os microrganismos do solo que decompõem a matéria orgânica (Malavolta,
287 1980).

288 No entanto, dois aspectos são relevantes no manejo da adubação nitrogenada: a fonte e
289 o parcelamento das doses para diminuir as perdas por volatilização e lixiviação. Respeitando
290 isso, eleva-se o aproveitamento do nitrogênio pela planta, reduz as perdas e contribuiu de
291 maneira mais eficiente à manutenção de taxas de acúmulo mais uniforme de massa seca pela
292 planta (Costa et al., 2010) nos períodos chuvosos. Doses de N foram determinantes para a
293 produção de massa seca de folhas e de colmos mais bainhas em estudos de doses de N e S em
294 áreas de pastagens degradadas (Bonfim-da-Silva; Monteiro, 2006).

295 Bernardi et al. (2018) concluem e chamam a atenção de aumentos consistentes na
296 produção de matéria seca e de proteína bruta são conseguidos através do uso da adubação
297 nitrogenada, mais ainda em relação à proteína bruta, porém, a eficiência do nitrogênio é
298 inversamente proporcional ao aumento nas doses de nitrogênio, o que faz necessário encontrar
299 um equilíbrio entre a importância nutricional e econômica da proteína no sistema de
300 produção.

301 No Brasil a ureia é um dos adubos nitrogenados mais comercializados e utilizados em
302 pastagens com 44 a 46 % de N. O uso dessa fonte apresenta vantagens e desvantagens, dentre
303 elas, pode se citar o menor custo por quilograma, pois apresenta alta concentração de N, é de
304 fácil manipulação e causa menor acidificação no solo, o que a torna potencialmente superior a
305 outras fontes do ponto de vista econômico, mas comumente apresenta maior perda de N por
306 volatilização (Primavesi et al., 2001; Martha Júnior et al., 2004).

307 De maneira geral, Garcez Neto et al. (2002) observaram resultados expressivos das
308 respostas das características morfogênicas e estruturais das pastagens com a utilização de
309 adubação nitrogenada, evidenciando o importante papel do N como ferramenta para manusear
310 a estrutura da planta, possibilitando melhor aplicação dos recursos produtivos no processo de
311 crescimento e desenvolvimento.

312

313 **2.3.4 Suplementação a pasto**

314 A limitação do desempenho animal criados a pasto são resultados das grandes
315 flutuações na quantidade e qualidade da forragem disponível devido a forte sazonalidade de
316 produção ocorrente em países tropicais (Da Silva et al., 2012).

317 Sistema de suplementação no período das águas tem sido cada vez maior, assim, como
318 é feito comumente no período de seca, no sentido de melhorar o ganho de peso dos animais e
319 reduzir a idade de abate, pois no período chuvoso do ano, as forrageiras tropicais não tem
320 conseguido refletir desempenho adequado ao potencial genético dos animais que estão sob
321 pastejo (Cabral et al., 2008).

322 Na época das águas o fator limitante na produção de bovinos não seria a
323 disponibilidade de compostos nitrogenados para as bactérias ruminais, e sim a quantidade de
324 energia que os animais estariam consumindo (Cabral et al., 2008). Nesse raciocínio, realizar o
325 fornecimento de suplementos proteico-energéticos poderia melhorar o aproveitamento das
326 forragens, desde que cuidados relacionados à manutenção do balanço energético/proteico no
327 rúmen, minimizando a ocorrência de efeito substitutivo, ou seja, animal passa ingerir mais
328 suplemento do que a própria pastagem (Oliveira et al., 2007).

329 Para que os bovinos consigam alcançar desempenho satisfatório quando criados a
330 pasto independentemente do objetivo nas propriedades (se destinados à reprodução ou ganho
331 de peso), é essencial que a dieta seja fornecida adequada e balanceada em energia, proteínas,
332 minerais e vitaminas (Molina et al., 2013). Mesmo no período das águas as pastagens podem
333 não conter todos os nutrientes essenciais na proporção adequada que atenda às exigências dos
334 animais, assim, a utilização do uso estratégico de suplementação energética, proteica ou
335 energético-proteica (Barbosa et al., 2007). Nesse período a suplementação de proteína e/ou
336 energia pode contribuir para maior equilíbrio da dieta e, conseqüentemente, melhorar o
337 desempenho animal, agregando mais valor às demandas nutricionais dos animais (Molina et
338 al., 2013). Esse tipo de estratégia de suplementação proteico-energética-mineral é
339 normalmente usado quando as forragens destinadas aos bovinos estão deficientes em

340 nutrientes específicos, buscando maximizar a digestibilidade da forragem disponível para
341 melhor o seu consumo (Barbosa et al., 2007).

342 Foram observados ganhos médio diário (GMD) de 0,535 kg utilizando somente
343 suplementação mineral, e ganhos superiores de 0,655 kg utilizando suplementação proteica-
344 energética com ingestão de 0,17% do PV médio e ganhos de 0,746 kg com suplementação
345 proteica-energética com ingestão de 0,37% do PV médio de em pastos de capim-marandu no
346 período de transição águas-seca (Barbosa et al., 2007). Goes et al. (2003) não observaram
347 diferença significativa no GMD de novilhos em função dos diferentes suplementos em áreas
348 de pastagens de braquiária do brejo (*Brachiaria radicans*) na proporção de 80% e capim
349 gordura (*Melinis minutiflora*) na proporção de 20%, obtendo ganhos médio de 0,880 kg para
350 sal proteinado a base de milho, farelo de trigo e uréia e 0,760 kg de ganho para sal proteinado
351 a base de farelo de trigo e farelo de soja, ganhos superiores a 0,600 kg para o tratamento a
352 base de mistura mineral, esse incremento é devido a utilização dos nutrientes terem sido
353 superiores já que houve melhora proteica o que resultou em melhor desempenho animal
354 ocasionada pela aumento do consumo e da digestibilidade.

355 A escolha da estratégia de suplementação deve ser cuidadosa e baseada em avaliações
356 técnicas, pois os suplementos podem produzir efeito substitutivo, isso contribuiria para
357 aumentar a capacidade de suporte das pastagens, e diminuir o tempo de permanência na
358 fazenda, o que torna o giro mais rápido do capital, assim o fornecimento de suplementos no
359 período das águas se torna uma estratégia que aperfeiçoa e maximiza a produtividade gerando
360 ganhos elevados nos animais (Molina et al., 2008). Cabral et al. (2008) relatam o desempenho
361 de bovino Nelore em pastagens formado pela gramínea *Panicum maximum* cv. Tanzânia⁻¹
362 com o efeito de diferentes níveis de suplementação na estação das águas e não encontraram
363 diferenças estatísticas com o aumento dos níveis de suplementação, no entanto, observaram
364 que o suplemento concentrado com ingestão de 0,4% PV resultou em ganhos de 114 g a mais
365 (GMD=1,110 kg) que o tratamento com apenas sal mineral (GMD=0,990 kg), totalizando 10
366 kg de ganho de peso total a mais no período, refletindo num período de abate de 20 dias antes
367 do grupo de animais controle, os tratamentos de 0,2% e 0,6% PV obtiveram ganhos médios
368 diário de 1,020 e 1,070 kg, respectivamente.

369

370 **2.4 Estoques de carbono no solo**

371 A pecuária representa muito para a economia brasileira além de ter uma importância
372 histórica, mesmo assim, a opinião pública mundial e nacional é que esse setor da produção é
373 uma ameaça ao meio ambiente, apontada como uma das principais responsáveis pelo

374 desmatamento e emissões de gases de efeito estufa (GEE) no Brasil (Cerri, 2007). Mas é
375 necessário ter conhecimento e entender que as pesquisas nesse sentido ainda são muito
376 incertas e não consolidadas tanto com a emissão, como com o sequestro dos GEE relacionado
377 à pecuária nacional (Tonato et al., 2013).

378 O principal gás apontado como responsável pelo efeito estufa mundial é o gás
379 carbônico (CO₂), no entanto, o solo das pastagens tem sido visto como um influenciador e que
380 exerce papel preponderante na dinâmica do carbono no ambiente (Santi et al., 2007). Assim, o
381 principal reservatório temporário de carbono no ecossistema é o solo, pois ele apresenta em
382 média 4,5 vezes mais carbono do que a biota e 3,3 vezes mais do que a atmosfera (Bruce et
383 al., 1999; Lal, 2004). Para Santi et al. (2007) a quantidade de carbono estocado no solo e na
384 biota, são reservatórios e de grande importância para que ocorra o balanço de CO₂ na
385 atmosfera. Utilizar menos os combustíveis fósseis, reduzir as taxas de desmatamento e
386 queima de material vegetal, uso adequado do solo parecem ser as principais estratégias para
387 aliviar a emissão de GEE, além de estratégias de maximização do sequestro de C no solo e na
388 vegetação.

389 Uma parte grande de todo o C orgânico no solo encontra-se na forma de matéria
390 orgânica do solo (MOS) (Carvalho et al., 2010). Entretanto, quando ocorrem práticas de
391 manejo inadequado, esse material orgânico no solo é facilmente decomposto, gerando
392 agravamento no efeito estufa, devido à liberação de GEE, como dióxido de carbono (CO₂),
393 metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O) (Cerri et al., 2007). Caso o manejo do solo esteja sendo
394 realizado de forma adequada, haverá um aumento do estoque de MOS, isso observado em
395 regiões de clima tropical, onde a taxa de decomposição é mais acentuada devido às altas
396 temperaturas e umidade do solo (Six et al., 2002).

397 Corazza et al. (1999) realizaram estudo na região do Cerrado e observaram que a
398 adoção sistemas de plantio direto (SPD), implantações de florestas e de pastagens
399 aumentaram o estoque de C em relação ao Cerrado original (Tabela 1). As justificativas para
400 esses aumento é pela maior taxa de adição de C ao solo, sendo resultante do aumento de
401 produtividade primária do ecossistema causado pelo menor revolvimento do solo.

402 Segundo Carvalho et al. (2010) dependendo do manejo que se adotar no uso da
403 forrageira, os estoques de C no solo podem ser aumentados ou reduzidos nas regiões de
404 Cerrado. Bustamante et al. (2006) analisaram estudos já realizados observaram que a
405 conversão de Cerrado para pastagem, em média, acumula 1,3 Mg ha⁻¹ ano⁻¹ de C, com
406 variação de -0,9 a 3,0 Mg ha⁻¹ ano⁻¹ de C, sendo o manejo adotado das forrageiras resultaram
407 nessa discrepância de resultados. Para esses autores, mesmo se todas as áreas degradadas de

408 pastagens no Cerrado (24 Milhões de ha) fossem recuperadas e houvesse melhoria de manejo
 409 tanto do solo como da forrageira, o resultado consequente, seria de uma taxa estimada de
 410 acúmulo de C no solo de $1,5 \text{ Mg ha}^{-1} \text{ ano}^{-1}$, o que resultaria em acúmulo de 36 Tg ano^{-1} de C.
 411 Com esses resultados Carvalho et al. (2010) chegam à conclusão que na agropecuária o uso de
 412 forma eficiente do solo pelo manejo adequado pode resultar em melhorias no estoque de C no
 413 solo, na vegetação, e assim reduzir a emissão de GEE para a atmosfera, e, como resultado
 414 principal, contribuir para um menor aquecimento global.
 415

Tabela 1. Estoques de C, taxas de acúmulo e perdas na camada de 1 m de profundidade no solo sob Cerrado e sob outros usos e manejo da terra (modificado de Corazza et al., 1999).

Sistema de uso	Estoque de C no solo	Variação em relação ao Cerrado nativo		
		Estoque de C no solo	Tempo	Taxa de acúmulo ou perda
	Mg ha^{-1}		Ano	$\text{Mg ha}^{-1} \text{ ano}^{-1}$
Cerrado	133	-	-	-
Eucalipto	148	+ 15	12	+ 1,25
Pastagem cultivada	150	+17	18	+ 0,94
Grade Pesada	125	- 8	12	- 0,67
Arado de disco	128	- 5	15	- 0,33
Plantio direto	155	+ 22	15	+ 1,47

416

417 Trabalhos realizados na Europa indicaram que o uso de nitrogênio e o consequente
 418 aumento da taxa de lotação, e os respectivos aumentos na emissão de óxido nitroso (N_2O) e
 419 metano (CH_4), potentes gases de efeito estufa, foram compensados pelo grande influxo de
 420 carbono atmosférico para o solo, o que caracteriza que nessas áreas de pastagens com esses
 421 manejos, foram áreas com prováveis minimizadoras do efeito estufa (Soussana et al., 2007).

422 Devido a essas inconsistências de informações e a importância econômica e social da
 423 pecuária nacional, o setor produtivo de bovinos tem buscado gerar informações técnicas e
 424 científicas com mais certezas, e que consigam ter conhecimento mais exato a respeito dos
 425 impactos positivos e negativos dos sistemas de produção nos trópicos, e assim identificar
 426 meios de que a produção minimize os impactos da pecuária no meio ambiente (Tonato et al.,
 427 2013).

428 Como visto nessa Revisão de Literatura, os novos cenários do setor agropecuário
 429 aliado às mudanças climáticas se faz necessário novas pesquisas envolvendo cultivares

430 comumente utilizada como forrageira na produção de proteína animal para verificar se seu
431 comportamento e produção de alguma forma tem sofrido mudança com os métodos de manejo
432 utilizados por parte dos produtores.

433 Diante disso, adiante serão apresentados 2 artigos científicos com intuito de verificar o
434 efeito da taxa de lotação animal no estoque de carbono no solo, na estrutura do pasto e no
435 desempenho de bovinos em capim-marandu em pastagens no Cerrado, procurando englobar a
436 relação solo-planta-animal. Artigo 1, intitulado “**Estoque de carbono do solo, estrutura do**
437 **pasto e produtividade de novilhas em capim-marandu manejado sob lotação contínua no**
438 **bioma Cerrado**”; e artigo 2, “**Estrutura do pasto, desempenho de novilhos de corte e**
439 **estoque de carbono em pastos de capim-marandu no bioma Cerrado**”.

440

441 3. REFERÊNCIAS

442 ALLEN, V. G.; BATELLO, C.; BERRETTA, E. J.; HODGSON, J.; KOTHMANN, M.; LI,
443 X.; MCLVOR, J.; MILNE, J.; MORRIS, C.; PEETERS, A.; SANDERSON, M. An
444 international terminology for grazing lands and grazing animals. **Grass and Forage Science**,
445 v. 66, p. 2-28, 2011.

446 AMARAL, G. F.; CARVALHO, F. A. A. de; CAPANEMA, L. X. L.; CARVALHO, C. A. D.
447 de. Panorama da pecuária sustentável. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
448 Social, BNDS setorial, n. 36, p. 249-288, 2012.

449 ASSMANN, A. L.; PELISSARI, A.; MORAES A.; ASSMANN, T. S.; OLIVEIRA, E. B.;
450 SANDINI, I. Produção de gado de corte e acúmulo de matéria seca em sistema de integração
451 lavoura-pecuária em presença e ausência de trevo branco e nitrogênio. **Revista Brasileira de**
452 **Zootecnia**, v. 33, p. 37-44, 2004.

453 BARBERO, L. M.; CECATO, U.; LUGÃO, S. M. B.; GOMES, J. A. N.; LIMÃO, V. A.;
454 ABRAHÃO, J. J. S.; ROMA, C. F. C. Produção animal e valor nutritivo da forragem de
455 pastagem de coastcross consorciada com amendoim forrageiro. **Arquivo Brasileiro de**
456 **Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 62, n. 3, p. 645-653, 2010.

457 BARBOSA, F. A.; GRAÇA, D. S.; MAFFEI, W. E.; SILVA JÚNIOR, F. V.; SOUZA, G. M.
458 Desempenho e consumo de matéria seca de bovinos sob suplementação protéica-energética
459 durante a época de transição água-seca. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e**
460 **Zootecnia**, v. 59, n. 1, p. 160-167, 2007.

- 461 BASSO, K.C.; CECATO, U.; LUGÃO, S.M.B.; GOMES, J. A. N.; BARBERO, L. M.;
462 MOURÃO, G. B. Morfogênese e dinâmica do perfilhamento em pastos de *Panicum maximum*
463 Jacq. cv. IPR-86 Milênio submetido a doses crescentes de nitrogênio. **Revista Brasileira de**
464 **Saúde e Produção Animal**, v. 11, n. 4, p. 976-989, 2010.
- 465 BERNARDI, A., SILVA, A. W. L., BARETTA, D. Estudo metanalítico da resposta de
466 gramíneas perenes de verão à adubação nitrogenada. **Arquivo Brasileiro de Medicina**
467 **Veterinária e Zootecnia**, v. 70, n. 2, p. 545-553, 2018.
- 468 BLASER, R. E. Pasture-animal management to evaluate plants and to develop forage
469 systems. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 9., 1988, Piracicaba. **Anais...**
470 Piracicaba: FEALQ, 1988. p. 1-39.
- 471 BONFIM-DA-SILVA, E. M.; MONTEIRO, F. A. Nitrogênio e enxofre em características
472 produtivas do capim-braquiária proveniente de área de pastagem em degradação. **Revista**
473 **Brasileira de Zootecnia**, v. 35, p. 1289-1297, 2006.
- 474 BRAGA, G. J. Sequestro de carbono em pastagens cultivadas. **Pesquisa & Tecnologia**, v. 7,
475 n. 1, 2010.
- 476 BRASIL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Plano
477 Mais Pecuária, MAPA. Assessoria de Ação Estratégica – Brasília: MAPA/ACS. 32p. 2014.
- 478 BRENNECKE, K.; SILVA, N. M. A.; MACIEL, J. C.; BOAS, W. S. V.; RODRIGUES, R.
479 C.; LIMA, C. G.; LACERDA, R. S.; FERRAS, M. R. Efeitos de doses de sódio e nitrogênio
480 na digestibilidade *in vitro* do capim-coast cross (*Cynodon dactylon* (L.) Pers.), em duas idades
481 de corte no verão de 2001/02. **BIA: Boletim da Indústria Animal**, v. 64, n. 3, p. 185-190,
482 2007.
- 483 BRUCE, J. P.; FROME, M.; HAITES, E.; JANZEN, H.; LAL, R. Carbon sequestration in
484 soils. **Journal of Soil and Water Conservation**, Ankeny, v. 5, p. 382-389, 1999.
- 485 BUSTAMANTE, M. M .C.; CORBEELS, M.; SCOPEL, E.; ROSCOE, R. Soil carbon and
486 sequestration potential in the Cerrado Region of Brazil. In: LAL, R.; CERRI, C.C.;
487 BERNOUX, M.; ETCHEVERS, J. & CERRI, C.E.P. **Carbon sequestration in soils of Latin**
488 **America**. New York, Haworth, 2006. p. 285-304.
- 489 CABRAL, L. S.; ZERVOUDAKIS, J. T.; COPPEDÊ, C. M.; SOUZA, A. L.; CARAMORI
490 JÚNIOR, J. G.; POLIZEL NETO, A; OLIVEIRA, I. S. Suplementação de bovinos de corte

- 491 mantidos em pastagem de *Panicum maximum* cv. Tanzânia⁻¹ no período das águas. **Revista**
492 **Brasileira de Saúde e Produção Animal**, v. 9, n. 2, p. 293-302, 2008.
- 493 CAMINHA, F. O.; SILVA, S. C.; PAIVA, A. J.; PEREIRA, L. E. T.; MESQUITA, P.;
494 GUARDA, V. D. A. Estabilidade da população de perfilhos de capim-marandu sob lotação
495 contínua e adubação nitrogenada. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 45, n. 2, p.
496 213-220, 2010.
- 497 CAMPOS, F. P.; NICÁCIO, D. R. O.; SARMENTO, P.; CRUZ, M. C. P.; SANTOS, T. M.;
498 FARIA, A. F. G.; FERREIRA, M. E.; CONCEIÇÃO, M. R. G.; LIMA, C. G. Chemical
499 composition and *in vitro* ruminal digestibility of hand-plucked samples of Xaraes palisade
500 grass fertilized with incremental levels of nitrogen. **Animal Feed Science and Technology**,
501 v. 15, p. 1-12, 2016.
- 502 CARVALHO, J. L. N.; AVANZI, J. C.; SILVA, M. L. N.; MELLO, C. R.; PELLEGRINO,
503 C. E. Potencial de sequestro de carbono em diferentes biomas do Brasil. **Revista Brasileira**
504 **de Ciências do Solo**, v. 34, p. 277-289, 2010.
- 505 CERRI, C. E. P.; SPAROVEK, G.; BERNOUX, M.; EASTERLING, W. E.; MELILLO, J.
506 M.; CERRI, C. C. Tropical agriculture and global warming: Impacts and mitigation options.
507 **Scientia Agrícola**, v. 64, p. 83-99, 2007.
- 508 CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA. Guia de
509 financiamento para agricultura de baixo carbono. Brasília, DF, CNA, 44 p. 2012.
- 510 CORAZZA, E. J.; SILVA, J. E. D.; RESCK, D. V. S.; GOMES, A. C. Comportamento de
511 diferentes sistemas de manejo como fonte ou depósito de carbono em relação à vegetação de
512 Cerrado. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 23, n. 2, p. 425-432, 1999.
- 513 COSTA, K. A. P.; FAQUIN, V.; OLIVEIRA, I. P. Doses e fontes de nitrogênio na
514 recureparação do capim-marandu. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e**
515 **Zootecnia**, v. 62, n. 1, p. 191-199, 2010.
- 516 COSTA, K. A. P.; ROSA, B.; OLIVEIRA, I. P.; CUSTODIO, D. P.; SILVA, D. C. Efeito da
517 estacionalidade na produção de matéria seca e composição bromatológica da *Brachiaria*
518 *brizantha* cv. Marandu. **Ciência Animal Brasileira**, v. 6, n. 3, p. 187-193, 2005.
- 519 DA SILVA, S. C.; GIMENES, F. M. A.; SARMENTO, D. O. L.; SBRISSIA, A. F.;
520 OLIVEIRA, D. E.; HERNADEZ-GARAY, A.; PIRES, A. V. Grazing behaviour, herbage
521 intake and animal performance of beef cattle heifers on marandu palisade grass subjected to

- 522 intensities of continuous stocking management. **The Journal of Agricultural Science**. v.
523 151, n. 5, p. 727-739. 2012.
- 524 DIAS-FILHO, M. B. **Diagnósticos das pastagens no Brasil**. Embrapa Amazônia Oriental,
525 Belém-PA, Doc. 402, 2014.
- 526 DIAS-FILHO, M. B. Os desafios da produção animal em pastagens na fronteira agrícola
527 brasileira. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, p. 243-252, 2011.
- 528 DIFANTE, G. S.; NASCIMENTO JUNIOR, DOMICIO DO; SILVA, S. C. ; EUCLIDES, V.
529 P. B.; MONTAGNER, D. B.; SILVEIRA, M. C. T.; PENA, K. S. Características
530 morfogênicas e estruturais do capim-marandu submetido a combinações de alturas e
531 intervalos de corte. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, n. 5, p. 955-963, 2011.
- 532 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisa
533 de Gado de Corte, Campo Grande, MS. *Brachiaria brizantha* cv. *Marandu*. Campo Grande,
534 EMBRAPA-CNPGC, 1984. 31p. (EMBRAPA-CNPGC. Documentos, 21).
- 535 EUCLIDES, V. P. B.; MACEDO, M. C. M.; VALLE, C. B.; BARBOSA, R. A.;
536 GONÇALVES, W. V.; OLIVEIRA, M. P. Produção de forragem e características estruturais
537 de três cultivares de *Brachiaria brizantha* sob pastejo. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.
538 43, n. 12, p. 1805-1812, 2008.
- 539 EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; MACEDO, M. C. M.; ARAÚJO, A. R.;
540 DIFANTE, G. S.; BARBOSA, R. A. Grazing intensity affects forage accumulation and
541 persistence of Marandu palisadegrass in the Brazilian savannah. **Grass and Forage Science**,
542 v. 74, n. 3. p. 450-462, 2019.
- 543 FARIA, A. J. G.; FREITAS, G. A.; GEORGETTI, A. C. P.; FERREIRA JÚNIOR, J. M.;
544 SILVA, M. C. A.; SILVA, R. R. Adubação nitrogenada e potássica na produtividade do
545 capim Mombaça sobre adubação fosfatada. **Journal of Bioenergy and Food Science**, v. 2, n.
546 3, p. 98-106, 2015.
- 547 FERNANDES, L. O.; REIS, R. A.; PAES, J. M. V. Efeito da suplementação no desempenho
548 de bovinos de corte em pastagem de *Brachiaria brizantha* cv. Marandu. **Ciência e**
549 **Agrotecnologia**, Lavras, v. 34, n. 1, p. 240-248, 2010.
- 550 FLORES, R. S.; EUCLIDES, V. P. B.; ABRAO, M. P. C.; GALBEIRO, S.; DIFANTE, G. S.;
551 BARBOSA, R. A. Desempenho animal, produção de forragem e características estruturais dos

- 552 capins marandu e xaraés submetidos a intensidades de pastejo. **Revista Brasileira de**
553 **Zootecnia**, v. 37, n. 8, p. 1355-1365, 2008.
- 554 GARCEZ NETO, A. F.; NASCIMENTO JUNIOR, D.; REGAZZI, A. J.; FONSECA, D. M.;
555 MOSQUIM, P. R.; GOBBI, K. F. Respostas morfogênicas e estruturais de *Panicum maximum*
556 cv. Mombaça sob diferentes níveis de adubação nitrogenada e alturas de corte. **Revista**
557 **Brasileira de Zootecnia**, v. 31, n. 5, p. 1890-1900, 2002.
- 558 GENRO, T. C. M.; SILVEIRA, M. C. T. **Uso da altura para ajuste de carga em pastagens.**
559 EMBRAPA - Comunicado Técnico, 2018, Bagé-RS, 2018.
- 560 GOES, R. H. T. B.; MANCIO, A. B.; LANA, R. P.; VALADARES FILHO, S. C.; CECON,
561 P. R.; QUEIROZ, A. C.; LOPES, A. M. Desempenho de novilhos Nelore em pastejo na época
562 das águas: ganho de peso, consumo e parâmetros ruminais. **Revista Brasileira de Zootecnia**,
563 Viçosa, v. 32, n. 1, p. 214-221, 2003.
- 564 GUERRA FILHO, P. A. Sensibilidade da *Brachiaria brizantha* cv. Marandu ao excesso de
565 água no solo. Plínio Antônio Guerra Filho. Piracicaba, 2012, **Dissertação** (Mestrado).
566 Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2012.
- 567 HUMPHREYS, L. R. **The evolving science of grassland improvement.** Melbourne:
568 Cambridge University Press, 1997. 261p.
- 569 INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATÍSTICA E GEOGRAFIA - IBGE. **A evolução da**
570 **área de pastagens no Brasil.** Disponível em: <
571 <http://www.rallydapecuaria.com.br/node/1366>>. Acesso em: 26 de out. 2019.
- 572 KICHEL, A. N.; KICHEL, A. G. **Requisitos básicos para boa formação e persistência de**
573 **pastagens.** Gado de Corte Divulga, n. 52. Campo Grande (MS): Embrapa Gado de Corte,
574 ago. 2001. Disponível em: <<http://www.cnpqg.embrapa.br/publicacoes/divulga/GCD52.html>
575 >>. Acesso em: 26 out. 2019.
- 576 KICHEL, A. N.; MIRANDA, C. H. B.; ZIMMER, A. H. Degradação de pastagens e produção
577 de bovinos de corte com a integração agricultura x pecuária. In: SIMPOSIO DE PRODUÇÃO
578 DE GADO DE CORTE, 1., 1999, Viçosa. **Anais...** Viçosa: UFV, 1999. p. 201-234.
- 579 LAL, R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security.
580 **Science**, Washington, v. 304, p. 1623-1626, 2004.
- 581 MACEDO, M. C. M.. 1999. Degradação de Pastagens: Conceitos e Métodos de Recuperação.
582 In: **Anais...** DO SIMPÓSIO SUSTENTABILIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE NO

- 583 BRASIL. Editado por Vilela, Duarte; Martins, Carlos Eugênio; Bressan, Matheus e Carvalho,
584 Limírio de Almeida. Embrapa Gado de Leite. p.137-150.
- 585 MALAVOLTA, E. **Elementos de nutrição mineral de plantas**. São Paulo: Ceres, 1980.
586 251p.
- 587 MARTHA JÚNIOR, G. B.; ALVES, E.; CONTINI, E. Land-saving approaches and beef
588 production growth in Brazil. **Agricultural Systems**, v. 110, p. 173-177, 2012.
- 589 MARTHA JÚNIOR, G. B.; CORSI, M.; TRIVELIN, P. C. O.; VILELA, L.; PINTO, T. L. F.;
590 TEIXEIRA, G. M.; MANZONI, C. S.; BARIONI, L. G. Perdas de amônia por volatilização
591 em pastagem de capim-tanzânia adubada com uréia no verão. **Revista Brasileira de**
592 **Zootecnia**, v. 33, n. 6, p. 2240-2247, 2004.
- 593 MOLINA, P. C.; GRAÇA, D. S.; MOLINA, L. R.; BARBOSA, F. A.; BORGES, A. L. C. C.
594 Suplementação protéico-energética de bovinos de corte durante a época das águas. **PUBVET**,
595 publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia, Londrina, v. 7, n. 1, ed. 224, art. 1489,
596 2013.
- 597 NASCIMENTO JÚNIOR, D.; QUEIROZ, D. S.; SANTOS, M. V. F. Degradação de
598 pastagens, critérios para avaliação. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 11.,
599 1994, Piracicaba. **Anais...** Piracicaba: FEALQ, 1994. p. 107-151.
- 600 OLIVEIRA, R. L.; BARBOSA, M. A. A. F.; GARCEZ NETO, A. F. Limitações nutricionais
601 das forrageiras tropicais, seletividade e estratégias de suplementação de bovinos de corte. In:
602 OLIVEIRA, R. L.; BARBOSA, M. A. A. F. (Ed.). **Bovinocultura de corte: desafios e**
603 **tecnologias**. Salvador: EDUFBA, 2007. p. 357-380.
- 604 PARIS, W.; CECATO, U.; BRANCO, A. F.; BARBERO, L. M.; GALBEIRO, S. Produção
605 de novilhas de corte em pastagem de Coastcross-1 consorciada com *Arachis pintoi* com e sem
606 adubação nitrogenada. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 38, n. 1, p. 122-129, 2009.
- 607 PERON, A. J.; EVANGELISTA, A. R. Degradação de pastagens em regiões de cerrado.
608 **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 28, n. 3, p. 655-661, 2004.
- 609 PETERSON, R. G. Carga animal e intensidade de pastoreio. In: São Paulo, Departamento de
610 produção animal. **Fundamentos de manejo de pastagens**. São Paulo, 1961. p. 109-112.
- 611 PRIMAVESI, O.; CORRÊA, L. A.; PRIMAVESI, A. C. **Adubação com uréia em pastagem**
612 **de *Cynodon dactylon* cv. Coastcross sob manejo rotacionado: eficiência e perdas**. São
613 Carlos, Embrapa Pecuária Sudeste, 2001. 42p.

- 614 REIS, R. A.; ROSA, B. Suplementação volumosa: conservação do excedente das pastagens.
615 In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 18., 2001, Piracicaba. **Anais...**
616 Piracicaba: FEALQ, 2001. p. 193-232.
- 617 REIS, R. A.; RUGGIERI, A. C.; CASAGRANDE, D. R.; PASCOA, A. G. Suplementação da
618 dieta de bovinos de corte como estratégia do manejo das pastagens. **Revista Brasileira de**
619 **Zootecnia**, v. 38, p. 147-159, 2009.
- 620 ROCHA JUNIOR, P. R.; SILVA, V. M.; GUIMARÃES, G. P. Degradação de pastagens
621 brasileiras e praticas de recuperação. **Enciclopédia Biosfera**, Centro Cientifico Conhecer –
622 Goiânia, v. 9, n. 17, p. 952, 2013.
- 623 SANTI, A.; DALMAGO, G. A.; DENARDIN, J. E. **Potencial de sequestro de Carbono**
624 **pela agricultura brasileira e a mitigação do efeito estufa**. Passo Fundo: Embrapa Trigo,
625 2007. p. 8 (Embrapa Trigo. Documentos Online, 78). Disponível em: <
626 http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do78.html > Acesso em: 30 out. 2019
- 627 SIX, J.; FELLER, C.; DENEFF, K.; OGLE, S. M.; MORAES, J. C.; ALBRECHT, A. Soil
628 organic matter, biota and aggregation in temperate and tropical soils – Effects of no-tillage.
629 **Agronomie**, v. 22, p. 755-775, 2002.
- 630 SKERMAN, P. J.; RIVEROS, F. **Gramíneas tropicales**. Roma: FAO, 1992. 832p.
631 (Coleccion FAO: Produccion y proteccion vegetal, 23).
- 632 SOARES FILHO, C. V. Recomendações de espécies e variedades de *Brachiaria* para
633 diferentes condições. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM 11., 1994,
634 Piracicaba. **Anais...** Piracicaba: FEALQ, 1994. p.25-48.
- 635 SOUSSANA, J. F.; ALLARD, V.; PIGAARD, K.; AMBUS, P.; AMMAN, C.; CAMPBELL,
636 C.; CESCHIA, E.; CLIFTON-BROWN, J.; CZOBEL, S.; DOMINGUES, R.; FLECHARD,
637 C.; FUHRER, J.; HENSEN, A.; HORVATH, L.; JONES, M.; KASPER, G.; MARTIN, C.;
638 NAGY, Z.; NEFTEL, A.; RASCHI, A.; BARONTI, S.; REES, R. M.; SKIBA, U.; STEFANI,
639 P.; MANCA, G.; SUTTON, M.; TUBA, Z.; VALENTINI, R. Full accounting of the
640 greenhouse gas (CO₂, N₂O, CH₄) budget of nine European grassland sites. **Agriculture,**
641 **Ecosystems and Environment**, 121, p. 121-134, 2007.
- 642 SOUZA, F. H. D. **O papel das sementes no estabelecimento e na formação de pastagens.**
643 Campo Grande: EMBRAPA-CNPGC, 1993, 111p.

- 644 THEODORO, V. C. A.; CASTRO, F. P.; ABURAYA, F. H. Indicadores ecológicos de
645 sustentabilidade de unidades de produção agrícola do assentamento Facão – Cáceres, MT,
646 Brasil. **Revista Brasileira de Agroecologia**. v. 6, n. 3, p. 21-33, 2011.
- 647 TONATO, F.; MUNIZ, A. W.; BARIONI, L. G.; FREUA, M. C. Balanço de carbono em
648 sistemas de produção de bovinos nos trópicos. In: II SIMPÓSIO MATOGROSSENSE DE
649 BOVINOCULTURA DE CORTE, 2013, Sinop, **Anais...** Sinop: UFMT, 2013.
- 650 VALLE, C. B.; SIMIONI, C.; RESENDE, R. M. S.; JANK, L.; CHIARI, L. Melhoramento
651 Genético de *Brachiaria*. In: RESENDE, R.M.S.; VALLE, C.B.; JANK, L. **Forrageiras**
652 **Tropicais**. Campo Grande, 2008. cap. 1, p. 13-54.
- 653 VAN SOEST, P. J. **Nutritional ecology of the ruminant**. 2. ed. Ithaca: Cornell University
654 Press, 1994. 446 p.
- 655 VIANA, M. C. M.; FREIRE, F. M.; FERREIRA, J. J.; MACÊDO, G. A. R.; CANTARUTTI,
656 R. B.; MASCARENHAS, M. H. T. Adubação nitrogenada na produção e composição química
657 do capim-braquiária sob pastejo rotacionado. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, n. 7, p.
658 1497-1503, 2011.

ARTIGO 1

Estoque de carbono do solo, estrutura do pasto e produtividade de novilhas em capim-marandu manejado sob lotação contínua no bioma Cerrado

Soil carbon stock, pasture structure and heifer productivity in marandu grass managed under continuous stocking in the Cerrado biome

AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT).

Conflitos de Interesse

Os autores declaram não conflito de interesse.

Resumo

Objetivou-se avaliar o efeito das taxas de lotação animal no estoque de carbono, na estrutura do pasto e na produtividade animal em pastos de capim-marandu manejado sob lotação contínua no bioma Cerrado. As taxas de lotação foram 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹ com três repetições, no período de outubro de 2017 a março de 2018. Foram utilizadas 30 novilhas de desmame. Os pastos foram formados pela *Brachiaria brizantha* cv. Marandu. Avaliou estoque de carbono no solo, características estruturais, produtivos, composição química do pasto e o desempenho animal. A maior produção de massa verde média observada foi com 0,8 UA ha⁻¹ (14554,16 kg ha⁻¹). As médias de massa seca total foram de 5861,98; 4584,57; 4638,88 e 3185,67 kg MS ha⁻¹ nos pastos com 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹, respectivamente. Foram observadas médias de ganho médio diário por área passando de 1,206 para 3,660 kg ha⁻¹ dia⁻¹ e GPT por área de 213,52 para 647,80 kg ha⁻¹ nas taxas de lotação de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹. Em abril de 2018, os pastos com taxas de lotações distintas apresentaram estoques de carbono orgânico total e associado aos minerais superiores aos observados na área de vegetação nativa (21,71 e 15,62 t ha⁻¹, respectivamente). Realizar o manejo de pastejo sob lotação contínua entre 1,6 e 2,4 UA ha⁻¹ de novilhas encontra-se equilíbrio de produção de forragem, ganho médio diário e por área de peso vivo recebendo suplemento proteico energético e adubação de manutenção de 150 kg de N ha⁻¹ ano⁻¹.

693 **PALAVRAS-CHAVE:** altura de pastejo, gases efeito estufa, massa de forragem, marandu,
694 sequestro de carbono

695

696 **Abstract**

697 The objective was to evaluate the effect of animal stocking rates on carbon stock, pasture
698 structure and animal productivity in marandu grass pastures managed under continuous
699 stocking in the Cerrado biome. Stocking rates were 0.8; 1.6; 2.4 and 3.2 AU ha⁻¹ with three
700 replications, from October 2017 to March 2018. 30 weaning heifers were used. Pastures were
701 formed by *Brachiaria brizantha* cv. Marandu. It evaluated soil carbon stock, structural and
702 productive characteristics, chemical composition of pasture and animal performance. The
703 highest average green mass production observed was 0.8 AU ha⁻¹ (14554.16 kg ha⁻¹). The
704 averages of total dry mass were 5861.98; 4584.57; 4638.88 and 3185.67 kg DM ha⁻¹ in
705 pastures with 0.8; 1.6; 2.4 and 3.2 AU ha⁻¹, respectively. Average daily gain averages per area
706 were observed, from 1.206 to 3.660 kg ha⁻¹ day⁻¹ and TWG per area from 213.52 to 647.80 kg
707 ha⁻¹ at stocking rates from 0.8 to 3.2 AU ha⁻¹. In April 2018, pastures with different stocking
708 rates showed stocks of total organic carbon and associated minerals higher than those
709 observed in the area of native vegetation (21.71 and 15.62 t ha⁻¹, respectively). Grazing
710 management under continuous stocking between 1.6 and 2.4 AU ha⁻¹ of heifers is a balance of
711 forage production, average daily gain and by area of live weight receiving energy protein
712 supplement and maintenance fertilizer of 150 kg of N ha⁻¹ year⁻¹.

713

714 **KEYWORDS:** grazing height, greenhouse gases, forage mass, marandu, carbon sequestration

715

716 **1 | INTRODUÇÃO**

717 A manutenção da qualidade do meio ambiente e a produtividade agropecuária são
718 determinadas pelo recurso solo (Sharma et al., 2005). Porém, se manejado erroneamente, o
719 carbono orgânico pode ser mineralizado e modificados para a atmosfera na forma de CO₂.
720 Contudo, quando manejado de forma correta, o sistema pode sequestrar C da atmosfera, sendo
721 esta uma importante estratégia regional e global para compensar as emissões de CO₂
722 provenientes do uso de combustíveis fósseis e mitigar as mudanças climáticas (Freitas et al.,
723 2018).

724 O capim-marandu é uma das forrageiras mais utilizadas nos sistemas de produção de
725 ruminantes nas propriedades brasileiras. No entanto, reduções na fertilidade do solo e o
726 manejo de pastejo de forma equivocada desta forrageira têm feito com que o seu potencial

727 ótimo de produção tenha deixado a desejar, sendo necessárias novas pesquisas para que sua
728 eficiência e sustentabilidade continuem com seu grande potencial de produção e
729 produtividade (Flores et al., 2008). A melhoria da fertilidade do solo eleva a produtividade
730 das pastagens e permite intensificar o seu uso com maior taxa de lotação animal. Entre os
731 nutrientes, o nitrogênio é o que mais participa no aumento da produtividade das pastagens,
732 principalmente quando não há limitação dos demais nutrientes necessários ao
733 desenvolvimento das plantas (Lugão et al., 2003).

734 Dessa maneira, é preciso unir altas produções de forragem e perenidade dos pastos
735 com elevada produção animal através do manejo correto da desfolhação e do estabelecimento
736 de um equilíbrio que se leve em consideração os limites específicos de cada espécie de
737 gramínea, pois somente após a interação estável da forrageira e o ambiente na pastagem, o
738 componente animal como ferramenta de produção se torna importante (Gomide et al., 2007).

739 A massa de forragem e a estrutura do dossel são um dos efeitos do processo de pastejo
740 que irá determinar o desempenho animal (Cosgrove, 1997). Pensando nisso, adotar um tipo de
741 manejo terá influencia direta na estrutura do pasto, e esta, por sua vez, irão refletir na ingestão
742 de forragem e na produção animal (Palhano et al., 2005; Flores et al., 2008). Principalmente
743 em sistemas de produção em que o animal permanece na área durante todo o tempo, ou seja,
744 quando o pasto esta sob lotação contínua, a desfolha continua de forma intensa ou mais leve
745 irá promover mudanças na produção de forragem e no valor nutritivo das forrageiras
746 consumidas.

747 Mudanças na estrutura dos pastos estão intimamente ligadas aos processos de busca e
748 apreensão da forragem pelo animal que esta pastejando (Carvalho et al., 2001) e a composição
749 bromatológica relacionada à preferencia e seleção de componentes das plantas para consumo,
750 principalmente as folhas que estarão disponíveis pelo pastejo.

751 Melhorar o consumo e a digestibilidade da forragem disponível seria possível com um
752 sistema de suplementação adequada (Sampaio et al., 2009). As razões para a suplementação
753 de bovinos mantidos em pastagens incluem a correção das restrições nutricionais impostas
754 pelas forrageiras, mesmo no período das águas, com o intuito de melhoria do desempenho
755 animal, o que se justifica quando há objetivo de aumentar as taxas de lotações (Franco et al.
756 2007; Sampaio et al., 2009).

757 Baseado nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito das taxas de lotação
758 animal no estoque de carbono, na estrutura do pasto e na produtividade animal em pastos de
759 capim-marandu manejado sob lotação contínua no bioma Cerrado.

760

761 2. | MATERIAL E MÉTODOS

762 2.1.1 | Local

763 O experimento foi conduzido na Fazenda Escola da Faculdade de Medicina
764 Veterinária e Zootecnia da UFMS, localizada no município de Terenos - MS (20°26'48.2''S
765 54°50'39.2''O e 530 m de altitude) de setembro de 2017 a abril de 2018.

766

767 2.1.2 | Clima

768 Os dados de precipitação e de temperatura (Figura 1), durante o período experimental
769 foram coletados no banco de dados do CEMTEC (Centro de Monitoramento de Tempo, do
770 Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul). Os dados coletados foram separados
771 em dois períodos, sendo um considerando os meses de outubro a dezembro e de janeiro a
772 março.

773 O clima da região, segundo a classificação de Köppen (1948), é do tipo Aw, tropical
774 chuvoso de savana. O período considerado de seca na região é de maio a setembro (30% da
775 precipitação anual), e período das águas de outubro a abril (70% da precipitação anual).

776

777 2.1.3 | Características do solo

778 O solo da área experimental é da classe Latossolo Vermelho Distrófico. As amostras
779 para análise química do solo foram retiradas nas profundidades de 0-20 cm de profundidade
780 em três pontos por piquete. As coletas foram realizadas antes do início do experimento no
781 (setembro de 2017) e após o término do período experimental (abril de 2018) nas áreas de
782 pastagem de capim-marandu e na área de reserva com vegetação nativa (área de Cerrado)
783 (Tabela 1) para comparação de área pastejada e área sem interferência do animal.

784

785 2.1.4 | Preparo da área experimental

786 Os pastos foram formados em fevereiro de 2017 pela *Brachiaria brizantha* Stapf. cv.
787 Marandu, a lanço. Foram semeados 3,5 a 5 kg ha⁻¹ de sementes puras viáveis, em
788 profundidades de 3 a 6 cm. As sementes foram cobertas com passagem de grande niveladora
789 fechada e o solo compactado com rolo compactador. Durante a semeadura foi feita adubação
790 de 80 kg.ha⁻¹ de P₂O₅ na forma de Superfosfato Simples.

791 A área total foi de 6 ha, subdividida em 12 piquetes de 0,5 ha cada que foram
792 utilizados como unidades experimentais.

793 Em junho, julho e agosto de 2017 foram construídos as cercas e instalados os
794 bebedouros nos piquetes. As avaliações iniciaram a partir de outubro de 2017. Antes de dar o

795 início do experimento no 1º e no 2º ano foram realizados os cortes de uniformização em todos
796 os piquetes. No início do período experimental (outubro), no meio (dezembro) e em fevereiro
797 foram feitas adubações de manutenção com 50 kg ha⁻¹ N (nitrogênio) em cada piquete,
798 totalizando 150 kg ha⁻¹ ano⁻¹ de N.

799

800 **2.1.5 | Tratamentos**

801 Os tratamentos constituíram das taxas de lotação inicial de 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹
802 novilhas e em três repetições de área de 1 ha, cada uma.

803

804 **2.1.5.1 | Animais experimentais e manejo nutricional**

805 Foram utilizadas 30 novilhas mestiças Nelore com idade média de 9 meses, e peso
806 vivo médio (PVM) de 203,8 kg, manejadas em pastos de capim-marandu sob lotação contínua
807 e taxa de lotação variável. Em cada área experimental possuía bebedouro para consumo de
808 água a vontade e cochos para suplementação animal. Os animais receberam suplementação
809 proteica energética para bovinos em fase de crescimento e engorda com consumo de 0,3 a
810 0,4% do peso vivo. A composição nutricional do suplemento consistia em 70% de nutrientes
811 digestíveis totais (NDT) estimados, 24% de proteína bruta (PB) e 15,7% de nitrogênio não
812 proteico (NNP), além de macrominerais, microminerais e aditivo. Os animais antes de dar
813 início ao período experimental passaram por período de adaptação ao suplemento recebendo
814 aumento gradativo de suplementação.

815

816 **2.2 | Avaliações realizadas**

817 **2.2.1 | Altura do dossel**

818 O monitoramento da altura do pasto foi realizado semanalmente em todas as unidades
819 experimentais. Em cada unidade experimental foram realizadas medições em 40 pontos
820 representativos à altura média da curvatura das folhas superiores em torno da régua, andando
821 em zigue zague pelo piquete, utilizando-se régua de madeira graduada em centímetros.

822

823 **2.2.2 | Densidade populacional de perfilho (DPP)**

824 As estimativas de densidade populacional de perfilhos foram obtidas com o uso de
825 armações metálicas de 0,25 m² (1 × 0,25 m). A armação metálica era jogada de forma
826 aleatória, quatro vezes por parcela em pontos representativos da condição dos pastos no
827 momento da amostragem. As contagens dos perfilhos foram realizadas a cada 28 dias e todos
828 os perfilhos vivos que estavam no interior da armação metálica eram contados.

829 **2.2.3 | Massa de forragem (MF)**

830 A cada 28 dias foram realizados cortes rente ao solo de 6 amostras de forragem de 1
831 m² por parcela em pontos representativos da área, as quais eram divididas em duas sub-
832 amostras: uma foi seca e pesada para determinação da matéria seca (MS) no momento do
833 corte, e a outra era destinada a separação dos componentes morfológicos da planta: folha
834 (lâmina foliar), colmo (colmo + bainha) e material morto. Tanto a primeira sub-amostra
835 quanto a segunda eram pesados, colocados em sacos de papel, furados e colocados em estufa
836 de 55°C por um período de 72 horas ou até manterem peso constante, após esse período as
837 amostras eram pesadas e moídas para análise bromatológica. A porcentagem de cada
838 componente foi utilizada para estimar as relações folha: colmo (RF: C) e para as estimativas
839 de massa de lâmina foliar e de colmo.

840

841 **2.2.4 | Simulação de pastejo (SP)**

842 A cada 28 dias, três amostradores por 15 minutos ficaram observando o
843 comportamento dos animais em apreenderem a forragem e os locais de preferências dos
844 mesmos. Após esse tempo os amostradores foram caminhando pelo piquete e simulando com
845 a mão como os animais faziam a coleta da forragem em cada piquete. As amostras foram
846 pesadas e levadas para estufa a 55° C por 72 horas até peso constante para estimar o teor de
847 MS. Posteriormente, as amostras foram moídas a 1 mm e analisadas.

848

849 **2.2.5 | Composição química**

850 Foram determinados os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO) da folha,
851 do colmo e do material morto, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido
852 (FDA) e proteína bruta (PB) da folha e do colmo da massa de forragem e da simulação de
853 pastejo, segundo Detmann et al. (2012).

854

855 **2.2.6 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

856 As digestibilidades *in vitro* da matéria seca (DIVMS) da simulação de pastejo e a
857 DIVMS da folha e do colmo (DIVMSC) da massa de forragem foram determinadas de acordo
858 com Ítavo et al. (2015).

859

860 **2.2.7 | Desempenho animal**

861 Todos os animais foram pesados a cada 28 dias, em jejum. Também foi computado o
862 número de dias que os animais permaneceram na pastagem. Os números de animais

863 possibilitaram as estimativas da taxa de lotação e da produção por área e por hectare em cada
864 tratamento. O ganho médio diário (GMD) por animal foi calculado a cada 28 dias pela soma
865 do ganho de peso total no período dividido pelo número de dias no período. A taxa de lotação
866 (TL) foi calculada pelo soma do peso de cada animal no ha dividido por 450 kg.

867

868 **2.2.8 | Estoque de Carbono no solo**

869 No início e no final do período experimental, foram coletadas amostras de solo na
870 camada de 0-20 cm com o uso de um anel volumétrico em cada piquete e na área de Cerrado
871 nativo para se estimar o carbono orgânico. Após a coleta, as amostras foram destorroadas,
872 secas a sombra e passadas em peneira de malha de 2 mm. Uma porção da amostra de solo foi
873 triturada em almofariz e passada em peneira de 0,210 mm. A outra porção da amostra foi
874 destinada para estimar a densidade do solo para ser utilizada no cálculo dos estoques de
875 carbono.

876 Foram analisados os seguintes atributos: carbono orgânico total (COT), carbono
877 orgânico particulado (COp) e carbono orgânico associado aos minerais (COam). Também foi
878 calculado o índice de manejo de carbono (IMC).

879 O COT foi determinado segundo metodologia descrita por Yeomans and Bremner
880 (1988). As frações de COp e COam foram obtidas por meio do fracionamento granulométrico
881 da matéria orgânica do solo (Cambardella and Elliott, 1992). O teor de COp foi quantificado
882 de acordo com metodologia de Yeomans and Bremner (1988). O teor de COam foi
883 determinado a partir da diferença entre COT e Cop.

884 O índice de manejo de carbono (IMC) foi calculado de acordo com a metodologia
885 descrita por Blair et al. (1995). Foi calculado primeiramente do índice de compartimento de
886 carbono (ICC), utilizando a expressão: $ICC = COT_{tratamento} / COT_{referência}$. Em que COT
887 tratamento, correspondeu ao estoque de COT no tratamento avaliado e COT referência
888 correspondeu ao estoque de carbono na área de vegetação nativa do Cerrado. Foi calculado o
889 IL (índice de labilidade) utilizando a expressão $IL = L_{tratamento} / L_{referência}$. Em que L
890 tratamento correspondeu a labilidade da MOS no tratamento avaliado e L referência, a
891 labilidade da MOS na área de vegetação nativa do Cerrado. O L foi calculado pela expressão
892 $L = \text{estoque de carbono na COp} / \text{estoque de COam}$. Estes índices (ICC e IL) foram utilizados
893 para o cálculo do IMC, que foi obtido pela expressão:

894

$$IMC = ICC \times IL \times 100.$$

895 Para determinação dos estoques de COT, COp e COam foram considerados os teores
896 de carbono, a densidade do solo e a espessura da camada de solo considerada, como segue:

897 Estoque de C em $\text{Mg ha}^{-1} = (\text{Teor de carbono em g kg}^{-1} \times \text{densidade do solo em kg dm}^{-3} \times$
 898 $\text{espessura da camada de solo considerada em cm}) / 10.$

899

900 **2.3 | Análises estatísticas**

901 Para o estoque de carbono os resultados foram submetidos à análise de variância e,
 902 quando significativa, as médias dos tratamentos foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (p
 903 $\leq 0,05$). Para a análise estatística utilizou-se o software AgroEstat (Barbosa and Maldonado
 904 Júnior, 2009).

905 Para a estrutura do pasto e desempenho animal os resultados obtidos foram submetidos
 906 à análise de variância de delineamento inteiramente casualizado em regressão linear e
 907 quadrática pelo teste de Tukey ($p < 0,01$) pelo software SAEG VERSAO 9.1 2007.

908

909 **2.3.1 | Modelo matemático**

910 $Y_j = \beta_0 + \beta_1 X_{1j} + \beta_2 X_{2j} + \dots + \beta_k X_{kj} + \epsilon_j$, onde:

911

912 Y_j : representa a variável resposta, para $j = 1, 2, \dots, n$;

913 X_{ij} : denotam as variáveis explicativas, para $i = 0, 1, \dots, k$;

914 β_i : denotam os parâmetros do modelo (ou coeficientes de regressão) a serem estimados;

915 ϵ_j : são os erros aleatórios do modelo supostos independentes e normalmente distribuídos de
 916 média zero e variância σ^2 .

917

918 **3. | RESULTADOS**

919 **3.1.1 | Estrutura do pasto**

920 Houve efeito quadrático ($p < 0,01$) para as alturas de dossel (Tabela 2) nas diferentes
 921 taxas de lotações animal avaliadas no período de janeiro a março, enquanto que no período de
 922 outubro a dezembro foi observado efeito linear decrescente com aumento de UA ha^{-1} . Com
 923 $0,8 \text{ UA ha}^{-1}$ a altura foi de 60,95 cm e decresceu até 43,18 cm na TL de $3,2 \text{ UA ha}^{-1}$.

924 Foi observado efeito linear crescente ($p < 0,01$) para a DPP conforme houve o aumento
 925 de UA ha^{-1} (Tabela 2) janeiro a março e não houve diferença significativa ($p > 0,01$) de outubro
 926 a dezembro, com média de 506 perfilhos/ m^2 . Pastos com $3,2 \text{ UA ha}^{-1}$ de janeiro a março
 927 obtiveram mais perfilhos (687 perfilhos/ m^2) e passaram para 533 com $2,4 \text{ UA ha}^{-1}$, 451
 928 perfilhos com $1,6 \text{ UA ha}^{-1}$ e 352 perfilhos com $0,8 \text{ UA ha}^{-1}$.

929 Foi observado efeito linear decrescente ($p < 0,01$) para massa verde (MV), massa seca
 930 total (MST), massa seca total de folha (MSTF), do colmo (MSTC), do material morto

931 (MSTMM) nos pastos do capim-marandu com o aumento da taxa de lotação animal nos dois
932 períodos avaliados. A maior produção de MV média observada foi com 0,8 UA ha⁻¹
933 (14554,16 kg ha⁻¹). As médias de MST foram de 5861,98; 4584,57; 4638,88 e 3185,67 kg MS
934 ha⁻¹ nos pastos com 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹, respectivamente. Maiores médias de MSTF,
935 MSTC e MSTMM foram encontrados (1610,93; 2511,64 e 2315,39 kg ha⁻¹) em pastos com
936 0,8 UA ha⁻¹ e diminuíram com o aumento para 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹.

937 Não foi observado efeito significativo ($p>0,01$) para a relação folha: colmo (RF: C)
938 nos pastos de capim-marandu com diferentes TL de outubro a dezembro, com média de 0,66
939 (Tabela 2). No período de janeiro a março foi observado efeito linear decrescente ($p<0,01$),
940 passando de RF: C de 0,66 para 0,41 nas TL de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹.

941

942 **3.2 | Composição química da massa de forragem**

943 **3.2.1 | Matéria seca e matéria orgânica (MS e MO)**

944 Não foi encontrado efeito significativo ($p>0,01$) de outubro a dezembro para matéria
945 seca e orgânica da folha (MSF e MOF), matéria seca e orgânica do colmo (MSC e MOC),
946 matéria seca e orgânica do material morto (MSMM e MOMM) e de janeiro a março para as
947 variáveis MOF, MSMM e MOMM (Tabela 3). As médias foram de 34,45 e 90,72% para MSF
948 e MOF, de 34,20 e 95,58% para MSC e MOC, de 68,49 e 91,88% para MSMM e MOMM,
949 respectivamente de outubro a dezembro e de 91,16% de MOF e 63,86 e 92,44% de MSMM e
950 MOMM, respectivamente.

951 Apenas foi observado efeito linear decrescente ($p<0,01$) da composição química do
952 capim dos pastos sob diferentes taxas de lotações de janeiro a março para MSF, MSC e MOC
953 (Tabela 3). Os menores teores de MSF (27,55%), MSC (26,19%) e MOC (94,47%) foram
954 observados em pastos com 3,2 UA ha⁻¹.

955

956 **3.2.2 | Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)**

957 Não houve efeito significativo ($p>0,01$) nos teores médios de FDN da folha e do
958 colmo e FDA da folha e do colmo de outubro a dezembro (Tabela 4), onde as médias nesse
959 período foram de 65,60; 78,69; 36,46 e 58,37%, respectivamente. No entanto, de janeiro a
960 março foram observados efeito lineares negativos de teores de fibra conforme se aumento as
961 UA ha⁻¹. Os maiores teores de FDN da folha e do colmo (70,05 e 81,95%) e FDA da folha e
962 do colmo (40,34 e 61,47%) foram encontrados em pastos com 0,8 UA ha⁻¹.

963

964

965 **3.2.3 | Proteína Bruta (PB)**

966 Foi observado efeito linear positivo ($p < 0,01$) para os teores de PB da folha e do colmo
967 nos dois períodos (Tabela 4). O acréscimo de PB da folha passou de 6,61% para 8,11%;
968 10,04% e 11,06 de outubro a dezembro e de 5,70 para 8,21; 9,94 e 12,22% nas TL de 0,8
969 para 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹, respectivamente de janeiro a março. Os teores de PB do colmo
970 foram de 2,42 para 3,23% de outubro a dezembro e de 2,23 para 5,33% de janeiro a março nas
971 TL de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹.

972

973 **3.2.4 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

974 Não houve efeito significativo ($p < 0,01$) para DIVMS do colmo com média de 48,59 e
975 49,21% no período outubro a dezembro e de janeiro a março, respectivamente (Tabela 4).

976 Efeitos lineares positivos foram observados ($p < 0,01$) na DIVMS da folha nos dois
977 períodos, sendo a TL de 3,2 UA ha⁻¹ os pastos com as melhores DIVMS (75,63 e 72,68%).

978

979 **3.3 | Composição química da simulação de pastejo**

980 **3.3.1 | Matéria seca e matéria orgânica (MS e MO)**

981 Não houve efeito significativo ($p > 0,01$) na MS e MO da simulação de pastejo nos dois
982 períodos avaliados (Tabela 5), com exceção do teor de MS no período de janeiro a março. As
983 médias de outubro a dezembro foram de 28,58 e 93,35% para os teores de MS e MO e para o
984 período de janeiro a março foi de 91,85% para teor de MO.

985 Efeito linear decrescente ($p > 0,01$) foi observado de janeiro a março para o teor de MS
986 da simulação de pastejo, com teores de 31,69; 29,94; 26,99 e 26,18% nas TL de 0,8; 1,6; 2,4 e
987 3,2 UA ha⁻¹, respectivamente.

988

989 **3.3.2 | Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)**

990 Não houve efeito significativo ($p > 0,01$) nos teores de fibra da simulação de pastejo de
991 outubro a dezembro e de janeiro a março (Tabela 5). As médias de outubro a dezembro foram
992 69,53 e 41,60% para os teores de FDN e FDA e para o período de janeiro a março foram de
993 69,32 e 45,55% para FDN e FDA, respectivamente.

994

995 **3.3.3 | Proteína Bruta (PB)**

996 O teor de PB teve aumento significativo ($p < 0,01$) com o aumento da UA ha⁻¹ (Tabela
997 5), sendo o maior teor encontrado de 10,39% em outubro a dezembro e de 12,01% em janeiro

998 a março na TL de 3,2 UA ha⁻¹. Os menores teores médios observados foram na TL de 0,8 UA
999 ha⁻¹ com 7,04% no primeiro período e de 7,06% no segundo período.

1000

1001 **3.3.4 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

1002 Não houve efeito significativo ($p > 0,01$) no coeficiente de DIVMS da SP do capim-
1003 marandu submetido a diferentes taxas de lotações (Tabela 5). A média do coeficiente de
1004 DIVMS foi de 65,84 e 58,53% no primeiro e segundo período, respectivamente.

1005

1006 **3.4 | Desempenho animal**

1007 As médias para o GMD e GPT individuais tiveram efeito linear decrescente ($p < 0,01$) e
1008 as TL inicial e final, GMD e GPT por área tiveram efeito linear crescente com o aumento de
1009 UA ha⁻¹ (Tabela 6). O GMD individual passou de 0,639 para 0,485 kg e o GPV total
1010 individual passou de 113,17 para 85,83 kg ha⁻¹ nas TL de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹,
1011 respectivamente. Foram observadas médias de GMD por área passando de 1,206 para 3,660
1012 kg ha⁻¹ dia⁻¹ e GPT por área de 213,52 para 647,80 kg ha⁻¹ nas TL de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹.

1013

1014 **3.5 | Estoque de carbono no solo**

1015 Os valores médios dos teores de COT, COp e COam para as camadas de 0-20 cm são
1016 apresentados na Tabela 7. Em outubro de 2017 observou-se que a área de vegetação nativa
1017 obteve resultados inferiores de COT (19,50 t ha⁻¹) e COam (14,54 t ha⁻¹) em relação a todos os
1018 tratamentos com lotação animal. O pasto com taxa de lotação de 1,6 UA ha⁻¹ (t ha⁻¹) obteve
1019 resultados superiores de COT (23,47 t ha⁻¹) e COam (20,32 t ha⁻¹) comparados aos demais. Já
1020 para o teor de COp, a área de vegetação nativa foi observada os maiores teores (4,96 t ha⁻¹),
1021 seguido do tratamento com TL de 1,6 UA animais ha⁻¹ (3,16 t ha⁻¹).

1022 Em abril 2018 a área de vegetação nativa obteve os maiores teores de COT (27,64 t ha⁻¹)
1023 ¹), COp (5,47 t ha⁻¹) e Coam (22,18 t ha⁻¹) em relação aos demais tratamentos. Os teores de
1024 COT observados nos tratamentos nas TL de 0,8 e 1,6 UA ha⁻¹ (17,77 e 17,92 t ha⁻¹,
1025 respectivamente) e de COp (2,55 e 2,76 t ha⁻¹) não diferiram entre si, mas foram os menores
1026 em relação às demais TL. O teor de COam foram inferiores nos pastos com TL 0,8, 1,6 e 3,2
1027 UA ha⁻¹ (15,21; 15,16 e 16,99 t ha⁻¹, respectivamente).

1028 Em outubro de 2017, os estoques de COT (24,93 t ha⁻¹) e de COam (18,59 t ha⁻¹) da
1029 vegetação nativa foram inferiores a todos os tratamentos com as taxas de lotações avaliadas
1030 (Tabela 8), sendo 1,6 UA ha⁻¹ o que obteve maiores estoques. No entanto, o estoque de COp
1031 (6,35 t ha⁻¹) e o IMC (100) da vegetação nativa foram superiores quando comparados aos

1032 pastos com diferentes taxas de lotações, sendo as TL de 0,8, 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹ os menores
1033 estoques (3,55; 4,22 e 4,15 t ha⁻¹, respectivamente) e IMC (47,10; 56,56 e 55,87,
1034 respectivamente) observados.

1035 Em abril de 2018, os pastos com taxas de lotações distintas apresentaram estoques de
1036 COT e COam superiores aos observados na área de vegetação nativa (21,71 e 15,62 t ha⁻¹,
1037 respectivamente), com estoques superiores de COam nos tratamentos com menor TL (0,8 e
1038 1,6 UA ha⁻¹). Apesar deste resultado, maiores estoques de COp (6,08 t ha⁻¹) foram verificados
1039 na área de vegetação nativa. Contudo, o IMC da vegetação nativa foi superior (100) as áreas
1040 com pastejo em abril de 2018.

1041

1042 **4. | DISCUSSÃO**

1043 **4.1.1 | Estrutura do pasto**

1044 As menores alturas observadas nos pastos com maior taxa de lotação é resultado da
1045 contínua desfolhação do pasto, pois pastos em que o número de animais é alto, a frequência
1046 de desfolhação se torna elevada e as chances do animal consumir o mesmo perfilho é
1047 aumentado, o que acaba comprometendo as suas folhas e provavelmente o consumo do
1048 meristema apical, refletindo em prejuízo ao crescimento do perfilho (Tabela 2). Paula et al.
1049 (2012) trabalhando com alturas fixas do capim-marandu de 15; 30 e 45 cm conseguiram
1050 colocar 2,8; 2,5 e 2,0 UA para manter essas alturas, respectivamente. Assim, a quantidade de
1051 UA em maior ou menor quantidade em uma área acaba que fazendo o controle da altura do
1052 dossel.

1053 A quantidade de perfilhos/m² pode ser influenciada pelo número de animais presentes
1054 no pasto, pois isso pode aumentar ou diminuir a luminosidade na base do dossel o que ativa as
1055 gemas axilares. Parsons and Chapman (2000) relataram que onde os pastos são mantidos mais
1056 altos, isto resultando de menores intensidades de pastejo a DPP é baixa, enquanto, que quando
1057 aumentada a intensidade de pastejo, conseqüentemente é aumentada a DPP. Outra
1058 característica observada em pastos com intensidade muito grande de desfolha é a presença de
1059 perfilhos com folhas mais curtas, porém maior densidade populacional; à medida que a
1060 intensidade de pastejo diminui é observado aumento das folhas e menores densidades
1061 populacionais de perfilhos, havendo dessa maneira uma compensação do tamanho do perfilho
1062 e a densidade populacional de perfilho nos pastos (Matthew et al., 2000).

1063 Paula et al. (2012) trabalhando com três alturas do capim-marandu (15, 30 e 45 cm)
1064 observaram diferenças significativas (p=0,0001), decrescendo a DPP à medida que se
1065 aumentou a altura de pastejo (973, 759 e 634 perfilhos/m², respectivamente). A justificativa

1066 do menor número de DPP nas maiores alturas de pastejo esta relacionado à competição entre
1067 os perfilhos, pois a quantidade de luz incidente na base do dossel foi menor (544, 240 e 137
1068 $\mu\text{Mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, para 15, 30 e 45 cm, respectivamente). Assim, é possível dizer que o tamanho
1069 da folha, ou seja, a área foliar é controlada pela intensidade de pastejo, determinando assim a
1070 qualidade da radiação que chega à base do dossel e que dessa maneira irá ativar as gemas
1071 axilares resultando em gerações de novos perfilhos (Matthew et al., 2001; Deregibus et al.,
1072 1983).

1073 Sbrissia et al. (2010) estudando a DPP do capim-marandu sob lotação contínua com
1074 taxa de lotação variável em quatro alturas de pastejo (10; 20; 30 e 40 cm) encontraram 1301;
1075 1178; 1059 e 914 perfilhos/ m^2 , respectivamente, no verão e atribuiu esses valores em
1076 consequência da competição pela luz, uma vez que a disponibilidade reduzida de luz na base
1077 do pasto é um dos principais fatores que interferem no processo de perfilhamento dos pastos.

1078 A adubação nitrogenada realizada nesses pastos do capim-marandu submetidos ao
1079 pastejo contínuo pode ter favorecido no aumento do tamanho da folha e do colmo, pois o
1080 nitrogênio (N) é o nutriente fundamental para manutenção da produtividade das gramíneas
1081 forrageiras, sendo útil na formação das proteínas, cloroplastos e outros compostos que
1082 participam ativamente na síntese dos compostos orgânicos constituintes da estrutura vegetal
1083 (Werner, 1986).

1084 As produções de massa, tais como MV, MST, MSTF, MSTC e MSTMM maiores nos
1085 pastos com UA menor ocorreu em decorrência das menores chances do mesmo perfilho ser
1086 consumido, isso proporciona ao perfilho condições de crescerem mais e se tornarem mais
1087 pesados pelos seus componentes serem mais desenvolvidos, assim, conforme vai se
1088 aumentando a taxa de lotação nos pastos a frequência com que o perfilho é pastejado é
1089 aumentado e dessa forma as reduções das massas se tornam uma consequência.

1090 Por ser um pasto de primeiro ano, houve recentemente o revolvimento do solo e
1091 adubação de implantação o que ainda pode ter contribuído para o maior desenvolvimento da
1092 planta.

1093 Foram observados índices médios de precipitação elevados (Figura 1) principalmente
1094 em outubro, novembro e dezembro (228,6; 315,8 e 225,4 mm). A água está envolvida dentro
1095 de um dos fatores abióticos importante para que a planta consiga realizar a fotossíntese, os
1096 demais fatores são temperatura, luz e nutrientes que estão disponíveis no solo. A função da
1097 água não é só de crescimento das plantas, mas sim um recurso utilizado por elas para dissipar
1098 excesso de energia solar captadas pelas folhas (evitando o dessecamento foliar) pelo excesso
1099 de temperatura (Lemaire, 2001). No entanto de uma forma geral a produção das forrageiras é

1100 alcançada com a transformação da energia solar em compostos orgânicos pela fotossíntese,
1101 sendo o dióxido de carbono da atmosfera combinado com água resultando em carboidratos
1102 com a utilização da energia solar (Vieira and Mochel Filho, 2010).

1103 A utilização de N como adubo contribuiu para a produção de MV e MST e
1104 consequentemente das massas dos componentes da planta (folha, colmo e material morto),
1105 pois o N proporciona de forma imediata um aumento na produção de forragem, devido à
1106 quantidade de N que se encontra nos solos, ocasionado pela decomposição da MO não ter
1107 sido suficiente para suprir adequadamente a necessidade das plantas forrageiras (Kluthcouski
1108 and Aidar, 2003). Moreira et al. (2011) observaram produção de MV de 3970,30 kg ha⁻¹ sem
1109 adubação de N e de 4920,03 kg ha⁻¹ adubado com 150 kg de N, no período chuvoso do capim-
1110 braquiária (*Brachiaria decumbens* Stapf. cv. Basilisk) no primeiro ano de avaliação e no
1111 segundo ano observaram 2860,44 kg ha⁻¹ sem adubação e de 4704,01 kg ha⁻¹ com adubação
1112 de 150 kg de N. Esse aumento da MV nos dois anos de avaliação com a adubação de N,
1113 mesmo os pastos mantidos a 20 cm, é justificado pelo uso de N, que resultam em mudanças
1114 na estrutura do dossel, caracterizada pelo maior número de perfilhos vivos (Moreira et al.,
1115 2011).

1116 A MST do capim-marandu nos pastos com diferentes taxas de lotação resultou em
1117 decréscimo linear com o aumento da UA. Isso em razão da pressão de pastejo ser maior
1118 nessas condições devido a elevada quantidade de animais em uma área. Quanto maior o
1119 número de animais na área, a limitação do animal faz com que a seleção pela procura do
1120 alimento seja diminuída e a chance do mesmo perfilho ser pastejado maior quando comparado
1121 em áreas de menor número de animais pastejando.

1122 A baixa concentração de P observados nas áreas com 0,8 e 1,6 UA ha⁻¹ (Tabela 1),
1123 parece não ter afetado a produção de MV e MST, no entanto, os demais nutrientes estão
1124 dentro do adequado para desenvolvimento dessa forrageira. Segundo Macedo (2004) na classe
1125 de textura do solo do experimento, o recomendado de P para que haja crescimento de
1126 forragem o capim-marandu é de 3,3 a 4,8 mg dm⁻³ para manutenção e de 4,1 a 6 mg dm⁻³ para
1127 estabelecimento. Flores et al. (2008) avaliando o capim-marandu em três alturas de pastejo
1128 (15, 30 e 45 cm) não observaram diferenças de produção de MST (3200, 4450 e 5770 kg ha⁻¹,
1129 respectivamente) e justificam o resultado devido ao manejo adotado para manter as alturas
1130 pré-determinadas.

1131 A redução de MSTF observada com o aumento da taxa de lotação animal nos pastos
1132 esta de acordo com a justificativa de Flores et al. (2008), onde se verifica diminuição da
1133 quantidade de folhas nos pastos de maior intensidade de pastejo pelo os animais explorarem

1134 mais os estratos inferiores do dossel, o que faz com que os perfilhos não consigam acumular
1135 maior quantidade de tecido foliar e produzir. Flores et al. (2008) obtiveram menores MSTF do
1136 pasto de capim-marandu (1470; 1220 e 880 kg ha⁻¹) conforme a altura do dossel diminuía (45,
1137 30 e 15 cm). Em pasto formado pela cv. Xaraés foi observado decréscimo na MSTF (1505 e
1138 740 kg ha⁻¹) da altura de 40 para 25 cm do dossel, no entanto, nas alturas de 25 e 15 cm do
1139 dossel foram observadas produções semelhantes (740 e 590 kg ha⁻¹) sem efeito significativo.
1140 Castro et al. (2013) encontraram resultados semelhantes, pois houve maior participação de
1141 produção de MSTF (2516; 2480; 1563 e 1494 kg MS ha⁻¹) em lotações menores representados
1142 pelas alturas de 60; 45; 30 e 15 cm de altura, respectivamente, do capim xaraés no verão e
1143 2027; 1648; 1385 e 1513 kg MS ha⁻¹ na primavera.

1144 Os resultados encontrados por Castro et al. (2013) estão de acordo com os observados
1145 no presente trabalho para MSTC, no entanto o efeito observado foi quadrático para esta
1146 variável, sendo aumentada a massa seca do colmo (1459; 1916 e 2430 kg MS ha⁻¹) nas alturas
1147 de (15; 30 e 45 cm) e diminuídas (1875 kg MS ha⁻¹) na altura de 60 cm no verão. No entanto
1148 na primavera não houve diferença de MSTC nas alturas avaliadas. Para Fagundes et al. (2006)
1149 a função do colmo é a de sustentação no arranjo espacial da planta em busca de luminosidade,
1150 além de translocação de assimilados para as folhas, importante principalmente em períodos
1151 que favoreçam o crescimento. Assim, devido este motivo que quando tem oportunidade
1152 (menor intensidade de pastejo) as plantas alongam mais o colmo e tem sua produtividade
1153 maior. Pastos com maiores MSTC afetam de forma indesejável no desempenho animal, pois
1154 esta parte do perfilho tem baixa contribuição para a dieta, pois estão diretamente ligado ao
1155 valor bromatológico, como também para a manutenção das partes do perfilho de melhor
1156 qualidade nos pastos, ou seja, as folhas (Castro et al., 2013).

1157 Pasto submetido a menores intensidades de pastejo, devido à baixa taxa de lotação, a
1158 remoção de folhas é diminuída, e a massa de forragem que não foi consumida acaba
1159 senescendo e transformado em material morto, aumentando gradativamente a MSTMM
1160 (Flores et al., 2008), o que pode justificar as maiores MSTMM na lotação menor e ir
1161 diminuindo conforme a lotação passa a ser aumentada. Outra possível explicação é pelo fato
1162 das folhas que estão no topo sombreiam os estratos inferiores dos pastos que estão abaixo
1163 dela, assim atividade fotossintética desse material abaixo é reduzida ou nula e acaba por
1164 senescer os componentes da forragem, o que aumenta a MSTMM em pastos mais altos.

1165 É importante destacar que a RF: C mesmo não ter sofrido efeito significativo de
1166 janeiro a março, esta variável torna-se importante como indicador da facilidade de apreensão
1167 da forragem pelo animal. O que corrobora com Alden and Whitaker (1970) que dizem que a

1168 RF: C pode ser usada igualmente à altura do pasto e a disponibilidade de MS, para indicar o
1169 valor nutritivo da forragem, devido a RF: C dar resultado da facilidade de apreensão de
1170 forragem pelo animal e, dessa forma o seu comportamento durante o pastejo.

1171

1172 **4.2 | Composição química da massa de forragem**

1173 **4.2.1 | Matéria seca e matéria orgânica (MS e MO)**

1174 O efeito linear decrescente com aumento de UA ha⁻¹ para a MSF e MSC de janeiro a
1175 março pode ser explicado devido os dosséis mais altos o colmo ter desenvolvido mais e
1176 consequentemente a porcentagem de colmo ser maior, havendo mais parede celular,
1177 consequentemente, menos águas nessa estrutura e contribuindo para o aumento da MS do
1178 pasto, o que corrobora com Tinker (1981) que diz que a maior transpiração ocorre em folhas
1179 mais velhas.

1180 Um dos fatores limitantes do consumo das plantas pelos animais são os altos teores de
1181 MS em forrageiras ocorrente no período da seca, quando o crescimento é menor em
1182 decorrência do baixo potencial de umidade do solo e ausência de precipitações (Costa et al.,
1183 2005).

1184

1185 **4.2.2 | Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)**

1186 Normalmente valores menores de FDN são encontrados dosséis mais baixo devido a
1187 maior rebrotação que acontece com as plantas nessas condições de manejo de pastejo, já o
1188 dosséis mais altos, são as forragens que foram rejeitadas pelos animais ou não consumidas e
1189 acabam envelhecendo, crescendo mais e obtendo mais parede celular para sua sustentação,
1190 resultando no decréscimo do conteúdo celular (Cano et al., 2004) o que explica o decréscimo
1191 de fibras observado de janeiro a março conforme existe o aumento da taxa de lotação. Os
1192 valores observados estão dentro da faixa citada por Aguiar (1999) onde os teores de FDN de
1193 pastagens tropicais são elevados, normalmente acima de 65% em rebrotas e de 75% a 80% em
1194 estágios mais avançados de maturação. O teor de fibras elevado se torna o maior limitante do
1195 consumo de volumoso, já que valores superiores a 55-60% na MS estão correlacionadas de
1196 forma negativa com o consumo do animal (Van Soest, 1994).

1197 O teor de FDA nos componentes da planta é consequência do teor de FDN, pois parte
1198 do FDN é FDA. O teor de FDA do colmo decresceu com o aumento da taxa de lotação
1199 provavelmente pelos pastos mais rebaixados possuem perfilhos mais novos, portanto,
1200 apresentam maior conteúdo celular e menor parede celular. Nunes et al. (1985) encontraram
1201 teores de FDA na folha de 32,5 a 43,1% nas taxas de lotação de 1,4 a 1,8 UA ha⁻¹ do capim-

1202 marandu e teores de 46,9% a 53,3% de FDA no colmo. Costa et al. (2005) referem-se ao teor
1203 de FDA como um efeito negativo na digestibilidade de um alimento, pois parte da fração da
1204 fibra que é indigestível apresenta uma proporção de FDA.

1205

1206 **4.2.3 | Proteína Bruta (PB)**

1207 O decréscimo linear do teor de PB da folha e do colmo observados nos dois períodos
1208 com a diminuição da taxa de lotação está de acordo com a literatura. O teor de PB da folha
1209 com 0,8 UA ha⁻¹ e todos os teores de PB do colmo estão abaixo do nível crítico de PB que
1210 deve conter na forrageira. Teores recomendados de PB na MS de forma geral por Whiteman
1211 (1980) é de 7%, para vacas em lactação o mínimo é de 15% de PB, e para animais em
1212 crescimento um nível aceitável de pelo menos 11 a 12 % PB. Carloto et al. (2011)
1213 encontraram diferenças estatísticas (p=0,0174) do teor de PB do capim xaraés (12,70; 11,20 e
1214 10,30%) manejados em alturas diferentes (15, 30 e 45 cm, respectivamente), e são justificados
1215 pelos pastos quando mantidos mais altos possuem maiores quantidades de folhas velhas no
1216 dossel, folhas essas não consumidas pelo animal continuam a envelhecer e perder valor
1217 nutritivo. Flores et al. (2008) observando teores de PB de folhas do capim marandu e xaraés
1218 em diferentes intensidades de pastejo encontraram valores semelhantes 9,6% em 15 cm,
1219 11,1% em 30 cm e 10,6% em 45 cm de altura de dossel. Paula et al.(2012) observou maior
1220 teor de PB do colmo (5,0%) do capim marandu manejados na menor altura (15 cm), teor
1221 intermediário (4,2%) a 30 cm e menor teor (3,7%) na altura de 45 cm de altura de dossel. A
1222 justificativa seria que em pastos mais rebaixados (maior taxa de lotação) a rebrotação é maior
1223 nessas condições, o que refletiria em folhas e colmos novos, e que em alturas de dossel mais
1224 alta ou menor intensidade de pastejo, as folhas e colmo envelhecidos teriam menor conteúdo
1225 celular e aumento na parede celular.

1226

1227 **4.2.4 | Digestibilidade *in vitro* da massa seca (DIVMS)**

1228 O efeito linear crescente da DIVMS da folha em função do aumento da UA ha⁻¹ esta
1229 relacionado com os teores de fibras nos componentes das plantas (Tabela 4) e das maiores
1230 porcentagens de folhas mais novas em pastos mais baixos. Conforme a planta envelhece, a
1231 concentração dos componentes potencialmente digestíveis, compreendendo os carboidratos
1232 solúveis, proteína, minerais e outros conteúdos celulares, tende a diminuir, em conjunto com
1233 as proporções de lignina, celulose e hemicelulose, e outras frações indigestíveis, tais como
1234 cutícula e sílica, aumentam, resultando num decréscimo na digestibilidade da forragem
1235 consumida (Euclides et al., 2007).

1236 **4.3 | Composição química da simulação de pastejo**

1237 **4.3.1 | Matéria seca e matéria orgânica (MS e MO)**

1238 Os maiores teores de MS encontrados em pastos com menor taxa de lotação e ir
1239 diminuindo com aumento da UA nos pastos pode ser em decorrência da expansão maior da
1240 folha, obtendo maior área de contato e dessa forma perder mais água por transpiração. O
1241 consumo das plantas pelos animais pode ser limitado pelos altos teores de MS, devido haver
1242 aumento na quantidade de fibras dessas forrageiras, normalmente altos teores são observados
1243 no período de seca, quando a umidade é baixa e pouca precipitação (Costa et al., 2005). Costa
1244 et al. (2005) observaram efeito quadrático do teor de MS da *Brachiaria brizantha* cv.
1245 Marandu no período de maio de 2000 a fevereiro de 2001, onde em maio foi observado média
1246 de 40% de MS na forragem e decaindo com o passar dos meses chegando próximo de 20%
1247 em janeiro de 2001.

1248

1249 **4.3.2 | Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)**

1250 Não houve diferença para FDN e FDA na SP, mas baixos teores de fibras são
1251 considerados importantes para a melhoria do valor nutritivo da forragem e elevar o consumo
1252 de massa seca pelos animais, pelo fato de o teor de fibras serem um parâmetro relevante que
1253 define a qualidade da forragem, e ainda limitar a capacidade ingestiva por parte dos animais
1254 (Teodoro et al., 2012).

1255

1256 **4.3.3 | Proteína Bruta (PB)**

1257 O menor teor de PB (7,04%) encontrado na TL de 0,8 UA ha⁻¹ é em virtude da maior
1258 quantidade de folhas velhas presentes no dossel, uma vez que as folhas rejeitadas pelos
1259 animais continuam a envelhecer (Carloto et al., 2011), no entanto, o teor de PB da SP em
1260 todas as taxas de lotação avaliada está acima do recomendado por Whiteman (1980).
1261 Avaliando pastos de capim-xaraés manejados com diferentes alturas, Carloto et al (2011)
1262 observaram teores de PB de 12,7; 11,2 e 10,3% nas alturas de 15, 30 e 45 cm,
1263 respectivamente.

1264

1265 **4.3.4 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

1266 Mesmo sem ter verificado diferença significativa da DIVMS da SP, França et al.
1267 (2007) dizem que fatores tais como a idade da planta e a altura de corte resultam em maior
1268 quantidade de conteúdo da parede celular e, conseqüentemente, em menores valores de
1269 DIVMS. Avaliando o capim-tanzânia em quatro alturas de corte (28; 56; 84 e 112 dias) e

1270 adubação de 200 kg de N ha⁻¹ ano⁻¹ encontraram DIVMS de 56,92; 56,50; 51,17 e 41,06%,
1271 respectivamente, havendo inferioridade significativa apenas para os 112 dias (França et al.,
1272 2007).

1273

1274 **4.4 | Desempenho animal**

1275 Pastagens com bom valor nutritivo (Tabelas 4 e 5) e produzido em quantidade
1276 suficientes (Tabela 2) para atender exigências dos animais refletem em maior produtividade
1277 animal, podendo ainda ser incrementado pelo uso de suplementações, mesmo nos períodos
1278 chuvosos. Houve maior ganho médio diário individual de PV em pastos com taxa de lotação
1279 menores e foi sendo diminuído conforme se aumentou as UA ha⁻¹. O inverso foi observado
1280 para o GMD por área. No entanto, a adubação nitrogenada utilizada no experimento
1281 beneficiou a intensificação do sistema com o aumento no ganho animal por área, em razão do
1282 incremento das doses de nitrogênio favorecer o aumento da massa de forragem e
1283 consequentemente a maior capacidade de suporte da pastagem (Assmann et al., 2004).

1284 Euclides et al. (2014) observando desempenho animal e taxa de lotação em pastos de
1285 15 e 30 cm de altura encontraram no capim marandu GMD de 0,610 e 0,800 kg cabeça⁻¹, do
1286 capim-xaraés de 0,560 e 0,670 kg cabeça⁻¹ do capim-piatã 0,590 e 0,720 kg cabeça⁻¹,
1287 respectivamente. O ganho por área foi de 430 e 500 kg ha⁻¹ no capim-marandu, 560 e 600 kg
1288 ha⁻¹ no capim-xaraés e 540 e 570 kg ha⁻¹ nas alturas de 15 e 30 cm, respectivamente.

1289 Realizar a suplementação em período chuvoso pode ter contribuído para os altos
1290 ganhos observados em todas as TL avaliada no capim-marandu. O uso de concentrados no
1291 período das águas pode aumentar o desempenho de animais, reduzindo ainda mais a idade de
1292 abate (ou a de primeira cria), na qual as características do suplemento irão depender da
1293 quantidade, do valor nutricional da forragem e do manejo da propriedade (Reis et al., 2009).

1294 Na Figura 2 é possível verificar um ponto de equilíbrio da lotação animal relacionando
1295 o ganho de peso individual do animal e ganho de peso por área, onde para esquerda do ponto
1296 de encontro dos dois ganhos a lotação é baixa e pode haver sub pastejo, excesso de produção
1297 de forragem e para a direita, excesso de lotação animal no pasto e ocasionar super pastejo,
1298 causando prejuízos futuros na produção em quantidade da forragem.

1299

1300 **4.5 | Estoque de carbono no solo**

1301 Os maiores teores de carbono observado na área de vegetação nativa podem ser
1302 atribuídos ao maior e contínuo aporte de resíduos orgânicos bem como a não ocorrência de

1303 ação antrópica. A manutenção da cobertura vegetal em áreas com floresta garante um grande
1304 aporte de resíduos tanto sobre o solo quando sob o solo (raízes) (Denardin et al., 2014).

1305 Apenas em pastos com 2,4 UA ha⁻¹ observaram-se teores de CO_{am} semelhantes aos
1306 observados na área de vegetação nativa. Os maiores teores de carbono observados, nas áreas
1307 sob pastejo, independente da lotação, podem ser atribuídos ao maior e contínuo aporte de
1308 resíduos orgânicos. Em trabalho realizado por Dortzbach et al. (2015), observam que os teores
1309 de COT para as áreas de mata se mostraram sempre superiores em relação à área de pastagem
1310 nas camadas de 0 a 1,0 m.

1311 O COp é a fração da MOS associada à fração areia, assim pode ser caracterizado como
1312 sendo partículas derivadas de resíduos de plantas e hifas, cuja permanência no solo está
1313 condicionada à proteção física desempenhada pelos agregados. Os maiores estoques de COp
1314 obtidos na área de vegetação nativa podem ser justificados pela adição de serapilheira e dos
1315 processos de persistência e decomposição no solo (Roscoe and Machado (2002). Os sistemas
1316 de manejo do uso de solo indicam para os atributos, carbono orgânico total, carbono orgânico
1317 particulado e carbono orgânico associado aos minerais, superioridade do tratamento de
1318 vegetação nativa (Nanzer et al., 2017; Freitas et al., 2018). Segundo Lima et al. (2017), o
1319 carbono orgânico particulado foi à fração da matéria orgânica do solo mais eficiente em
1320 identificar as mudanças nos teores e estoques de carbono em curto prazo.

1321 Com relação ao índice de manejo de carbono (Tabela 8), tanto na avaliação realizada
1322 no início, como no final do período experimental, as áreas com lotação contínua,
1323 independente da TL apresentaram valores inferiores a 100. Segundo Conceição et al. (2014),
1324 o IMC é uma forma eficiente de se constatar a qualidade do solo sob o sistema de manejo.

1325 De acordo com Nicoloso et al. (2008), o IMC mede as alterações nos estoques de
1326 carbono orgânico considerando os aspectos da labilidade do carbono orgânico do solo, valores
1327 de IMC inferiores a 100 indicam práticas prejudiciais a manutenção da matéria orgânica e da
1328 qualidade do solo.

1329 O solo é considerado um grande responsável pela produtividade agropecuária e pela
1330 realização da manutenção da qualidade do meio ambiente. Porém, quando são mal manejados,
1331 o carbono orgânico pode ser mineralizado e transferido para a atmosfera na forma de CO₂,
1332 mais quando então sob condições adequadas de manejo, o sistema pode sequestrar C da
1333 atmosfera, qual acaba sendo de grande importância estratégica tanto regional quanto global
1334 para compensar as emissões de CO₂ (Matias et al., 2012).

1335

1336

1337 5 | CONCLUSÃO

1338 Utilizar 2,4 UA ha⁻¹ de novilhas na estação chuvosa do ano no capim-marandu e com
1339 adubação nitrogenada de 150 kg de N ha⁻¹ ano⁻¹, não comprometeu a estrutura e a produção de
1340 forragem em quantidade e qualidade para o consumo animal, bem como taxa de lotação
1341 adequada para que possa obter aumentos nos teores médios de carbono orgânico utilizar em
1342 menor quantidade o estoque de carbono presente no solo.

1343 Recomenda-se realizar o manejo de pastejo sob lotação contínua entre 1,6 e 2,4 UA
1344 ha⁻¹ de novilhas para encontrar o equilíbrio de produção de forragem, ganho médio diário e
1345 por área de peso vivo no período das águas recebendo suplemento proteico energético e
1346 adubação de manutenção de 150 kg de N ha⁻¹ ano⁻¹.

1347

1348 REFERÊNCIAS

1349 AGUIAR, A. P. A. Possibilidades de intensificação do uso da pastagem através de rotação
1350 sem ou com uso mínimo de fertilizantes. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA
1351 PASTAGEM: FUNDAMENTOS DO PASTEJO ROTACIONADO, 14., Piracicaba, 1999.
1352 **Anais...** Piracicaba: FEALQ, Piracicaba, 1999. p. 85-138.

1353 ALDEN, W. G. and WHITAKER, I. A. The determinants of herbage intake by grazing sheep:
1354 the inter relationship of factors influencing herbage intake and availability. **Australian Journal**
1355 **of Agricultural Research**, v. 21, n. 5, p. 755-766, 1970.

1356 ASSMANN, A.L.; PELISSARI, A.; MORAES, A.; ASSMANN, T. S.; OLIVEIRA, E. B.;
1357 SANDINI, I. Produção de gado de corte e acúmulo de matéria seca em sistema de integração
1358 lavoura-pecuária em presença e ausência de trevo branco e nitrogênio. **Revista Brasileira de**
1359 **Zootecnia**, v. 33, n. 1, p. 37-44, 2004.

1360 BARBOSA, J. C. and MALDONADO JÚNIOR, W. **Software AgroEstat**: Sistema de
1361 análises estatísticas de ensaios agronômicos. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de
1362 Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de Jaboticabal, Brasil, 2009.

1363 BLAIR, G. J.; LEFROY, R. D. B.; LISLE, L. Soil carbon fractions based on their degree of
1364 oxidation, and the development of a carbon management index for agricultural systems.
1365 **Australian Journal of Agricultural Research**, v. 46, n. 7, p. 1459-1460, 1995.

1366 CAMBARDELLA, C. A.; ELLIOTT, E. T. Particulate soil organic-matter changes across a
1367 grassland cultivation sequence. **Soil Science Society of America Journal**, v. 56, n. 2, p. 777-
1368 783, 1992.

- 1369 CANO, C. C. P.; CECATO, U.; CANTO, M. W.; RORDIGUES, A. B.; JOBIM, C. C.;
1370 RODRIGUES, A. M.; GALBEIRO, S.; NASCIMENTO, W. G. Produção de forragem do
1371 capim-tanzânia (*Panicum maximum* Jacq. cv. Tanzânia⁻¹) pastejado em diferentes alturas.
1372 **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 33, p. 1949-1958, 2004.
- 1373 CARLOTO, M. N.; EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; LEMPP, B.; DIFANTE, G.
1374 S.; PAULA, C. C. L. Desempenho animal e características de pasto de capim-xaraés sob
1375 diferentes intensidades de pastejo, durante o período das águas. **Pesquisa Agropecuária**
1376 **Brasileira**, v. 46, n. 1, p. 97-104, 2011.
- 1377 CARVALHO, P. C. F.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; POLI, C. H. E. C.; MORAES, A.;
1378 DELAGARDE, R. Importância da estrutura da pastagem na ingestão e seleção de dietas pelo
1379 animal em pastejo. In: Mattos, W. R. S. (Org.). **A Produção Animal na Visão dos**
1380 **Brasileiros**. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Piracicaba, 2001, p. 853-
1381 871, 2001.
- 1382 CASTRO, L. M.; BARBOSA, M. A. A. F.; BARBERO, R. P.; BRITO, V. C.; SAAD, R. M.;
1383 RIBEIRO, E. L. A.; MIZUBUTI, I. Y.; BRIDI, A. M. Produção de forragem e composição
1384 estrutural de pastos de *Brachiaria brizantha* cv. Xaraés manejados em diferentes alturas de
1385 pastejo. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 34, n. 2, 2013, p. 4145-4155.
- 1386 CONCEIÇÃO, P. C.; BAYER, C.; DIECKOW, J.; SANTOS, D. C. dos. Fracionamento físico
1387 da matéria orgânica e índice de manejo de carbono de um Argissolo submetido a sistemas
1388 conservacionistas de manejo. **Ciência Rural**, v. 44, p. 794-800, 2014.
- 1389 COSGROVE, G. P. Grazing behaviour and forage intake. In: INTERNATIONAL
1390 SYMPOSIUM ON ANIMAL PRODUCTION UNDER GRAZING, 1997, Viçosa, MG.
1391 **Anais...** Viçosa, MG: UFV, 1997. p.59-80.
- 1392 COSTA, K. A. P.; ROSA, B.; OLIVEIRA, I. P.; PETTERSEN, D.; SILVA, D. C. Efeito da
1393 estacionalidade na produção de matéria seca e composição bromatológica da *Brachiaria*
1394 *brizantha* cv. Marandu. **Ciência Animal Brasileira**, v. 6, n. 3, p. 187-193, 2005.
- 1395 DENARDIN, R. B. N.; MATTIAS, J. L.; WILDNER, L. de P.; NESI, C. N.; SORDI, A.;
1396 KOLLING, D. F.; BUSNELLO, F. J.; CERUTTI, T. Estoque de carbono no solo sob
1397 diferentes formações florestais Chapecó-SC. **Ciência Florestal**, v. 24, n. 1, p. 59-69, 2014.
- 1398 DEREGIBUS, V. A.; SANCHES, R. A.; CASAL, J. J. Effects of light quality on tiller
1399 production in *Lolium* spp. **Plant Physiology**, v. 72, n. 3, p. 900-902, 1983.

- 1400 DETMANN, E.; SOUZA, M.A.; VALADARES FILHO, S. C.; QUEIROZ, A. C.;
1401 BERCHIELLI, T. T.; SALIBA, E. O. S.; CABRAL, L. S.; PINA, D. S.; LADEIRA, M. M.;
1402 AZEVEDO, J. A. G. (2012). (Ed.). **Métodos para análise de alimentos**. Visconde do Rio
1403 Branco: Suprema.
- 1404 DORTZBACH, D.; PEREIRA, M. G.; BLAINSKI, E.; GONZÁLEZ, A. P. Estoque de C e
1405 abundância natural de ^{13}C em razão da conversão de áreas de floresta e pastagem em bioma
1406 Mata Atlântica. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 39, p. 1643-1660, 2015.
- 1407 EUCLIDES, V. P. B.; FLORES, R.; MEDEIROS, R. N.; OLIVEIRA, M. P. Diferimento de
1408 pastos de braquiária cultivares Basilisk e Marandu, na região do Cerrado. **Pesquisa**
1409 **Agropecuária Brasileira**, v. 42, n. 2, p. 273-280, 2007.
- 1410 EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; BARBOSA, R. A.; NANTES, N. N. Manejo do
1411 pastejo de cultivares de *Brachiaria brizantha* (Hochst) Stapf e de *Panicum maximum* Jacq.
1412 **Revista Ceres**, v. 61, p. 808-818, 2014
- 1413 FAGUNDES, J. L.; FONSECA, D. M.; MISTURA, C.; MORAIS, R. V.; VITOR, C. M. T.;
1414 GOMIDE, J. A.; JUNIOR, D. N.; CASAGRANDE, D. R.; COSTA, L. T. Características
1415 morfogênicas e estruturais do capim Braquiária em pastagem adubada com nitrogênio
1416 avaliadas nas quatro estações do ano. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 35, n. 1, p. 21-29,
1417 2006.
- 1418 FLORES, R. S.; EUCLIDES, V. P. B.; ABRÃO, M. P. C.; GALBEIRO, S.; DIFANTE, G. S.;
1419 BARBOSA, R. A. Desempenho animal, produção de forragem e características estruturais dos
1420 capins marandu e xaraés submetidos a intensidades de pastejo. **Revista Brasileira de**
1421 **Zootecnia**, v. 37, p. 1355-1365, 2008.
- 1422 FRANÇA, A. F. S.; BORJAS, A. L. R.; OLIVEIRA, E. R.; SOARES, T. V.; MIYAGI, E. S.;
1423 SOUSA, V. R. Parâmetros nutricionais do capim-tanzânia sob doses crescentes de nitrogênio
1424 em diferentes idades de corte. **Ciência Animal Brasileira**, v. 8, n. 4, p. 695-703, 2007.
- 1425 FRANCO, G. L.; AGUIAR JÚNIOR, C. G.; RAMOS, A. K. B.; DAVY, F. C. A.; REIS, S. F.
1426 Suplementação de bovinos mantidos em pastagens nas fases de recria e engorda. In:
1427 OLIVEIRA, R. L.; BARBOSA, M. A. A. F. (Org.). **Bovinocultura de corte**. Salvador:
1428 EDUFBA, 2007, p. 429-452.

- 1429 FREITAS, L.; OLIVEIRA, I. A.; CASAGRANDE, J. C.; SILVA, L. S.; CAMPOS, M. C. C.
1430 Estoque de carbono de latossolos em sistemas de manejo natural e alterado. **Ciência**
1431 **Florestal**, Santa Maria, v. 28, n. 1, p. 228-239, 2018.
- 1432 GOMIDE, C. A. M.; GOMIDE, J. A.; ALEXANDRINO, E. Características estruturais e
1433 produção de forragem em pastos de capim-mombaça submetidos a períodos de descanso.
1434 **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 42, p. 1487-1494, 2007.
- 1435 ÍTAVO, L. C. V.; SOARES, C. M.; ÍTAVO, C. C. B. F.; DIAS, A. M.; PETIT, H. V.; LEAL,
1436 E. S.; SOUZA, A. D. V. Calorimetry, chemical composition and *in vitro* digestibility of
1437 oilseeds. **Food Chemistry**, v. 185, p. 219-225, 2015.
- 1438 KLUTHCOUSKI, J.; AIDAR, H. Uso da integração lavoura-pecuária na recuperação de
1439 pastagens. In: KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L. F.; AIDAR, H. (Ed.). **Integração lavoura-**
1440 **pecuária**. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2003. p. 185-223.
- 1441 KÖPPEN, W. **Climatologia**: con un estudio de los climas de la tierra. México: Fondo de
1442 Cultura Económica, 1948. 478p.
- 1443 LEMAIRE, G. (2001). Ecophysiological of grasslands: dynamics aspects of forage plant
1444 population in grazed swards. In: XIX INTERNATIONAL GRASSLAND CONGRESS, 19.,
1445 2001, São Pedro, 2001. **Proceedings...** São Pedro: FEALQ.
- 1446 LIMA, I. M. de O.; SILVA, M. F. G.; ENSINAS, S. C.; SILVA, J. M. R.; MARQUES
1447 FILHO, W. C.; BARBOSA, G. F. Adubos verdes para o incremento dos estoques de carbono
1448 em Neossolo Quartzarênico de Cerrado. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 13, n. 4,
1449 p. 1-7, 2017.
- 1450 LUGÃO, S. M. B.; RODRIGUES, L. R.A.; ABRAHÃO, J. J. S.; MALHEIROS, E. B.;
1451 MORAIS, A. de. Acúmulo de forragem e eficiência de utilização do nitrogênio em pastagens
1452 de *Panicum maximum* Jacq. (acesso BRA-006998) adubadas com nitrogênio. **Acta**
1453 **Scientiarum. Animal Sciences**, v. 25, p. 371-379, 2003.
- 1454 MACEDO, M. C. M. Adubação fosfatada em pastagens cultivadas com ênfase na região dos
1455 Cerrados. In: YAMADA, T.; ABDALLA, S.R.S. (Ed.). **Fósforo na agricultura brasileira**.
1456 Piracicaba: Potafos, 2004, p. 359-400.
- 1457 MATIAS, S. R.; CORREIA, M. A. R.; CAMARGO, L. A.; FARIAS, M. T.; CENTURION,
1458 J.F.; JÚLIO NÓBREGA, J.C.A. Influência de diferentes sistemas de cultivo nos atributos

- 1459 físicos e no carbono orgânico do solo. **Revista Brasileira Ciências Agrárias**, Recife, v. 7, n.
1460 3, p. 414-420, 2012.
- 1461 MATTHEW, C.; ASSUERO, S. G.; BLACK, C. K.; SACKVILLE HAMILTON, N. R. Tiller
1462 dynamics of grazed swards. In: LEMAIRE, G.; HODGSON, J.; MORAES, A.; CARVALHO,
1463 P. C. F.; NABINGER, C. (Eds.) **Grassland ecophysiology and grazing ecology**. Wallingfor:
1464 CABI Publishing, 2000. p. 127-150.
- 1465 MOREIRA, L. M.; SANTOS, M. E. R.; FONSECA, D. M.; MARTUSCELLO, J. A.;
1466 MORAIS, R. V.; MISTURA, C. Produção animal em pastagem de capim-braquiária adubada
1467 com nitrogênio. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 63, n. 4, p.
1468 914-921, 2011.
- 1469 NANZER, M. C.; ENSINAS, S. C.; BARBOSA, G. F.; BARRETA, P. G. V.; OLIVEIRA, T.
1470 P.; SILVA, J. R. M.; PAULINO, L. A. Estoque de carbono orgânico total e fracionamento
1471 granulométrico da matéria orgânica em sistemas de uso de solos. **Revista de Ciências**
1472 **Agroveterinárias**. v. 18, p. 136-145, 2017.
- 1473 NICOLOSO, R. da S.; LOVATO, T.; AMADO, T. J. C.; BAYER, C.; LANZANOVA, M. E.
1474 Balanço do carbono orgânico no solo sob integração lavoura-pecuária no Sul do Brasil.
1475 **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 32, p. 2425-2433, 2008.
- 1476 NUNES, S. G.; BOOCK, A.; PENTEADO, M. I. O.; GOMES, D. T. **Brachiaria brizantha**
1477 **cv. Marandu**. 2.ed. Campo Grande: EMBRAPA/CNPQC, 1985. 31p. (EMBRAPA/CNPQC.
1478 Documentos, 21.).
- 1479 PALHANO, A. L.; CARVALHO, P. C. F.; DITTRICH, J. R.; MORAES, A.; BARRETO, M.
1480 Z.; SANTOS, M. C. F. Estrutura da pastagem e padrões de desfolhação em capim-mombaça
1481 em diferentes alturas do dossel forrageiro. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 34, p. 1860-
1482 1870, 2005.
- 1483 PARSONS, A. J. and CHAPMAN, D. J. The principles of pasture utilization. In: HOPKINS,
1484 A. (Ed.). **Grass: it's production and utilization**. Okehampton: British Grassland Society, 2000.
1485 p. 31-80.
- 1486 PAULA, C. C. L.; EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; LEMPP, B.; DIFANTE, G.
1487 S.; CARLOTO, M. N. Estrutura do dossel, consumo e desempenho animal em pastos de
1488 capim-marandu sob lotação contínua. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e**
1489 **Zootecnia**, v. 64, n. 1, p. 169-176, 2012.

- 1490 REIS, R. A.; RUGGIERI, A. C.; CASAGRANDE, D. R.; PASCOA, A. G. Suplementação da
1491 dieta de bovinos de corte como estratégia do manejo das pastagens. **Revista Brasileira de**
1492 **Zootecnia**, v. 38, p. 147-159, 2009.
- 1493 ROSCOE, R. and MACHADO, P. L. O. **Fracionamento físico do solo em estudos da**
1494 **matéria orgânica**. Embrapa Agropecuária Oeste/ Embrapa Solos, Dourados, MS/ Rio de
1495 Janeiro, 86p, 2002.
- 1496 SAMPAIO, R. L.; RESENDE, F. D.; SIQUEIRA, G. R.; REIS, R. A.; FARIA, M. H.;
1497 SALOMÃO, T. Estratégias de suplementação na recria de bovinos de corte. Desempenho
1498 durante as estações de seca e de água. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE
1499 BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 46., 2009. **Anais...** Lavras: SBZ, 2009.
- 1500 SBRISSIA, A. F.; DA SILVA, S. C.; SARMENTO, D. O. L.; MOLAN, L. K.; ANDRADE,
1501 F. M.E.; GONÇALVES, A. C.; LUPINACCI, A. V. Tillering dynamics in palisadegrass
1502 swards continuously stocked by cattle. **Plant ecology-Springer**, v. 206, n. 2, p. 349-359,
1503 2010.
- 1504 SHARMA, K. L.; MANDAL, U. K.; SRINIVAS, K.; VITTAL, K. P. R.; MANDAL, B.;
1505 GRACE, K.; RAMESH, V. Longterm soil management effects on crop yields and soil quality
1506 in a dryland Alfisol. **Soil & Tillage Research**, Amsterdam, v. 83, n. 2, p. 246-259, 2005.
- 1507 TEODORO, M. S. R.; PINHO COSTA, K. A.; DIAS, F. J. S.; SIMON, G. A.; SAENZ, E. A.
1508 C.; SEVERIANO, E. C.; CRUVINEL, W. S. Composição bromatológica dos capins marandu
1509 e mulato ii submetidos a diferentes alturas de resíduo. **Global Science and Technology**, v. 5,
1510 n. 3, p. 137-146, 2012.
- 1511 TINKER, P. B. Levels, distribution and chemical forms of trace elements in food plants.
1512 **Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences**,
1513 v. 294, n. 1071, p. 41-55, 1981.
- 1514 VAN SOEST, P. J. **Nutritional ecology of the ruminant**. 2. ed. Ithaca: Cornell University
1515 Press, 1994. 446 p.
- 1516 VIEIRA, M. M. and MOCHEL FILHO, W. J. E. Influência dos fatores abióticos no fluxo de
1517 biomassa e na estrutura do dossel. **Archivos de Zootecnia**, v. 59, p. 15-24, 2010.
- 1518 WERNER, J. C. Adubação de pastagens. Nova Odessa: Instituto de Zootecnia, 1986. 49 p.
1519 (**Boletim Técnico**, 18).

- 1520 WHITEMAN, P. C. **Tropical Pasture Science**. Oxford: Oxford University Press, 1980. 392
1521 p.
- 1522 YEOMANS, J. C.; BREMNER, J. M. A rapid and precise method for routine determination
1523 of organic carbon in soil. **Communications in Soil Science and Plant Analysis**, v. 19, n. 13,
1524 p. 1467-1476, 1988.

1525

1526

Figura 1. Temperaturas média, mínima e máxima e precipitação mensal durante o período experimental.

Tabela 1. Textura e teores de nutrientes do solo da área experimental da camada de 0-20 cm (setor bovinocultura de leite) da Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia UFMS antes do experimento (Setembro 2017) e final do experimento (Abril 2018).

Atributos	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)									
	0,8	1,6	2,4	3,2	Reserva	0,8	1,6	2,4	3,2	Reserva
	Antes do experimento					Final do experimento				
pH	5,4	5,3	5,6	5,0	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	5,4
V (%)	55,0	52,2	53,4	50,8	34,8	66,5	62,2	64,4	60,0	39,0
T (cmol _c /dm ³)	10,2	10,9	11,0	10,5	13,6	12,0	12,8	12,9	12,0	13,8
Argila (%)	62,0	64,0	61,0	65,5	51,0	63,5	64,5	60,0	64,0	52,5
MO (g/kg)	34,4	35,0	37,3	33,0	45,0	40,5	39,8	40,0	42,0	58,1
Macronutrientes										
P (mg/dm ³)	2,5	2,0	4,5	5,0	1,5	2,4	2,0	4,0	5,0	1,5
K (cmol _c /dm ³)	0,2	0,17	0,2	0,2	0,40	0,25	0,21	0,26	0,22	0,40
Ca (cmol _c /dm ³)	5,4	5,0	5,2	5,3	5,0	5,4	5,0	5,2	5,3	4,7
Mg (cmol _c /dm ³)	2,6	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	2,7	2,6	2,5
Al (cmol _c /dm ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H + Al (cmol _c /dm ³)	4,5	4,5	4,5	4,5	9,4	4,5	4,5	4,5	4,5	9,4

Análise Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO. pH: potencial hidrogeniônico (em água 1:2,5); V: % saturação de bases (100 S T-1); T: capacidade de troca catiônica (CTC a pH 7,0 [S+(H+Al)]); MO: matéria orgânica; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Al: alumínio; H: hidrogênio.

1527

Tabela 2. Estrutura do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	p-value	
	0,8	1,6	2,4	3,2		Linear	Quadrático
Período Outubro a Dezembro							
Altura (cm)	60,95	50,20	49,46	43,18	1,10	<0,01	0,2002
Densidade populacional de perfilhos (perfilhos m ²)	388	367	426	417	9,56	0,0767	0,7409
Massa Verde (kg ha ⁻¹)	13037,50	10243,06	10801,39	7356,94	372,94	<0,01	0,5954
Massa Seca Total (kg MS ha ⁻¹)	4884,32	4195,43	4519,44	3161,67	139,40	<0,01	0,1719
Massa seca total de folha (kg MS ha ⁻¹)	1503,03	970,95	997,25	554,18	56,01	<0,01	0,6086
Massa seca total do colmo (kg MS ha ⁻¹)	2286,41	1886,66	2080,11	1514,98	57,79	<0,01	0,4036
Massa seca total do material morto (kg MS ha ⁻¹)	1849,15	1753,11	1600,58	1381,50	44,12	<0,01	0,4421
Relação Folha: colmo	0,66	0,52	0,47	0,41	0,02	<0,01	0,2479
Período de Janeiro a Março							
Altura (cm)	92,28	45,11	42,48	22,67	2,82	<0,01	<0,01
Densidade populacional de perfilhos (perfilhos m ²)	352	451	533	687	18,7	<0,01	0,3098
Massa Verde (kg ha ⁻¹)	16070,83	11357,64	12980,69	7759,03	396,88	<0,01	0,5999
Massa Seca Total (kg MS ha ⁻¹)	6839,64	4937,71	4758,33	3209,68	165,06	<0,01	0,3523
Massa seca total de folha (kg MS ha ⁻¹)	1718,83	904,21	1196,33	720,86	56,08	<0,01	0,0347
Massa seca total do colmo (kg MS ha ⁻¹)	2736,88	1665,21	1869,84	905,12	85,47	<0,01	0,6019
Massa seca total do material morto (kg MS ha ⁻¹)	2781,64	2535,65	1997,26	1425,24	106,64	<0,01	0,3728
Relação Folha: colmo	0,60	0,67	0,60	0,76	0,03	0,1543	0,4409

1528 Efeito significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).

1529

1530

Tabela 3. Composição química do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	p-value	
	0,8	1,6	2,4	3,2		Linear	Quadrático
Período Outubro a Dezembro							
Matéria seca da folha (%)	34,65	35,34	34,44	33,38	0,89	0,5539	0,6225
Matéria seca do colmo (%)	34,14	34,06	34,00	34,60	0,62	0,8086	0,7848
Matéria seca do material morto (%)	68,91	68,12	67,51	69,43	0,61	0,8584	0,2621
Matéria orgânica da folha (%)	91,47	91,04	89,73	90,65	0,25	0,0828	0,1616
Matéria orgânica do colmo (%)	95,86	95,48	95,37	95,61	0,11	0,3948	0,1593
Matéria orgânica do material morto (%)	92,29	90,80	92,09	92,36	0,25	0,4911	0,0702
Período de Janeiro a Março							
Matéria seca da folha (%)	35,82	30,37	30,15	27,55	0,55	<0,01	0,1130
Matéria seca do colmo (%)	33,32	33,69	27,42	26,19	0,74	<0,01	0,5359
Matéria seca do material morto (%)	65,78	65,80	60,82	63,08	0,63	0,0143	0,3431
Matéria orgânica da folha (%)	91,95	90,86	90,55	91,28	0,25	0,2952	0,0651
Matéria orgânica do colmo (%)	95,56	94,81	94,83	94,47	0,13	<0,01	0,4087
Matéria orgânica do material morto (%)	92,75	92,40	92,40	92,20	0,10	0,0616	0,7082

1531 Efeito significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).

1532

1533

Tabela 4. Teores médios de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) e digestibilidade *in vitro* da massa seca da folha e do colmo do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	p-value	
	0,8	1,6	2,4	3,2		Linear	Quadrático
Período Outubro a Dezembro							
FDN folha (%)	65,38	64,90	65,56	66,55	0,42	0,2662	0,3788
FDN colmo (%)	78,29	77,82	78,21	80,45	0,39	0,0414	0,0720
FDA folha (%)	36,19	36,41	36,84	36,43	0,34	0,7101	0,6440
FDA colmo (%)	58,05	57,32	57,76	60,37	0,36	0,0159	0,0150
PB folha (%)	6,61	8,11	10,04	11,06	0,28	<0,01	0,5778
PB colmo (%)	2,42	2,52	3,32	3,23	0,09	<0,01	0,5736
DIVMS folha (%)	71,42	72,64	72,29	75,63	0,41	<0,01	0,1601
DIVMS colmo (%)	50,12	49,66	48,26	46,33	0,60	0,0152	0,5215
Período de Janeiro a Março							
FDN folha (%)	70,05	67,98	67,98	67,09	0,25	<0,01	0,1895
FDN colmo (%)	81,95	80,61	78,40	77,77	0,36	<0,01	0,5724
FDA folha (%)	40,34	38,74	40,07	38,05	0,22	<0,01	0,6019
FDA colmo (%)	61,47	57,65	55,02	53,10	0,52	<0,01	0,2397
PB folha (%)	5,70	8,21	9,94	12,22	0,30	<0,01	0,7193
PB colmo (%)	2,23	2,68	4,57	5,33	0,17	<0,01	0,4258
DIVMS folha (%)	67,94	69,15	69,90	72,68	0,62	<0,01	0,5088
DIVMS colmo (%)	46,24	48,79	50,07	51,73	0,81	0,0122	0,7766

1534 FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente ácido; PB: proteína bruta; DIVMS: digestibilidade *in vivo* da matéria seca. Efeito
 1535 significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).
 1536

1537

Tabela 5. Matéria seca e matéria orgânica da simulação de pastejo do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	Linear	p-value Quadrático
	0,8	1,6	2,4	3,2			
Período Outubro a Dezembro							
Matéria seca (%)	30,86	29,25	26,78	27,45	0,55	0,0225	0,3526
Matéria orgânica (%)	93,98	93,28	93,10	93,06	0,26	0,2741	0,5760
FDN (%)	70,43	69,58	69,11	69,01	0,32	0,1467	0,6066
FDA (%)	41,10	41,05	42,28	41,96	0,29	0,2069	0,8381
PB (%)	7,04	7,56	9,89	10,39	0,27	<0,01	1,0000
DIVMS (%)	65,56	63,30	68,43	66,06	0,83	0,4316	0,9748
Período de Janeiro a Março							
Matéria seca (%)	31,69	29,24	26,99	26,18	0,42	<0,01	0,2470
Matéria orgânica (%)	92,09	91,54	92,18	91,58	0,09	0,2117	0,8747
FDN (%)	70,02	69,59	69,11	68,55	0,32	0,0889	0,9167
FDA (%)	45,21	45,48	45,58	45,92	0,31	0,4229	0,9564
PB (%)	7,06	8,49	10,34	12,01	0,26	<0,01	0,7420
DIVMS (%)	57,49	57,52	61,09	58,04	0,71	0,4003	0,2650

1538 FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente ácido; PB: proteína bruta; DIVMS: digestibilidade *in vivo* da matéria seca. Efeito
 1539 significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).

1540

1541

Tabela 6. Desempenho de novilhas em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação animal sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	p-value	
	0,8	1,6	2,4	3,2		Linear	Quadrático
TLi (UA ha ⁻¹)	0,9	1,7	2,5	3,5	0,10	<0,01	0,0823
TLf (UA ha ⁻¹)	1,3	2,5	3,8	4,9	0,14	<0,01	0,7793
GMD individual (kg ha ⁻¹ dia ⁻¹)	0,639	0,560	0,519	0,485	0,01	<0,01	0,3696
GMD por área (kg ha ⁻¹ dia ⁻¹)	1,206	2,010	3,170	3,660	1,04	<0,01	0,1657
GPT individual (kg ha ⁻¹)	113,17	91,91	99,17	85,83	1,89	<0,01	0,3767
GPT área (kg ha ⁻¹)	213,52	346,86	561,32	647,80	19,29	<0,01	0,2284

1542 TLi: taxa de lotação inicial; TLf: taxa de lotação final; GMD: ganho de peso vivo médio diário; GPT: ganho de peso vivo total. Efeito
 1543 significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).

1544

1545

Tabela 7. Valores médios dos teores de carbono orgânico total (COT), carbono orgânico particulado (COp) e carbono orgânico associado aos minerais (COam), na camada 0-20 cm em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				Vegetação nativa	Teste F	Média	CV (%)
	0,8	1,6	2,4	3,2				
Outubro 2017								
COT (g kg ⁻¹)	19,77 b	23,47 a	19,84 b	21,15 b	19,50 b	5,78**	20,75	8,11
COp (g kg ⁻¹)	2,16 c	3,16 b	2,39 c	2,55 c	4,96 a	35,12**	3,04	15,38
COam (g kg ⁻¹)	17,61 b	20,32 a	17,46 b	18,60 b	14,54 c	10,68**	17,70	8,90
Abril 2018								
COT (g kg ⁻¹)	17,77 d	17,92 d	23,34 b	20,42 c	27,64 a	41,45**	21,42	7,38
COp (g kg ⁻¹)	2,55 c	2,76 c	3,13 b	3,43 b	5,47 a	28,63**	3,47	15,42
COam (g kg ⁻¹)	15,21 b	15,16 b	20,21 a	16,99 b	22,18 a	21,58**	17,95	9,19

Pelo teste F, ** significativo ($p \leq 0,01$). Médias seguidas pela mesma letra na linha pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott ($p \leq 0,05$).

1546

1547

Tabela 8. Valores médios dos estoques de carbono orgânico total (Est. COT), carbono orgânico particulado (Est. COp), carbono orgânico associado aos minerais (Est. COam), e, índice de manejo de carbono (IMC), na camada 0-20 cm em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhas sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				Vegetação nativa	Teste F	Média	CV (%)
	0,8	1,6	2,4	3,2				
Outubro 2017								
Est. COT (t ha ⁻¹)	32,40 b	39,63 a	35,12 b	34,37 b	24,93 c	23,02**	33,29	8,24
Est. COp (t ha ⁻¹)	3,55 c	5,33 b	4,22 c	4,15 c	6,35 a	12,86**	4,72	16,13
Est. COam (t ha ⁻¹)	28,86 b	34,29 a	30,90 b	30,23 b	18,59 c	33,39**	28,57	8,80
IMC	47,10 c	72,49 b	56,56 c	55,87 c	100 a	21,36**	66,40	16,70
Abril 2018								
Est. COT (t ha ⁻¹)	30,01 a	31,63 a	28,39 a	28,90 a	21,71 b	17,12**	28,13	7,99
Est. COp (t ha ⁻¹)	3,88 c	3,71 c	4,47 b	4,70 b	6,08 a	11,26**	4,57	15,01
Est. COam (t ha ⁻¹)	26,14 a	27,92 a	23,92 b	24,21 b	15,62 c	22,95**	23,56	10,25
IMC	52,72 c	49,98 c	63,19 b	67,06 b	100,0 a	27,52**	66,59	14,01

Pelo teste F, ** significativo ($p \leq 0,01$). Médias seguidas pela mesma letra na linha pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott ($p \leq 0,05$).

1548

1549

1550

Figura 2. Relação entre lotação animal (X), ganho de peso individual (Y) e ganho de peso por área (Z).

1551

ARTIGO 2

1552

Estrutura do pasto, desempenho de novilhos de corte e estoque de carbono em pastos de

1553

capim-marandu no bioma Cerrado

1554

Pasture structure, performance of beef steers and carbon stock in marandu grass pastures in

1555

the Cerrado biome

1556

1557

AGRADECIMENTOS

1558

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; O presente trabalho foi

1559

realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –

1560

Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001; Conselho Nacional de Desenvolvimento

1561

Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino,

1562

Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT).

1563

1564

Conflitos de Interesse

1565

Os autores declaram não conflito de interesse.

1566

1567

Resumo

1568

Objetivou-se avaliar características produtivas, estruturais do pasto, estoque de carbono no

1569

solo em resposta a variação das taxas de lotações animal no capim-marandu sob lotação

1570

contínua e o desempenho de novilhos. Os tratamentos constituíram das taxas de lotações de

1571

0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹, e três repetições. Foram utilizados 30 novilhos. Foram avaliadas

1572

características estruturais, produtivas, valor nutricional dos pastos, desempenho animal e o

1573

estoque de carbono no solo. Foi observado efeito quadrático para a massa verde, com ponto

1574

mínimo de 6538,79 kg ha⁻¹ com 2,4 UA ha⁻¹. Efeito linear decrescente foi observado para

1575

massa seca total de folha, a maior foi com 0,8 UA ha⁻¹ com 1369,46 kg ha⁻¹. Houve aumento

1576

no teor de proteína bruta da folha de 5,10% para 7,81% e de 5,28 para 11,99% de outubro a

1577

dezembro e de janeiro a março, nas taxas de lotações de de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹. Os ganhos

1578

passaram de 0,867 para 0,657 kg dia⁻¹ de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹. O maior ganho peso total

1579

individual (150,83 kg) foi no pasto com 0,8 UA ha⁻¹ e diminuiu (114,25 kg) com 3,2 UA ha⁻¹.

1580

O carbono orgânico total (29,94 g kg⁻¹), particulado (4,65 g kg⁻¹) e associado aos minerais

1581

(25,29 g kg⁻¹) foram superiores na vegetação nativa comparada as demais áreas. A produção

1582

em quantidade e qualidade do capim-marandu manejado sob lotação contínua de 2,4 a 3,2 UA

1583

ha⁻¹ na estação chuvosa refletiu em melhor desempenho animal tanto individual quanto por

1584

área sem prejudicar a planta.

1585 **PALAVRAS-CHAVE:** desempenho, ganho de peso, marandu, novilhos, produção de
1586 forragem

1587

1588 **Abstract**

1589 The objective was to evaluate productive, structural characteristics of the pasture, carbon
1590 stock in the soil in response to the variation of animal stocking rates in marandu grass under
1591 continuous stocking and the performance of steers. The treatments consisted of stocking rates
1592 of 0.8; 1.6; 2.4 and 3.2 AU ha⁻¹, and three repetitions. 30 steers were used. Structural,
1593 productive characteristics, nutritional value of pastures, animal performance and carbon stock
1594 in the soil were evaluated. A quadratic effect was observed for the green mass, with a
1595 minimum point of 6538.79 kg ha⁻¹ with 2.4 AU ha⁻¹. Decreasing linear effect was observed
1596 for total dry leaf weight, the highest was 0.8 AU ha⁻¹ with 1369.46 kg ha⁻¹. There was an
1597 increase in the crude protein content of the leaf from 5.10% to 7.81% and from 5.28 to
1598 11.99% from October to December and from January to March, in the stocking rates from 0.8
1599 to 3 , 2 AU ha⁻¹. The gains went from 0.867 to 0.657 kg day⁻¹ from 0.8 to 3.2 AU ha⁻¹. The
1600 greatest gain in total individual weight (150.83 kg) was in the pasture with 0.8 AU ha⁻¹ and
1601 decreased (114.25 kg) with 3.2 AU ha⁻¹. The total organic carbon (29.94 g kg⁻¹), particulate
1602 (4.65 g kg⁻¹) and associated with minerals (25.29 g kg⁻¹) were higher in native vegetation
1603 compared to the other areas. The production in quantity and quality of marandu grass
1604 managed under continuous stocking from 2.4 to 3.2 AU ha⁻¹ in the rainy season reflected in
1605 better animal performance both individually and by area without harming the plant.

1606

1607 **KEYWORDS:** performance, weight gain, marandu, steers, forage production

1608

1609 **1 | INTRODUÇÃO**

1610 A conversão da pastagem em produto animal, bem como seu crescimento e utilização
1611 é condicionada e determinada pelo controle da estrutura dos pastos em sistemas de produção
1612 animal sob pastejo (Hodgson, 1990). Ainda para o mesmo autor, manter o sistema de
1613 produção estável é consequência da essência do manejo do pastejo que consiste em encontrar
1614 balanço eficiente entre o crescimento da planta, o seu consumo e a produção animal. Dessa
1615 maneira, ter conhecimento da intensidade de pastejo se torna o mais importante de qualquer
1616 outra ferramenta de manejo de pastejo individual e por área, pois esta, irá determinar a
1617 persistência da pastagem o nível de desempenho animal (Euclides et al., 2019).

1618 A seleção de uma intensidade de pastejo é mais importante do que qualquer outra
1619 decisão de manejo de pastejo individual porque determina a persistência da pastagem e o
1620 nível de produção por animal e por unidade de área de terra.

1621 No entanto, a demanda de consumo de carne pelo aumento da população e as
1622 mudanças climáticas faz com que pesquisadores gerem novas pesquisas com forrageiras já
1623 utilizadas há algum tempo e que foram mais implantadas nas propriedades, como é o caso da
1624 *Brachiaria brizantha* (A. Rich.). Stapf. cv. Marandu, para que observe seu comportamento
1625 quanto à produção, estrutura, valor nutritivo e reflexo no desempenho animal.

1626 Mesmo na estação chuvosa, quando, aparentemente, as pastagens podem atender às
1627 demandas nutricionais dos animais, a suplementação de proteína e energia pode ser benéfica
1628 (Barbosa et al., 2008). Nesse cenário, a utilização de suplementos concentrados seja na seca,
1629 seja nas águas, permite corrigir deficiências específicas de nutrientes na forragem para
1630 maximizar a utilização pelos micro-organismos ruminais e potencializar o ganho de peso
1631 (Reis et al., 2012).

1632 As metas de produção animal podem ser alcançadas dependendo da amplitude
1633 específica das condições do pasto, sendo esta uma característica observada em cada cultivar
1634 em particular (Da Silva, 2004). Assim, o acesso da forragem por parte dos animais que irão
1635 consumi-las é resultado das escolhas dos animais que utilizam suas habilidades seletivas para
1636 aumentar a qualidade de suas dietas (Carvalho et al., 1999).

1637 Por isso que, o manejo dos pastos, com base nas características estruturais das plantas
1638 forrageiras, e suas interações com os fatores ambientais, tem se mostrado mais eficiente para
1639 aumentar a produção de forragem e animal (Trindade et al., 2007; Difante et al., 2009). O uso
1640 de adubação nitrogenada em pastagens pode aumentar a produtividade podendo variar quanto
1641 à dose e espécies utilizadas, além do potencial produtivo, as características morfogênicas e
1642 morfofisiológicas do pasto também podem responder a esse nutriente (Garcez Neto et al., 2002;
1643 Premazzi et al., 2003).

1644 Outro importante dado que tem se discutido nos últimos anos são em relação ao C no
1645 solo, pois ainda não existem dados concretos relatando a quantidade de C que é disponível
1646 com a substituição de vegetação nativa por pastagens, nem mesmo sobre a quantidade de C
1647 que se mantém nos diferentes compartimentos do ambiente, principalmente no solo (Costa et
1648 al., 2009).

1649 Diante disso, este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito das taxas de lotação
1650 animal no estoque de carbono, na estrutura, produtividade e valor nutricional do pasto e na

1651 produtividade animal em pastos de capim-marandu manejado sob lotação contínua no bioma
1652 Cerrado.

1653

1654 **2. | MATERIAL E MÉTODOS**

1655 **2.1.1 | Local**

1656 O experimento foi conduzido no setor de Bovinocultura de Leite da Fazenda Escola da
1657 Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, localizada no município de
1658 Terenos - MS (20°26'48.2''S 54°50'39.2''O e 530 m de altitude) de setembro de 2018 a abril
1659 de 2019.

1660

1661 **2.1.2 | Clima**

1662 Os dados de precipitação e de temperatura (Figura 1), durante o período experimental
1663 foram coletados no banco de dados do CEMTEC (Centro de Monitoramento de Tempo, do
1664 Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul). Foram separados os períodos de
1665 outubro a dezembro e de janeiro a março dos dados coletados.

1666 O clima da região, segundo a classificação de Köppen (1984), é do tipo Aw, tropical
1667 chuvoso de savana. O período considerado de seca na região é maio a setembro (30% da
1668 precipitação anual), e período das águas de outubro a abril (70% da precipitação anual).

1669

1670 **2.1.3 | Características do solo**

1671 O solo da área experimental é da classe Latossolo Vermelho Distrófico. As amostras
1672 para análise química do solo foram retiradas nas profundidades de 0-20 cm de profundidade
1673 em três pontos por piquete. As coletas foram realizadas antes do início do experimento no
1674 (setembro de 2018) e após o término do período experimental (abril de 2019) na área
1675 pastejada e em vegetação nativa (área de Cerrado) (Tabela 1).

1676

1677 **2.1.4 | Preparo da área experimental**

1678 Os pastos foram formados em fevereiro de 2017 pela *Brachiaria brizantha* Stapf. cv.
1679 Marandu, a lanço. Foram semeados 3,5 a 5 kg ha⁻¹ de sementes puras viáveis, em
1680 profundidades de 3 a 6 cm. As sementes foram cobertas com passagem de grande niveladora
1681 fechada e o solo compactado com rolo compactador. Durante a semeadura foi feita adubação
1682 de 80 kg.ha⁻¹ de P₂O₅ na forma de Superfosfato Simples.

1683 Em junho, julho e agosto de 2017 foram construídos as cercas e instalados os
1684 bebedouros nos piquetes. De outubro de 2017 a março de 2018 os piquetes foram pastejados

1685 por novilhas Nelores de desmame, após esse período os pastos ficaram vedados. Em outubro
1686 de 2018 todos os pastos receberam corte de uniformização para dar início ao experimento. No
1687 início do período experimental (outubro), no meio (dezembro) e no final (fevereiro) foram
1688 feitas adubações de manutenção com 50 kg ha⁻¹ N (nitrogênio) em cada piquete, totalizando
1689 150 kg ha⁻¹ ano⁻¹ de N.

1690

1691 **2.1.5 | Tratamentos**

1692 Os tratamentos constituíram das taxas de lotação inicial de 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹
1693 novilhas e em três repetições de área de 1 ha, cada uma.

1694

1695 **2.1.5.1 | Animais experimentais e manejo nutricional**

1696 Foram utilizadas 30 novinhos anelados com idade média de 9 meses, e peso vivo
1697 médio (PVM) de 203,8 kg, manejadas em pastos de capim-marandu sob lotação contínua e
1698 taxa de lotação variável. Em cada área experimental possuía bebedouro para consumo de água
1699 a vontade e cochos para suplementação animal.

1700 Os animais receberam suplementação proteica energética para bovinos em fase de
1701 terminação com consumo de 0,7% de peso vivo. A composição do nutricional do suplemento
1702 consistia em 76% de nutrientes digestíveis totais (NDT) estimado, 20% de proteína bruta (PB)
1703 e 8,7% de nitrogênio não proteico (NNP), além de macrominerais, microminerais e aditivo.
1704 Os animais tiveram período de adaptação de sete dias antes do início do período experimental
1705 aumentando gradativamente o consumo do suplemento até chegar à recomendação de 0,7%
1706 PV. Os consumos médios de suplementação foram de 7,3; 10,44; 11,38 e 13,36 kg/dia nos
1707 piquetes nas taxas de lotações de 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2 UA, respectivamente.

1708

1709 **2.2 | Avaliações realizadas**

1710 **2.2.1 | Altura do dossel**

1711 O monitoramento da altura do pasto foi realizado semanalmente em todas as unidades
1712 experimentais (piquetes de avaliação). Em cada unidade experimental foram realizadas
1713 medições em 40 pontos representativos à altura média da curvatura das folhas superiores em
1714 torno da régua, andando em zigue zague pelo piquete, utilizando-se régua de madeira
1715 graduada em centímetros.

1716

1717

1718

1719 **2.2.2 | Densidade populacional de perfilho (DPP)**

1720 As estimativas de densidade populacional de perfilhos foram obtidas com o uso de
1721 armações metálicas de 0,25 m² (1 × 0,25 m). A armação metálica era jogada de forma
1722 aleatória, quatro vezes por parcela em pontos representativos da condição dos pastos (altura)
1723 no momento da amostragem. As contagens dos perfilhos foram realizadas a cada 28 dias e
1724 todos os perfilhos vivos que estavam no interior da armação metálica eram contados.

1725

1726 **2.2.3 | Massa de forragem (MF)**

1727 A cada 28 dias foram realizados cortes rente ao solo de 6 amostras de forragem de 1
1728 m² por parcela em pontos representativos da área, as quais eram divididas em duas sub-
1729 amostras: uma foi seca e pesada para determinação da matéria seca (MS) no momento do
1730 corte, e a outra era destinada a separação dos componentes morfológicos da planta: folha
1731 (lâmina foliar), colmo (colmo + bainha) e material morto. Tanto a primeira sub amostra
1732 quanto a segunda eram pesados, colocados em sacos de papel, furados e colocados em estufa
1733 de 55°C por um período de 72 horas ou ate manterem peso constante, após esse período as
1734 amostras eram pesadas e moídas para análise bromatológica. A proporção de cada
1735 componente foi utilizada para estimar as relações folha: colmo (RF: C) e para as estimativas
1736 de massa de lâmina foliar e de colmo.

1737

1738 **2.2.4 | Simulação de pastejo (SP)**

1739 A cada 28 dias, três amostradores por 15 minutos ficaram observando o
1740 comportamento dos animais em apreenderem a forragem e os locais de preferencias dos
1741 mesmos. Após esse tempo os amostradores foram caminhando pelo piquete e simulando com
1742 a mão como os animais faziam a coleta da forragem em cada piquete. As amostras foram
1743 levadas pesadas e levadas para estufa a 55° C por 72 horas ate peso constante para estimar o
1744 teor de MS. Posteriormente, as amostras foram moídas a 1 mm e analisadas.

1745

1746 **2.2.5 | Composição química**

1747 Foram determinados os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO) da folha,
1748 do colmo e do material morto, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido
1749 (FDA) e proteína bruta (PB) da folha e do colmo da massa de forragem e da simulação de
1750 pastejo, segundo Detmann et al. (2012).

1751

1752

1753 **2.2.6 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

1754 As digestibilidades *in vitro* da matéria seca (DIVMS) da simulação de pastejo e a
1755 DIVMS da folha e do colmo (DIVMSC) da massa de forragem foram determinadas de acordo
1756 com Ítavo et al. (2015).

1757

1758 **2.2.7 | Desempenho animal**

1759 Todos os animais foram pesados a cada 28 dias, em jejum. Também foi computado o
1760 número de dias que os animais permaneceram na pastagem. Os números de animais
1761 possibilitaram as estimativas da taxa de lotação e da produção individual e por hectare em
1762 cada tratamento. O ganho médio diário por animal foi calculado a cada 28 dias pela soma do
1763 ganho de peso total no período dividido pelo número de dias no período. A taxa de lotação é
1764 calculada pelo soma do peso de cada animal na área dividido por 450 kg.

1765

1766 **2.2.8 | Estoque de Carbono no solo**

1767 Em cada piquete, no início e fim de pastejo do período avaliado, e na área de
1768 vegetação nativa, foram coletadas amostras de solo na camada de 0-20 cm com o uso de um
1769 anel volumétrico para se estimar o carbono orgânico. Após a coleta, as amostras foram
1770 destorroadas, secas a sombras e passadas em peneira de malha de 2 mm. Uma porção da
1771 amostra de solo foi triturada em almofariz e passada em peneira de 0,210 mm. A outra porção
1772 da amostra foi destinada para estimar a densidade do solo para ser utilizada no cálculo dos
1773 estoques de carbono.

1774 Foram analisados os seguintes atributos: carbono orgânico total (COT), carbono
1775 orgânico particulado (COp) e carbono orgânico associado aos minerais (COam). Também foi
1776 calculado o índice de manejo de carbono (IMC).

1777 O COT foi determinado segundo metodologia descrita por Yeomans and Bremner
1778 (1988). As frações de COp e COam foram obtidas por meio do fracionamento granulométrico
1779 da matéria orgânica do solo (Cambardella and Elliott, 1992). O teor de COp foi quantificado
1780 de acordo com metodologia de Yeomans and Bremner (1988). O teor de COam foi
1781 determinado a partir da diferença entre COT e Cop.

1782 O índice de manejo de carbono (IMC) foi calculado de acordo com a metodologia
1783 descrita por Blair et al. (1995). Foi calculado primeiramente do índice de compartimento de
1784 carbono (ICC), utilizando a expressão: $ICC = COT_{tratamento} / COT_{referência}$. Em que COT
1785 tratamento, correspondeu ao estoque de COT no tratamento avaliado e COT referência
1786 correspondeu ao estoque de carbono na área de vegetação nativa do Cerrado. Foi calculado o

1787 IL (índice de labilidade) utilizando a expressão $IL = L \text{ tratamento} / L \text{ referência}$. Em que L
 1788 tratamento correspondeu a labilidade da MOS no tratamento avaliado e L referência, a
 1789 labilidade da MOS na área de vegetação nativa do Cerrado. O L foi calculado pela expressão
 1790 $L = \text{estoque de carbono na COp} / \text{estoque de COam}$. Estes índices (ICC e IL) foram utilizados
 1791 para o cálculo do IMC, que foi obtido pela expressão:

$$1792 \quad \text{IMC} = \text{ICC} \times \text{IL} \times 100.$$

1793 Para determinação dos estoques de COT, COp e COam foram considerados os teores
 1794 de carbono, a densidade do solo e a espessura da camada de solo considerada, como segue:
 1795 $\text{Estoque de C em Mg ha}^{-1} = (\text{Teor de carbono em g kg}^{-1} \times \text{densidade do solo em kg dm}^{-3} \times$
 1796 $\text{espessura da camada de solo considerada em cm}) / 10.$

1797

1798 **2.3 | Análises estatísticas**

1799 Para o estoque de carbono os resultados foram submetidos à análise de variância e,
 1800 quando significativa, as médias dos tratamentos foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (p
 1801 $\leq 0,05$). Para a análise estatística utilizou-se o software AgroEstat (Barbosa and Maldonado
 1802 Júnior, 2009).

1803 Para a estrutura do pasto e desempenho animal os resultados obtidos foram submetidos
 1804 à análise de variância de delineamento inteiramente casualizado em regressão linear e
 1805 quadrática pelo teste de Tukey ($p < 0,01$) pelo software SAEG VERSAO 9.1 2007.

1806

1807 **2.3.1 | Modelo matemático**

1808 $Y_j = \beta_0 + \beta_1 X_{1j} + \beta_2 X_{2j} + \dots + \beta_k X_{kj} + \epsilon_j$, onde:

1809

1810 Y_j : representa a variável resposta, para $j = 1, 2, \dots, n$;

1811 X_{ij} : denotam as variáveis explicativas, para $i = 0, 1, \dots, k$;

1812 β_i : denotam os parâmetros do modelo (ou coeficientes de regressão) a serem estimados;

1813 ϵ_j : são os erros aleatórios do modelo supostos independentes e normalmente distribuídos de
 1814 média zero e variância σ^2 .

1815

1816 **3. | RESULTADOS**

1817 **3.1.1 | Estrutura do pasto**

1818 Foi observado efeito quadrático ($p < 0,01$) para a altura do capim-marandu nas
 1819 diferentes taxas de lotações de novilhos no período de janeiro a março (Tabela 2). O ponto
 1820 mínimo observado foi de 21,24 cm com 2,4 UA ha⁻¹.

1821 De outubro a dezembro foi observado efeito linear decrescente ($p < 0,01$) com o
1822 aumento das TL. A maior altura observada foi de 45,04 cm com $0,8 \text{ UA ha}^{-1}$ e decresceu para
1823 40,95 cm com $1,6 \text{ UA ha}^{-1}$, posteriormente para 35,78 cm com $2,4 \text{ UA ha}^{-1}$ e por fim a 36,90
1824 cm com $3,2 \text{ UA ha}^{-1}$.

1825 Houve efeito linear crescente ($p < 0,01$) para a DPP (Tabela 2). O menor número de
1826 perfilhos foi observado em pasto com $0,8 \text{ UA ha}^{-1}$ ($369 \text{ perfilhos/m}^2$) e aumentou para 389;
1827 510 e 514 perfilhos/ m^2 nos pastos seguintes ($1,6$; $2,4$ e $3,2 \text{ UA ha}^{-1}$, respectivamente).

1828 Não foi observado efeito significativo ($p > 0,01$) para as variáveis MST (massa seca
1829 total), MSTC (massa seca total de colmo), MSTMM (massa seca total de material morto) e da
1830 relação folha: colmo (RF: C) de outubro a dezembro (Tabela 2). As médias foram de 2996,72;
1831 892,98; 777,40 kg e 1,57 RF: C. No mesmo período foi observado efeito quadrático ($p < 0,01$)
1832 para a MV, onde o ponto mínimo observado foi de $6538,79 \text{ kg ha}^{-1}$ com $2,4 \text{ UA ha}^{-1}$. Efeito
1833 linear decrescente ($p < 0,01$) foi observado para MSTF (massa seca total de folha), sendo a
1834 maior observada na TL de $0,8 \text{ UA ha}^{-1}$ com $1369,46 \text{ kg ha}^{-1}$.

1835 No período de janeiro a março foi observado efeitos quadrático ($p < 0,01$) para altura,
1836 DPP, massa verde, massa seca total, massa seca total de folha e de colmo de material morto.
1837 Os pontos mínimos observados para altura e MSTMM foram de 21,24 cm e $1137,22 \text{ kg ha}^{-1}$
1838 na TL de $2,4 \text{ UA ha}^{-1}$. A RF: C observou-se efeito linear ($p < 0,01$) para o período de janeiro a
1839 março.

1840

1841 **3.2 | Composição química da massa de forragem**

1842 **3.2.1 | Massa seca e matéria orgânica (MS e MO)**

1843 Não foi encontrado efeito significativo ($p > 0,01$) para matéria seca da folha (MSF), do
1844 colmo (MSC), do material morto (MSMM) e matéria orgânica do material morto (MOMM)
1845 nos pastos com diferentes taxas de lotações de novilhos no capim-marandu de outubro a
1846 dezembro e para a variável matéria seca do material morto (MSMM) de janeiro a março
1847 (Tabela 3). As médias foram de 31,59; 28,65; 62,94 e 93,37% para MSF, MSC, MSMM e
1848 MOMM, respectivamente de outubro a dezembro, e de 65,11% de MSMM de janeiro a
1849 março.

1850 Efeito quadrático ($p < 0,01$) foi observado para MSMM (matéria seca do material
1851 morto), matéria orgânica do colmo (MOC) de outubro a dezembro e para MSF (matéria seca
1852 da folha), MSC (matéria seca do colmo) e MOC (matéria orgânica do colmo) de janeiro a
1853 março. O ponto máximo observado de MSMM foi de 65,73% com $2,4 \text{ UA ha}^{-1}$ e o mínimo de
1854 MOC de 92,81% na mesma TL no primeiro período. Os pontos mínimos observados para

1855 MSF, MSC e MOC foram de 24,95; 26,25 e 91,98% na TL de 2,4 UA ha⁻¹ no segundo
1856 período.

1857 Houve efeito linear ($p < 0,01$) decrescente para MOF (matéria orgânica da folha) no
1858 primeiro período e crescente para MOMM (matéria orgânica do material morto) no segundo
1859 período.

1860

1861 **3.2.2 | Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)**

1862 Não houve efeito significativo ($p < 0,01$) para os teores médios de FDN e FDA da folha
1863 e do colmo de outubro a dezembro (Tabela 4). As médias encontradas foram de 69,61 e
1864 77,55% para FDN da folha e do colmo e de 43,34 e 54,55% de FDA da folha e do colmo. De
1865 janeiro a março so não foi observado efeito no FDA da folha com média de 42,30%.

1866 Houve efeito linear decrescente ($p < 0,01$) no teor médio de FDN da folha e do colmo,
1867 com média de 72,49; 69,44; 83,47 e 79,11% na TL de 0,8 e 3,2 UA ha⁻¹, respectivamente, e
1868 do FDA do colmo com 63,43 e 53,92% nas mesmas TL no periodo de janeiro a março.

1869

1870 **3.2.3 | Proteína Bruta (PB)**

1871 Foi observado incremento ($p < 0,05$) de PB da folha e do colmo com o aumento da TL
1872 nos pastos nos dois periodos (Tabela 4). Houve um aumento no teor de PB da folha de 5,10%
1873 para 7,81% e de 5,28 para 11,99% de outubro a dezembro e de janeiro a março,
1874 respectivamente, e da PB do colmo de 2,70 para 3,44% e de 1,99 para 4,48% nas TL de 0,8
1875 para 3,2 UA ha⁻¹ no primeiro e segundo período, respectivamente.

1876

1877 **3.2.4 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

1878 Não houve efeito significativo ($p > 0,01$) nos coeficientes médios da DIVMS da folha
1879 de outubro a dezembro (66,36%) e do colmo (43,09 e 47,22%) de outubro a dezembro e de
1880 janeiro a março, respectivamente, nas diferentes taxas de lotações animal (Tabela 4).

1881 Foi observado efeito linear crescente ($p < 0,01$) do coeficiente de DIVMS da folha de
1882 janeiro a março, onde a maior digestibilidade observada foi na TL de 3,2 UA ha⁻¹ (72,60%) e
1883 a menor com 0,8 UA ha⁻¹ (66,25%).

1884

1885 **3.3 | Composição química da simulação de pastejo**

1886 **3.3.1 | Matéria seca e matéria orgânica (MS e MO)**

1887 Foi verificado efeito quadrático ($p < 0,01$) para a MO da SP do capim-marandu e efeito
1888 linear positivo ($p < 0,01$) com aumento da TL de novilhos nos pastos (Tabela 5). O ponto

1889 mínimo observado na MO da SP de outubro a dezembro foi de 91,51% com 2,4 UA ha⁻¹ e de
1890 janeiro a março de 91,57% com 1,6 UA ha⁻¹. O teor de MS da SP passou de 34,17 para
1891 38,69% de outubro a dezembro e de 33,60 para 41,09% nas TL de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹ de
1892 janeiro a março.

1893

1894 **3.3.2 | Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)**

1895 Não houve diferença significativa ($p>0,01$) de FDN da SP de outubro a dezembro,
1896 obtendo média de 70,04% (Tabela 5).

1897 Foi observado efeito linear crescente ($p<0,01$) para FDA de outubro a dezembro e de
1898 FDN e FDA de janeiro a março da simulação de pastejo com aumento de UA nos pastos
1899 (Tabela 5). O maior teor de FDA foi na TL de 3,2 UA ha⁻¹ com 43,80% e o menor teor com
1900 0,8 UA ha⁻¹ com 38,83% no primeiro período. De janeiro a março as maiores médias nos
1901 teores de FDN e FDA da SP foram de 78,29 e 54,52%, respectivamente, nas TL de 3,2 UA ha⁻¹
1902 ¹.

1903

1904 **3.3.3 | Proteína Bruta (PB)**

1905 Não foi observado efeito significativo ($p>0,01$) do teor de proteína bruta (PB) da SP
1906 nas diferentes taxas de lotações de outubro a dezembro, com média de 6,03% (Tabela 5).
1907 Porém, de janeiro a março foi observado efeito linear crescente ($p<0,01$) com o aumento das
1908 UA nos pastos.

1909

1910 **3.3.4 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

1911 Não houve efeito ($p>0,01$) no coeficiente de DIVMS da SP do capim-marandu nas
1912 diferentes TL de outubro a dezembro, sendo a média de 62,12% (Tabela 5). Médias no
1913 coeficiente de DIVMS da SP passando de 51,57 para 59,41% foram observado nas TL de 3,2
1914 para 0,8 UA ha⁻¹ no período de janeiro a março, indicando efeito linear crescente conforme se
1915 diminuiu a UA ha⁻¹.

1916

1917 **3.4 | Desempenho animal**

1918 Foi observado efeito quadrático ($p<0,01$) para TLf, GMD e GPT por área (Tabela 6).
1919 Efeito linear crescente ($p<0,01$) foi encontrado para TLi e efeito linear decrescente ($p<0,01$)
1920 para GMD e GPT individuais nos pastos do capim-marandu com o aumento das UA ha⁻¹. Os
1921 ganhos passaram de 0,867 para 0,657 kg dia⁻¹ nas TL de 0,8 para 3,2 UA ha⁻¹. O maior GPT
1922 individual (150,83 kg) foi no pasto com 0,8 UA ha⁻¹ e diminuiu (114,25 kg) com 3,2 UA ha⁻¹.

1923 **3.5 | Estoque de Carbono no solo**

1924 Na tabela 7 estão apresentados os teores médios de carbono orgânico total (COT),
1925 carbono orgânico particulado (COp) e carbono orgânico associado aos minerais (COam), na
1926 camada 0-20 cm, em sistema com método de lotação contínua para bovinos. O COT (29,94 g
1927 kg^{-1}), COp (4,65 g kg^{-1}) e COam (25,29 g kg^{-1}) foram superiores em outubro de 2018 na
1928 vegetação nativa comparada aos demais piquetes com diferentes taxas de lotações, estes não
1929 diferiram entre si estatisticamente. Após o período experimental, em abril de 2019 os teores
1930 médios de COT, COp e COam da vegetação nativa foram de 30,03; 6,03 e 24,01 g kg^{-1} ,
1931 respectivamente, sendo estes superiores aos demais tratamentos. Apenas para o teor médio de
1932 COam da lotação de 3,2 UA ha^{-1} (19,30 g kg^{-1}) foi inferior à vegetação nativa, no entanto,
1933 superiores aos demais tratamentos com TL diferentes. As demais variáveis os tratamentos
1934 submetidos à pastejo não obtiveram diferença entre si.

1935 Os valores médios dos estoques de carbono orgânico total (Est. COT), carbono
1936 orgânico particulado (Est. COp), carbono orgânico associado aos minerais (Est. COam), e,
1937 índice de manejo de carbono (IMC) na camada 0-20 cm está apresentado na tabela 8. Todas as
1938 variáveis avaliada a vegetação nativa antes e depois do período experimental foram superiores
1939 na vegetação nativa comparada aos demais tratamentos. Os est. COT (34,93 e 34,10 t ha^{-1}) e o
1940 est. COam (30,29 e 29,74 t ha^{-1}) em outubro de 2018 de 3,2 e 2,4 UA ha^{-1} foram superiores
1941 aos tratamentos de 1,6 e 0,8 UA ha^{-1} . As áreas sob pastejo não diferiram entre si no teor
1942 médio de est. COp. A TL com 1,6 UA ha^{-1} obteve teor médio inferior (53,19) de IMC
1943 comparado às demais áreas pastejadas. Em abril de 2019 o est. COp e IMC das áreas
1944 pastejadas não se diferiram entre si. No entanto o teor médio de COT das áreas com 0,8 UA
1945 ha^{-1} (25,95 t ha^{-1}) e 1,6 UA ha^{-1} (26,16 t ha^{-1}) e o teor médio do COam com 0,8 UA ha^{-1}
1946 (23,00 t ha^{-1}) foram inferiores aos demais tratamentos de áreas pastejadas.

1947

1948 **4. | DISCUSSÃO**

1949 **4.1.1 | Estrutura do dossel**

1950 Menores alturas de pasto observadas em altas taxas de lotações são em decorrência da
1951 maior quantidade de UA ha^{-1} que estão presentes na área consumindo a forragem. Euclides et
1952 al. (2008) trabalhando com capim-xaraés em diferentes alturas de desfolha observaram na
1953 maior lotação (4,58 UA ha^{-1}) a menor altura de 15 cm, as lotações de 3,6; 3,1 e 3,09
1954 obtiveram alturas de 30, 45 e 60 cm, respectivamente. Para que consiga manter as alturas mais
1955 baixas, um maior número de animais deve ser adicionado aos piquetes, sendo a taxa de

1956 lotação nas diferentes alturas estudadas, o reflexo direto do número de animais utilizados para
1957 manter as alturas de pastejo propostos (Barbosa et al., 2013).

1958 As alturas de dossel obtidas com essas taxas de lotações podem ser em consequência
1959 da adubação nitrogenada recebida parcelada em 3 vezes no ano, pois quando se avalia a altura
1960 das plantas em resposta a uma adubação nitrogenada, o crescimento da planta pode ser
1961 explicado pelo provável acréscimo no número de células em processo de divisão,
1962 impulsionando a produção de novas células e proporcionando aumento na taxa de
1963 alongamento de folhas, o que pode favorecer para mudanças no tamanho da lâmina foliar
1964 (Fagundes et al., 2006).

1965 O decréscimo na DPP à medida que se diminuiu a lotação animal é devido à área foliar
1966 ser controlada pela intensidade de pastejo (Matthew et al., 2001) e determinar a qualidade da
1967 radiação na base do dossel que pode ativar gemas axilares gerando novos perfilhos (Deregibus
1968 et al., 1983). Quando o perfilho passar por um período maior para ser colhido pelo animal à
1969 competição por luz aumenta continuamente durante o período de rebrotação sendo que a cada
1970 pastejo ocorre uma rápida modificação tanto na quantidade como na qualidade da luz que
1971 chega à base das plantas assim como na estrutura do dossel (Difante et al., 2011). A menor
1972 altura de pastejo, ou seja, taxas de lotação animal alta resultaram no decréscimo da DPP, pois,
1973 esta variável está associada à competição de luz incidente na base do dossel entre os perfilhos
1974 ($p=0,0001$) foi de 544, 240 e 137 $\mu\text{Mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, para 15, 30 e 45 cm, respectivamente
1975 (Deregibus et al., 1983). Paula et al. (2012b) avaliou características estruturais do capim
1976 marandu em diferentes alturas de pastejo (15, 30 e 45 cm) e encontraram DPP de 973, 759 e
1977 634 perfilhos/ m^2 , respectivamente, atribuindo esses resultados a competição de luz que chega
1978 à base do dossel. Outro fator impactante na DPP é a adubação nitrogenada, porque o uso de N
1979 usado como adubação nas pastagens estimula os pontos de crescimento da planta devido ao
1980 número de gemas axilares crescerem, isso faz com que a DPP seja aumentada pelo
1981 aparecimento de novilhos perfilhos (Jewiss, 1972).

1982 O declínio de produção de MV e MST com o aumento de UA ha^{-1} são explicados pelo
1983 número de animais na área, quanto maior a UA, maior é o consumo, o que acaba reduzindo a
1984 quantidade de MV e MST e massa dos componentes produzida no dossel, além dos níveis de
1985 nutrientes disponíveis na área do experimento (Tabela 1) e as condições climáticas favoráveis
1986 à produção de forragem (Figura 1).

1987 O nitrogênio é outro fator que aumenta a taxa de crescimento da gramínea e,
1988 consequentemente, a quantidade de forragem produzida por unidade de tempo (Santos et al.,
1989 2009). Esse nutriente também tem influência marcante no valor nutricional das mesmas, e

1990 conseqüentemente, na taxa de lotação e ganho de peso por animal e por hectare, maximizando
1991 o desempenho animal (Vitor et al., 2009). Ítavo et al. (2007) verificaram disponibilidade de
1992 MST de 7730,21 kg ha⁻¹ no tratamento com 2 animais ha⁻¹ e de 8133,27 kg MS ha⁻¹ no
1993 tratamento com 1 animal ha⁻¹, pastejando capim-marandu no período da seca. O que esta de
1994 acordo com presente trabalho, maior número de animais a MST é menor comparado a áreas
1995 com menor número de animais, que conseqüentemente, pelo subpastejo a produção de MST é
1996 maior.

1997 A MSTF maiores nos pastos com UA ha⁻¹ esta de acordo com Machado et al. (2008)
1998 que avaliaram o desempenho de animais alimentados com lâminas foliares em pastagens de
1999 capim-marandu e observaram uma variação de 5,1 a 2,3 UA ha⁻¹ nas ofertas de lâminas
2000 foliares de 3 a 15% do peso vivo, dessa forma, pastagens tropicais pode se levar em
2001 consideração a oferta de folhas para se estimar a taxa de lotação e avaliar com exatidão o
2002 desempenho dos animais. As folhas nos pastos representam 80% da dieta e é considerada a
2003 parte da planta de melhor qualidade (Forbes and Hodgson, 1985).

2004 A produção de MSC reduzida com os aumentos das taxas de lotação ocorre pelo
2005 grande número de animais consumindo a forragem, que acaba por ir colhendo os estratos,
2006 dando preferencias as folhas (topo) e posteriormente com a redução delas passando para os
2007 estratos mais baixos, no caso o do colmo. Conseqüentemente pelas condições climáticas,
2008 assim como a produção de MV, a produção de MSTC também foi prejudicada. Euclides et al.
2009 (2008) avaliando a produção de forragem e características da estrutura de dossel de cultivas
2010 de *Brachiaria brizantha* sob pastejo observaram no período das águas 877,80; 1116,14 e
2011 1086,30 kg MS ha⁻¹ de colmo das cultivares Marandu, Piatã e Xaraés, respectivamente. Na
2012 mesma ordem de cultivares no período seco do ano foi observado produções de colmo de
2013 1009,40; 1037,88 e 1217,57 kg MS ha⁻¹. Os autores atribuem essa maior produção de colmo
2014 estar relacionado com a época de florescimento das cultivares, quando as forragens estão em
2015 estágio reprodutivos o aparecimento de folhas paralisa após aparecerem as inflorescências,
2016 por isso ocorreu maiores produções do Piatã nas águas, da cv. Xaraés na seca, e o Marandu
2017 não dependem de foto períodos para florescer, mas houve florescimento final da primavera.
2018 Difante et al. (2010) avaliaram o capim-tanzânia submetidos às duas intensidades de pastejo
2019 (25 e 50 cm de altura de resíduo) sob lotação rotativa, eles observaram que os pastos mais
2020 altos obtiveram maior produção de MSC (1087,56 kg MS ha⁻¹) do que o mais baixo obteve
2021 (732,98 kg de MS ha⁻¹). Os autores justificam que a maior participação de colmo em pastos
2022 mais altos, mesmo favorecendo o desempenho animal individual esse tipo de manejo se torna

2023 uma estrutura de pasto difícil de controlar, e em longo prazo pode prejudicar o valor nutritivo
2024 da forragem, ou seja, limitar o consumo de forragem nos pastos com pouca RF: C.

2025 Segundo Brâncio et al. (2003) os bovinos selecionam sua dieta, tendo em média
2026 preferência em média de 92,4% por folhas verdes e de 6,7% por colmos verdes, o restante da
2027 dieta composta por inflorescência, folhas e colmos secos. A acessibilidade fácil pelo
2028 componente folha da planta e sua menor resistência ao cisalhamento o torna preferência pelos
2029 animais (Nave et al., 2009) e pelo seu melhor valor nutritivo (Santos et al., 2008). Os animais
2030 evitam consumir folhas e colmos mortos devido serem componentes das plantas de difícil
2031 acesso para apreensão, por estarem localizados nos estratos mais inferiores (Palhano et al.,
2032 2005), além de serem de pior valor nutritivo (Santos et al., 2008).

2033 Nantes et al. (2013) observando a oferta de massa de forragem e de folhas do capim-
2034 piatã sob diferentes alturas de pastejo encontraram valores de oferta de forragem de 7,9; 13,5
2035 e 17,0 kg de forragem/100 kg de PV e oferta de folhas de 3,6; 4,9 e 7,2 kg de forragem/100 kg
2036 de PV nas alturas de 15, 30 e 45 cm com taxas de lotação de 3,8; 3,1 e 2,4 UA ha⁻¹,
2037 respectivamente, e atribuíram os resultados de menores ofertas nas maiores intensidades de
2038 pastejo devido a maior lotação animal.

2039

2040 **4.2 | Composição química da massa de forragem**

2041 **4.2.1 | Matéria seca e matéria orgânica (MS e MO)**

2042 Os teores menores de MSF e MSC de janeiro a nas maiores TL e os maiores teores de
2043 MOF nos dois períodos e de MOC e MOMM de janeiro a março são devido à colheita da
2044 pastagem serem maiores e existir maior renovação de perfilhos, assim, as folhas velhas em
2045 lotações menores e maiores alturas de pastos, possuem folhas maiores, que por sua vez
2046 possuem maior área para que a transpiração seja maior, perdendo mais água do que pastos
2047 mais baixos. Com relação ao colmo, altas lotações os pastos são muito pastejados e o tamanho
2048 do colmo ainda são pequenos e não conseguem se alongar, refletindo em maior conteúdo
2049 celular e menor parede celular, consequentemente, maiores teores de MO nesse tipo de
2050 manejo.

2051

2052 **4.2.2 | Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)**

2053 O aumento linear de FDN e FDA da folha e do colmo observado de janeiro a março
2054 estarem ligado a menores de taxa de lotação é devido ao alongamento do colmo para
2055 sustentação do perfilho que aumento a parede celular desse componente da planta e o da folha
2056 envelhecida. Paula et al. (2012a) relatam que as folhas e colmos que foram rejeitados no

2057 pastejo animal envelhecem e perdem valor nutritivo, no colmo existe o aumento da parede
2058 celular. Agulhon et al. (2004) observaram teores médios de FDA de 46,19%, com o mesmo
2059 aumento devido à idade chegando ao período de agosto a 47,44%, ocorrido pelo aumento do
2060 conteúdo da parede celular, este se tornando um fator negativo, pois, de acordo com Costa et
2061 al. (2005), quanto maior o teor de FDA nas forragens, o resultado será de baixo consumo e
2062 uma digestibilidade inferior.

2063

2064 **4.2.3 | Proteína Bruta (PB)**

2065 A quantidade de UA ha⁻¹ influencia diretamente no teor de PB do pasto, devido a isso
2066 neste trabalho, onde os tratamentos tiveram maiores taxas de lotações (2,4 e 3,2 UA ha⁻¹) os
2067 teores de PB foram incrementados. Euclides et al. (2009) observaram teores de PB da folha do
2068 capim-marandu, piatã e xaraés de 8,2% no período de outubro a março antes do pastejo, e PB
2069 do colmo foi de 4,7; 4,6 e 4,2% nas cultivares marandu, piatã e xaraés, respectivamente no
2070 mesmo período, valores esses próximos aos encontrados neste trabalho. Teores médio de PB
2071 (11,19; 11,05; 13,41 e 13,71% no outono/inverno) e (8,36; 10,25; 8,60 e 7,94% na
2072 primavera/verão) dos capins xaraés, marandu, mombaça e tanzânia, respectivamente, foram
2073 observados por Alencar et al. (2010).

2074 Paula et al. (2012a) observaram teores de PB do colmo de 5,0; 4,2 e 3,7% da maior
2075 intensidade de pastejo para a menor (15, 30 e 45 cm, respectivamente). Esse melhor valor
2076 nutritivo encontrado nas maiores intensidades de pastejo se deve a maior rebrotação que
2077 ocorre da planta submetida a essas condições (Cano et al., 2004).

2078

2079 **4.2.4 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

2080 A DIVMS da folha e do colmo esta relacionado com os mesmo fatores que afetaram o
2081 conteúdo de FDN e com os teores de FDA (Tabela 6), pois o conteúdo de parede celular do
2082 perfilho reflete em diferenças no aproveitamento da forragem. Flores et al. (2008) observaram
2083 que o menor valor nutritivo do pasto mantido mais alto, é em consequências do número
2084 elevado de folhas velhas no dossel, uma vez que as folhas não consumidas pelos animais
2085 envelhecem.

2086 Em pesquisa com capim-xaraés, marandu, mombaça e tanzânia em diferentes épocas
2087 do ano observaram DIVMS de 60,81; 52,36; 60,49 e 61,43% no outono/inverno e valores
2088 médios de 48,79; 50,23; 43,31 e 47,68% na primavera/verão. O motivo desses resultados de
2089 menor digestibilidade no verão ocorreu pelas altas temperaturas nessa estação resultam em
2090 rápido crescimento e desenvolvimento da folha e aumento do teor dos componentes da parede

2091 celular e, como consequência, também a participação desse componente na matéria seca total
2092 da planta (Alencar et al., 2010).

2093

2094 **4.3 | Composição química da simulação de pastejo (SP)**

2095 **4.3.1 | Matéria seca e matéria orgânica (MS e MO)**

2096 Pastos com menos UA ha⁻¹ resultam em alturas maiores de dosséis, assim, possuem
2097 folhas maiores, onde a transpiração é maior e conseqüentemente, a perda de água é maior, o
2098 que resultou em maiores teores de MS nessas condições. Teores de MO voltando a serem
2099 maiores em taxas de lotações maiores podem ser por dois fatores, um pela maior renovação de
2100 tecidos que ocorre nessas áreas, promovendo maior valor nutritivo dessas forragens e segundo
2101 por estarem muito mais próximos do solo, podendo haver contaminação do componente da
2102 planta pelo solo, proporcionando maior concentração de material orgânico na SP do capim-
2103 marandu.

2104

2105 **4.3.2 | Fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)**

2106 Os teores de FDN serem diminuídos conforme diminui a taxa de lotação nos pastos de
2107 janeiro a março esta de acordo com Santos et al. (2011) que observaram teores de FDN da SP
2108 de capim-braquiária durante período de pastejo (1; 31; 57 e 88 dias) de 66,81; 72,71; 67,73 e
2109 73,72%. Os menores teores encontrados em menores intensidades de pastejo (1; 31 e 57 dias)
2110 esta relacionado com a maior quantidade de folhas vivas, menores teores de colmo vivo e de
2111 tecidos mortos na amostra de SP (Santos et al., 2011), o que torna as folhas o componente
2112 morfológico do pasto de melhor valor nutritivo, e os demais apresentam características
2113 qualitativas limitantes (Santos et al., 2008). Quando existe a necessidade de crescimento da
2114 planta, as estruturas da parede celular são incrementadas, pois as células aumentam de
2115 tamanho, a espessura da parede celular vai aumentando com a maturação do perfilhos,
2116 preparando assim as estruturas de sustentação para aguentar o peso dos componentes
2117 morfológicos e favorecer o arranjo espacial das plantas (Brett and Waldron, 1996).

2118

2119 **4.3.3 | Proteína Bruta (PB)**

2120 A diferença significativa do teor de PB da SP de janeiro a março observados em pastos
2121 com diferentes taxas de lotação indica que quando a UA ha⁻¹ são maiores o resultado é a
2122 maior renovação de tecidos em pastos mais baixo, resultados de senescência e aparecimento
2123 de perfilhos que ocorrem sob lotação contínua, assim, tecidos mais jovens possuem maiores
2124 teores de PB. As folhas maiores em dosséis mais altos podem gerar maior diluição do N

2125 captado pela planta em quantidades maiores de tecidos. Moreira et al. (2011) encontraram
2126 teores de 8,33 e 8,28% de PB na *Brachiaria decumbens* sem adubação no primeiro ano e com
2127 adubação de 150 kg de N, observaram teores de 11,43 e 10,96% de PB. Bittencourt and Veiga
2128 (2001) no verão encontraram valores de 4,8% de PB e no inverno de 5,3%, valores abaixo dos
2129 observados no presente trabalho, devido ao ano ter tido menor precipitação (Figura 1).

2130 Os teores de PB da SP ficaram abaixo ou próximo do valor limite crítico para o
2131 adequado funcionamento do rúmen, que seria na faixa de 6 a 7 % de PB para forrageiras
2132 tropicais (Minson, 1990), podendo resultar em efeitos prejudiciais ao desempenho dos
2133 animais.

2134

2135 **4.3.4 | Digestibilidade *in vitro* da matéria seca (DIVMS)**

2136 Altas taxas de lotação proporcionaram menores DIVMS da simulação de pastejo, o
2137 que não está de acordo, pois esses seriam perfilhos mais novos e com menores teores de FDN
2138 e de FDA (Tabela 5), neste caso os teores de FDN e de FDA foram maiores nos pastos em
2139 que as lotações foram maiores. Moreira et al. (2011) no primeiro ano de pastejo de *Brachiaria*
2140 *decumbens* DIVMS de 81,49 sem adubação e 73,10% com 153,9 kg de N ha⁻¹, no segundo
2141 ano não houve diferença com ou sem adubação, tendo teor médio de DIVMS de 70,88%.
2142 Relacionado ao ano, as médias maiores no primeiro ano são as condições climáticas melhores
2143 (Figura 1).

2144

2145 **4.4 | Desempenho animal**

2146 O GMD individual e por área obteve efeito significativo, demonstrando que o animal
2147 possui maior seleção de forragem de qualidade disponível uma vez que a lotação é pequena.
2148 As duas linhas de GMD individual e por área se cruzam (Figura 2) entre 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹,
2149 havendo a partir daí maior ganho por área e diminuição do ganho individual. Como relatado
2150 por Reis et al. (2009), fazer o uso de suplementos concentrados em sistema de pastejo pode
2151 propiciar acréscimos na taxa de lotação, permitindo elevar a produtividade do sistema de
2152 produção, além de reduzir a idade de abate dos animais, possibilitar maior capacidade de
2153 suporte e menor degradação do pasto. O que pode ser confirmado por Vaz et al. (2010) que
2154 concluem que avaliando fatores relacionados ao rendimento de carcaça de novilhos ou
2155 novilhas super jovens, terminados em pastagem cultivada, observaram que os novilhos são
2156 mais pesados, resultando um maior impulso de crescimento e uma melhor resposta animal
2157 com suplementação em pastagem cultivada comparado as fêmeas. Segundo Hammell and
2158 Laforest (2000) os machos consomem mais rápido o alimento e apresentam maior conversão

2159 alimentar, o que determina no fim, diferenças nos ganhos de peso 20% superiores, em média.
2160 Outra possível explicação dos altos ganhos obtidos no presente trabalho esta relacionada à
2161 adubação de N. Segundo Silva et al. (2015), o principal efeito do nitrogênio aplicado em
2162 pastagens consiste no aumento da produtividade de forragem, que deve refletir em aumento
2163 na taxa de lotação, sem alterar a pressão de pastejo.

2164 Euclides et al. (2009) observaram taxas de lotações de 2,7 e 1,3 UA ha⁻¹ do capim-
2165 marandu, do capim-piatã foram de 2,9 e 1,2 UA ha⁻¹ e do capim xaraés de 3,8 e 1,4 UA ha⁻¹
2166 no período das águas e seca, respectivamente. Os ganhos médios diários dos novilhos nessas
2167 cultivares foram de 740 e 315g no capim-marandu, de 770 e 385g no capim-piatã, de 675 e
2168 285g no capim-xaraés, nos períodos de águas e seca, respectivamente. Esses resultados foram
2169 em consequência da facilidade de seleção e prensão das folhas pelos animais em pastejo, e
2170 foi influenciada pelo colmo, durante o período das águas; e pelo material morto, durante o
2171 período seco, o que resultou em menor ingestão de forragem pelo animal e,
2172 consequentemente, menor ganho médio diário.

2173 Nantes et al. (2013) verificou o ganho por área de novilhos de 12 meses com peso
2174 médio de 220 kg pastejando capim-piatã submetidos a três alturas de pastejo (15,30 e 45 cm)
2175 no período das águas obtiveram ganhos médios de 1.050; 910 e 635kg de PV ha⁻¹ com taxas
2176 de lotações de 3,8; 3,1 e 2,4 UA ha⁻¹, respectivamente. O menor desempenho encontrado no
2177 presente trabalho não pode ser atribuído ao valor nutritivo, uma vez que os teores médios de
2178 PB e DIVMO registrados foram superiores (10,7 e 61,1%), dessa forma, eles atribuem os
2179 resultados as variações ocorridas na estrutura do dossel.

2180

2181 **4.5 | Estoque de Carbono no solo**

2182 Os estoques de COT, COp e COam após a o período experimental nas áreas
2183 submetidas à pastejo todas diminuíram, enquanto que área de vegetação nativa houve
2184 aumento nos estoque de C avaliados. Quando existe a interferência do homem nos
2185 ecossistemas nativos, existe uma quebra no equilíbrio dinâmico e, comumente, as entradas de
2186 C são diminuídas, refletindo na redução da quantidade e modificação da qualidade da MOS
2187 (Cerri et al., 2008). Assim, havendo eliminação da vegetação nativa e substituída por outra
2188 cobertura superficial produzem efeitos negativos no ciclo de C, por intermédio da perda de
2189 capacidade fotossintética na vegetação nativa e a liberação simultânea de elevadas
2190 quantidades de C acumuladas nos ecossistemas nativos ao longo do tempo (Costa et al.,
2191 2009).

2192 A atividade microbiana é alterada, devido à distribuição do material orgânico lábio é
2193 alterado em áreas que ocorre pastejo ou não, no entanto, em áreas em que a vegetação é
2194 nativa, os resíduos vegetais são mais bem distribuídos e menos decompostos pelos
2195 microrganismos, isso comparado a áreas em que os animais estão pastejando, o que resulta em
2196 favorecimento de acúmulo de C no solo (Souza et al., 2009). Diante disso, os estoques de
2197 carbono da vegetação nativa são maiores comparadas às áreas de pastejo, no entanto, a
2198 redução do estoque de C nas áreas pastejadas não foram muito expressivas de outubro a abril.
2199 Para Roscoe et al. (2006) as pastagens que foram implantadas em locais de vegetação nativa
2200 na região do Cerrado promovem a manutenção dos estoques de MOS, e aquelas submetidas a
2201 boas práticas de manejo, às vezes, permitem maior estocagem de C no solo do que sob a
2202 vegetação original.

2203 O IMC esta intimamente ligada à contribuição de resíduos vegetais no sistema
2204 (Gazolla et al., 2015), o que pode ter contribuído para maiores IMC da vegetação nativa em
2205 relação às áreas pastejadas, identificando a ação de intervenção animal nessas áreas.

2206

2207 **5 | CONCLUSÃO**

2208 A produção em quantidade e qualidade do capim-marandu manejado sob lotação
2209 contínua de 2,4 a 3,2 UA ha⁻¹ na estação chuvosa refletiu em melhor desempenho animal
2210 tanto individual quanto por área sem prejudicar a planta com adubação nitrogenada de 150 kg
2211 de N ha⁻¹ ano⁻¹, além de ser um manejo de pastagem que indicaram maior contribuição na
2212 diminuição do efeito estufa devido aos estoques de carbono do solo.

2213 Utilizar a taxa de lotação entre 2,4 e 3,2 UA ha⁻¹ sob lotação contínua proporcionou
2214 ganhos individuais acima de 0,650 kg e próximos de 5 kg de ganho de peso por área,
2215 demonstrando ai o equilíbrio entre ganho de peso individual e por área no período das águas
2216 recebendo suplemento proteico energético e adubação de manutenção de 150 kg de N ha⁻¹
2217 ano⁻¹.

2218

2219 **REFERÊNCIAS**

2220 AGULHON, R. A.; JOBIM, C. C.; BRANCO, A. F.; DIAS, F. J. Valor nutritivo da massa de
2221 forragem ofertada em uma pastagem de capim-Marandu (*Urochloa brizantha* (Hochst. ex A.
2222 Rich.) Webster var Marandu) sob pastejo no inverno. **Acta Scientiarum. Animal Sciences**,
2223 v. 26, n. 2, p. 265-272, 2004.

- 2224 ALENCAR, C. A. B.; OLIVEIRA, R. A.; CÓSER, A. C.; MARTINS, C. E.; CUNHA, F. F.;
2225 FIGUEIREDO, J. L. A.; CECON, P. R.; LEAL, B. G. Valor nutritivo de gramíneas
2226 forrageiras tropicais irrigadas em diferentes épocas do ano. **Pesquisa Agropecuária**
2227 **Tropical**, v. 40, n. 1, p. 20-27, 2010.
- 2228 BARBOSA, F. A.; GRAÇA, D. S.; GUIMARÃES, P. H. S.; SILVA JÚNIOR, F. V. Análise
2229 econômica da suplementação protéico-energética de novilhos durante o período de transição
2230 entre água-seca. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 60, n. 4, p.
2231 911-916, 2008.
- 2232 BARBOSA, J. C. and MALDONADO JÚNIOR, W. **Software AgroEstat**: Sistema de
2233 análises estatísticas de ensaios agrônômicos. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de
2234 Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de Jaboticabal, Brasil, 2009.
- 2235 BARBOSA, M. A. A. F.; CASTRO, L. M.; BARBERO, R. P.; BRITO, V. C.; MIORIN, R.
2236 L.; SILVA, L. D. F.; RIBEIRO, E. L. A.; MIZUBUTI, I. Y. Desempenho de bovinos de corte
2237 em pastos de *Brachiaria brizantha* cv. Xaraés manejados em diferentes alturas de pastejo.
2238 **Semina**: Ciências Agrárias, v. 34, n. 6, p. 4133-4144, 2013.
- 2239 BITTENCOURT, P. C. S. and VEIGA, J. B. Avaliação das pastagens de *Brachiaria brizantha*
2240 cv. Marandu em propriedades leiteiras de Uruará, região da Transamazônica, **Pastures**
2241 **Tropicales**, v. 23, n. 2, p. 2-9, 2001.
- 2242 BLAIR, G. J.; LEFROY, R. D. B.; LISLE, L. Soil carbon fractions based on their degree of
2243 oxidation, and the development of a carbon management index for agricultural systems.
2244 **Australian Journal of Agricultural Research**, v. 46, n. 7, p. 1459-1460, 1995.
- 2245 BRÂNCIO, P. A.; NASCIMENTO JUNIOR, D.; EUCLIDES, V. P. B.; FONSECA, D. M.;
2246 ALMEIDA, R. G.; MACEDO, M. C. M.; BARBOSA, R. A. Avaliação de três cultivares
2247 de *Panicum maximum* Jacq. sob pastejo: composição da dieta, consumo de matéria seca e
2248 ganho de peso animal. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 32, n. 5, p. 1037-1044, 2003.
- 2249 BRETT, C. and WALDRON, K. **Physiology and Biochemistry of Plant Cell Walls**. 2 ed.
2250 London: Chapman & Hall, 1996. p. 76-111.
- 2251 CANO, C. C. P.; CECATO, U.; CANTO, M. W.; RODRIGUES, A. B.; JOBIM, C. C.;
2252 RODRIGUES, A. M.; GALBEIRO, S.; NASCIMENTO, W. G. Produção de forragem do
2253 capim-tanzânia (*Panicum maximum* Jacq. cv. Tanzânia⁻¹) pastejado em diferentes alturas.
2254 **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 33, n. 6, p. 1949-1958, 2004.

- 2255 CARVALHO, P. C. F.; PRACHE, S.; DAMASCENO, J. C. O processo do pastejo: desafios
2256 da procura e apreensão da forragem pelo herbívoro. In: REUNIÃO ANUAL DA
2257 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 36., 1999, Porto Alegre. **Anais...** Porto
2258 Alegre: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1999. p.253-268.
- 2259 CERRI, C. E. P.; FEIGL, B.; CERRI, C. C. Dinâmica da matéria orgânica do solo na
2260 Amazônia. In: SANTOS, G. A.; SILVA, L. S.; CANELLAS, L. P.; CAMARGO, F. O. (Ed.).
2261 **Fundamentos da matéria orgânica do solo: ecossistemas tropicais e subtropicais.** 2.ed. rev.
2262 atual. Porto Alegre: Metrópole, 2008. p. 325-358.
- 2263 COSTA, K. A. P.; ROSA, B.; OLIVEIRA, I. P.; PETTERSEN, D.; SILVA, D. C. Efeito da
2264 estacionalidade na produção de matéria seca e composição bromatológica da *Brachiaria*
2265 *brizantha* cv. Marandu. **Ciência Animal Brasileira**, v. 6, n. 3, p. 187-193, 2005.
- 2266 COSTA, O. V.; CANTARUTTI, R. B.; FONTES, L. E. F.; COSTA, L. M.; NACIF, P. G. S.;
2267 FARIA, J. C. Estoque de carbono do solo sob pastagem em área de Tabuleiro Costeiro no sul
2268 da Bahia. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 33, p. 1137-1145, 2009.
- 2269 DA SILVA, S. C. Fundamentos para manejo do pastejo de plantas forrageiras dos gêneros
2270 *Brachiaria* e *Panicum*. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO ESTRATÉGICO DA
2271 PASTAGEM, 2., 2004, Viçosa. **Anais...** Viçosa: UFV, 2004. p.347-385.
- 2272 DEREGIBUS, V. A.; SANCHEZ, R. A.; CASAL, J. J. Effects of light quality on tiller
2273 production in *Lolium* spp. **Plant Physiology**, v. 72, n. 3, p. 900-902, 1983.
- 2274 DETMANN, E.; SOUZA, M.A.; VALADARES FILHO, S. C.; QUEIROZ, A. C.;
2275 BERCHIELLI, T. T.; SALIBA, E. O. S.; CABRAL, L. S.; PINA, D. S.; LADEIRA, M. M.;
2276 AZEVEDO, J. A. G. (2012). (Ed.). **Métodos para análise de alimentos.** Visconde do Rio
2277 Branco: Suprema.
- 2278 DIFANTE, G. S.; EUCLIDES, V. P. B.; NASCIMENTO JÚNIOR, D.; DA SILVA, S. C.;
2279 TORRES JUNIOR, R. A. A.; SARMENTO, D.O. L. Ingestive behaviour, herbage intake and
2280 grazing efficiency of beef cattle steers on tanzânia guineagrass subjected to rotational
2281 stocking managements. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 38, p. 1001-1008, 2009.
- 2282 DIFANTE, G. S.; EUCLIDES, V. P. B.; NASCIMENTO JÚNIOR, D.; DA SILVA, S. C.;
2283 BARBOSA, R. A.; TORRES JÚNIOR, R. A. A. Desempenho e conversão alimentar de
2284 novilhos de corte em capim-tanzânia submetido a duas intensidades de pastejo sob lotação
2285 rotativa1. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 39, n. 1, p. 33-41, 2010.

- 2286 DIFANTE, G. S.; NASCIMENTO JUNIOR, DOMICIO DO; SILVA, S. C. ; EUCLIDES, V.
2287 P. B.; MONTAGNER, D. B.; SILVEIRA, M. C. T.; PENA, K. S. Características
2288 morfológicas e estruturais do capim-marandu submetido a combinações de alturas e
2289 intervalos de corte. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, n. 5, p. 955-963, 2011.
- 2290 EUCLIDES, V. P. B.; MACEDO, M. C. M.; VALLE, C. B.; BARBOSA, R. A.;
2291 GONÇALVES, W. V. Produção de forragem e características da estrutura do dossel de
2292 cultivares de *Brachiaria brizantha* sob pastejo. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, n. 43, v.
2293 12, p. 1805-1812, (2008).
- 2294 EUCLIDES, V. P. B.; MACEDO, M. C. M.; VALLE, C. B.; DIFANTE, G. S.; BARBOSA,
2295 R. A.; CACERE, E. R. Valor nutritivo da forragem e produção animal em pastagens de
2296 *Brachiaria brizantha*, **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 44, n. 1, p. 98-106,
2297 2009.
- 2298 EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; MACEDO, M. C. M.; ARAÚJO, A. R.;
2299 DIFANTE, G. S.; BARBOSA, R. A. Grazing intensity affects forage accumulation and
2300 persistence of Marandu palisadegrass in the Brazilian savannah. **Grass and Forage Science**,
2301 v. 74, n. 3. P. 450-462, 2019.
- 2302 FAGUNDES, J. L.; FONSECA, D. M.; MISTURA, C.; MORAIS, R. V.; VITOR, C. M. T.;
2303 GOMIDE, J. A.; DOMICIO, N. J.; CASAGRANDE, D. R.; COSTA, L. T. Características
2304 morfológicas e estruturais do capim-braquiária em pastagem adubada com nitrogênio
2305 avaliadas nas quatro estações do ano. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 35, p. 21-29, 2006.
- 2306 FLORES, R. S.; EUCLIDES, V. P. B.; ABRAO, M. P. C.; GALBEIRO, S.; DIFANTE, G. S.;
2307 BARBOSA, R. A. Desempenho animal, produção de forragem e características estruturais dos
2308 capins marandu e xaraés submetidos a intensidades de pastejo. **Revista Brasileira de**
2309 **Zootecnia**, v. 37, n. 8, p. 1355-1365, 2008.
- 2310 FORBES, T. D. A. and HODGSON, J. Comparative studies of the influence of sward
2311 conditions on the ingestive behaviour of cows and sheep. **Grass and Forage Science**, v. 40,
2312 p. 69-77, 1985.
- 2313 GARCEZ NETO, A. F.; NASCIMENTO JUNIOR, D.; REGAZZI, A. J.; FONSECA, D. M.;
2314 MOSQUIM, P. R.; GOBBI, K. F. Respostas morfológicas e estruturais de *Panicum maximum*
2315 cv. mombaça sob diferentes níveis de adubação nitrogenada e alturas de corte. **Revista**
2316 **Brasileira de Zootecnia**, Viçosa, v. 31, n. 5, p. 1890-1900, 2002.

- 2317 GAZOLLA, P. R.; FERNANDES GUARESCHI, R.; PERIN, A.; GERVASIO PEREIRA,
2318 M.; QUEIROZ ROSSI, C. Frações da matéria orgânica do solo sob pastagem, sistema plantio
2319 direto e integração lavoura-pecuária. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 36, n. 2, p. 693-704,
2320 2015.
- 2321 HAMMELL, K. L. and LAFOREST, J. P. Evaluation of the growth performance and carcass
2322 characteristics of lambs produced in Quebec. **Canada Journal of Animal Science**, n. 80, p.
2323 25-33, 2000.
- 2324 HODGSON, J. **Grazing management: science into practice**. Hong Kong: Longman
2325 Scientific & Technical, 1990. 203 p.
- 2326 ÍTAVO, L. C. V.; ÍTAVO, C. C. B. F.; DIAS, A. M.; NOVAIS, M. F. S. M.; SILVA, F. F.;
2327 MATEUS, R. G.; SCHIO, A. R. Desempenho produtivo e avaliação econômica de novilhos
2328 suplementados no período seco em pastagens diferidas, sob duas taxas de lotação. **Revista**
2329 **Brasileira de Saúde e Produção Animal**, v. 8, n. 3, p. 229-238, 2007.
- 2330 ÍTAVO, L. C. V.; SOARES, C. M.; ÍTAVO, C. C. B. F.; DIAS, A. M.; PETIT, H. V.; LEAL,
2331 E. S.; SOUZA, A. D. V. Calorimetry, chemical composition and *in vitro* digestibility of
2332 oilseeds. **Food Chemistry**, v. 185, p. 219-225, 2015.
- 2333 JEWISS, O. R. **Morphological and physiological aspects of the growth of grasses during**
2334 **the vegetative phase**. In: The growth of cereal and grasses, 12, London, 1972. Proceeding of
2335 the twelfth Easter School in Agricultural Science. London: MILTHORPE F. L.; IVINS J. D.,
2336 1972. p. 39-56, 1972.
- 2337 KÖPPEN, W. **Climatologia: con un estudio de los climas de la tierra**. México: Fondo de
2338 Cultura Económica, 1948. 478p.
- 2339 MACHADO, L. A. Z.; FABRÍCIO, A. C.; GOMES, A.; ASSIS, P. G. G.; LEMPP, B.;
2340 MARASCHIN, G. E. Desempenho de animais alimentados com lâminas foliares, em
2341 pastagem de capim-marandu. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 43, n. 11, p. 1609-1616,
2342 2008.
- 2343 MATTHEW, C.; VAN LOO, E. N.; THOM, E. R.; DAWSON, L. A. **Understanding shoot**
2344 **and root development**. In: GOMIDE, J. A. (Ed.). Proceedings of the XIX International
2345 Grassland Congress. Piracicaba: FEALQ, 2001. p. 19-27.
- 2346 MINSON, D. J. **Forage in ruminant nutrition**. San Diego: Academic Press, 1990, 483p.

- 2347 MOREIRA, L. M.; SANTOS, M. E. R.; FONSECA, D. M.; MARTUSCELLO, J. A.;
2348 MORAIS, R. V.; MISTURA, C. Produção animal em pastagem de capim-braquiária adubada
2349 com nitrogênio. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 63, n. 4, p.
2350 914-921, 2011.
- 2351 NANTES, N. N.; EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; LEMPP, B.; BARBOSA, R.
2352 A.; GOIS, P. O. Desempenho animal e características de pastos de capim-piatã submetidos a
2353 diferentes intensidades de pastejo. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 48, p. 114-121,
2354 2013.
- 2355 NAVE, R. L. G. PEDREIRA, C. G. S.; LIMA, C. G. Canonical correlations among chemical,
2356 physical and morphological characteristics of Xaraés palisadegrass under rotational grazing.
2357 **Science Agricola**, 2009, v. 66, n. 2, p. 270-275.
- 2358 PALHANO, A. L.; CARVALHO, P. C. F.; DITTRICH, J. R.; MORAES, A.; BARRETO, M.
2359 Z.; DOS SANTOS, M. C. F. Estrutura da pastagem e padrões de desfolhação em capim-
2360 mombaça em diferentes alturas do dossel forrageiro. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 34,
2361 n. 6, p. 1860-1870, 2005.
- 2362 PAULA, C. C. L.; EUCLIDES, V. P. B.; LEMPP, B.; BARBOSA, R. A.; MONTAGNER, D.
2363 B.; CARLOTO, M. N. Acúmulo de forragem, características morfogênicas e estruturais do
2364 capim-marandu sob alturas de pastejo. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 42, n. 11, p. 2059-
2365 2065, 2012b.
- 2366 PAULA, C. C. L.; EUCLIDES, V. P. B.; MONTAGNER, D. B.; LEMPP, B.; DIFANTE, G.
2367 S.; CARLOTO, M. N. Estrutura do dossel, consumo e desempenho animal em pastos de
2368 capim-marandu sob lotação contínua. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e**
2369 **Zootecnia**, v. 64, n. 1, p. 169-176, 2012a.
- 2370 PREMAZZI, L. M.; MONTEIRO, F. A.; CORRENTE, J. E. Perlhamento em Capim bermuda
2371 cv. Tifton 85 em resposta a doses e ao momento de aplicação do nitrogênio após o corte.
2372 **Scientia Agrícola**, Piracicaba, v. 60, n. 3, p. 565-571, 2003.
- 2373 REIS, R. A.; RUGGIERI, A. C.; CASAGRANDE, D. R.; PASCOA, A. G. Suplementação da
2374 dieta de bovinos de corte como estratégia do manejo das pastagens. **Revista Brasileira de**
2375 **Zootecnia**, v. 38, p. 147-159, 2009.

- 2376 REIS, R. A.; RUGGIERI, A. C.; OLIVEIRA, A. A.; AZENHA, M. V.; CASAGRANDE, D.
2377 R. Suplementação como estratégia de produção de carne de qualidade em pastagens tropicais.
2378 **Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal**, v. 13, n. 3, p. 642-655, 2012.
- 2379 ROSCOE, R.; BODDEY, R. M.; SALTON, J. C. Sistemas de manejo e matéria orgânica do
2380 solo. In: ROSCOE, R.; MERCANTE, F. M.; SALTON, J. C. (Org.). **Dinâmica da matéria**
2381 **orgânica do solo em sistemas conservacionistas**: modelagem matemática e métodos
2382 auxiliares. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2006. p. 17-41.
- 2383 SANTOS, M. E. R.; FONSECA, D. M.; BALBINO, E. M.; MONNERAT, J. P. I. S.; SILVA,
2384 S. P. Capim-braquiária diferido e adubado com nitrogênio: produção e características da
2385 forragem. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 38, n. 4, p. 650-656, 2009.
- 2386 SANTOS, M. E. R.; FONSECA, D. M.; EUCLIDES, V. P. B.; RIBEIRO JUNIOR, J. L.;
2387 BALBINO, E. M.; CASAGRANDE, D. Valor nutritivo da forragem e de seus componentes
2388 morfológicos em pastagens de *Brachiaria decumbens* diferida. **Revista Brasileira de**
2389 **Zootecnia**, v. 65, n. 4, p. 303-311, 2008.
- 2390 SANTOS, M. E. R.; FONSECA, D. M.; MAGALHÃES, M. A.; SILVA, S. P.;
2391 CASAGRANDE, D. R.; BALBINO, E. M.; GOMES, V. M. Estrutura e valor nutritivo do
2392 pasto diferido de *Brachiaria decumbens* cv. Basilisk durante o período de pastejo. **Revista**
2393 **Brasileira de Agropecuária Sustentável**. v. 1, n. 1, p. 117-128, 2011.
- 2394 SILVA, A. A. S.; FONSECA, D. M.; SANTOS, M. E. R.; SOUSA, B. M. L.; GOMES, V.
2395 M.; CANTARUTTI, R. B. Initial height and nitrogen fertilization on deferred Signalgrass.
2396 **Bioscience Journal** (Online), v. 31, p. 1671-1681, 2015.
- 2397 SOUZA, E. D.; COSTA, S. E. V. G.A.; ANGHINONI, I.; CARVALHO, P. C. F.;
2398 ANDRIGUETI, M.; CAO, E. Estoques de carbono orgânico e de nitrogênio no solo em
2399 sistema de integração lavoura-pecuária em plantio direto, submetido a intensidades de pastejo.
2400 **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 33, p. 1829-1836, 2009.
- 2401 TRINDADE, J. K.; DA SILVA, S. C.; SOUZA JÚNIOR, S. J.; GIACOMINI, A. A.;
2402 ZEFERINO, C. V.; GUARDA, V. D.; CARVALHO, P. C. F. Composição morfológica da
2403 forragem consumida por bovinos de corte durante o rebaixamento do capim-marandu
2404 submetido a estratégias de pastejo rotativo. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 42, p. 883-
2405 890, 2007.

- 2406 VAZ, F. N.; RESTLE, J.; ARBOITTE, M. Z.; PASCOAL, L. L.; FATURI, C.; JONER, G.
2407 Fatores relacionados ao rendimento da carcaça de novilhos ou novilhas superjovens,
2408 terminados em pastagem cultivada. **Ciência Animal Brasileira**, v. 11, n. 1, p. 53-61, 2010.
- 2409 VITOR, C. M. T.; FONSECA, D. M.; CÓSER, A. C.; MARTINS, C. E.; NASCIMENTO
2410 JÚNIOR, D.; RIBEIRO JÚNIOR, J. I. Produção de matéria seca e valor nutritivo de pastagem
2411 de capim-elefante sob irrigação e adubação nitrogenada. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.
2412 38, n. 3, p. 435-442, 2009.
- 2413 YEOMANS, J. C.; BREMNER, J. M. A rapid and precise method for routine determination
2414 of organic carbon in soil. **Communications in Soil Science and Plant Analysis**, v. 19, n. 13,
2415 p. 1467-1476, 1988.

2416

2417

Figura 1. Temperaturas média, mínima e máxima e precipitação mensal durante o período experimental.

Tabela 1. Textura e teores de nutrientes do solo da área experimental da camada de 0-20 cm (setor bovinocultura de leite) da Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia UFMS antes do experimento (Setembro 2018) e final do experimento (Abril 2019).

Atributos	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)									
	0,8	1,6	2,4	3,2	Reserva	0,8	1,6	2,4	3,2	Reserva
	Antes do experimento					Final do experimento				
pH	6,0	5,7	6,0	5,5	5,6	6,2	6,2	6,2	6,1	5,6
V (%)	56,8	49,8	55,0	45,8	36,4	64,5	60,2	63,4	58,7	41,0
T (cmol _c /dm ³)	11,3	10,5	12,0	9,5	14,3	12,3	12,2	12,6	11,3	14,8
Argila (%)	63,0	66,0	65,0	66,0	53,0	66,5	66,5	68,0	66,5	54,5
MO (g/kg)	39,0	36,0	39,0	23,0	48,0	38,1	39,1	41,7	36,9	58,1
Macronutrientes										
P (mg/dm ³)	2,3	1,6	5,5	6,7	1,5	2,3	1,6	5,5	6,7	1,5
K (cmol _c /dm ³)	0,22	0,11	0,2	0,17	0,39	0,29	0,13	0,22	0,19	0,37
Ca (cmol _c /dm ³)	5,5	5,0	5,8	5,0	4,5	5,5	5,0	5,8	5,0	4,8
Mg (cmol _c /dm ³)	2,8	2,8	3,2	2,7	2,5	2,8	2,8	3,2	2,7	2,5
Al (cmol _c /dm ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H + Al (cmol _c /dm ³)	4,6	4,6	4,6	4,6	8,7	4,6	4,6	4,6	4,6	8,7

Análise Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO. pH: potencial hidrogeniônico (em água 1:2,5); V: % saturação de bases (100 S T-1); T: capacidade de troca catiônica (CTC a pH 7,0 [S+(H+Al)]); MO: matéria orgânica; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Al: alumínio; H: hidrogênio.

2419

Tabela 2. Estrutura do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	p-value	
	0,8	1,6	2,4	3,2		Linear	Quadrático
Período Outubro a Dezembro							
Altura (cm)	45,04	40,95	35,78	36,90	0,76	<0,01	0,0504
Densidade populacional de perfilhos (perfilhos m ²)	369	389	510	514	19,18	<0,01	0,3140
Massa Verde (kg ha ⁻¹)	8602,50	7776,04	6538,79	7685,00	190,77	0,0118	<0,01
Massa Seca Total (kg MS ha ⁻¹)	3172,79	2893,78	2739,79	3180,51	90,00	0,8675	0,0422
Massa seca total de folha (kg MS ha ⁻¹)	1369,46	1206,32	864,68	965,96	42,50	<0,01	0,0763
Massa seca total do colmo (kg MS ha ⁻¹)	998,24	916,94	702,66	954,07	48,75	0,4117	0,0802
Massa seca total do material morto (kg MS ha ⁻¹)	721,64	607,40	827,62	952,94	41,95	0,0113	0,1333
Relação Folha: colmo	2,00	1,64	1,49	1,15	0,13	0,0162	0,9644
Período de Janeiro a Março							
Altura (cm)	47,40	30,87	21,24	21,87	1,31	<0,01	<0,01
Densidade populacional de perfilhos (perfilhos m ²)	358	463	588	622	18,26	<0,01	0,3076
Massa Verde (kg ha ⁻¹)	13078,96	9156,25	7686,25	6279,17	350,68	<0,01	<0,01
Massa Seca Total (kg MS ha ⁻¹)	5807,05	4305,59	3376,53	3111,51	151,87	<0,01	<0,01
Massa seca total de folha (kg MS ha ⁻¹)	1450,62	805,81	797,93	512,75	43,88	<0,01	<0,01
Massa seca total do colmo (kg MS ha ⁻¹)	2261,85	1365,52	835,32	765,94	82,22	<0,01	<0,01
Massa seca total do material morto (kg MS ha ⁻¹)	2238,48	1756,66	1137,22	1395,93	75,70	<0,01	<0,01
Relação Folha: colmo	0,66	0,57	0,95	0,76	0,03	<0,01	0,2250

2420 Efeito significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).

2421

2422

Tabela 3. Composição química do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	p-value	
	0,8	1,6	2,4	3,2		Linear	Quadrático
Período Outubro a Dezembro							
Matéria seca da folha (%)	32,28	31,86	30,79	31,43	0,48	0,3919	0,5790
Matéria seca do colmo (%)	29,14	28,71	28,12	28,64	0,36	0,5107	0,4998
Matéria seca do material morto (%)	58,81	63,02	65,73	64,20	0,61	<0,01	<0,01
Matéria orgânica da folha (%)	92,19	92,14	90,95	91,44	0,09	<0,01	0,0498
Matéria orgânica do colmo (%)	93,35	93,04	92,81	93,79	0,12	0,2849	<0,01
Matéria orgânica do material morto (%)	93,40	92,98	93,83	93,27	0,17	0,7661	0,8271
Período de Janeiro a Março							
Matéria seca da folha (%)	35,77	31,90	24,95	27,32	0,59	<0,01	<0,01
Matéria seca do colmo (%)	33,34	30,25	26,25	28,35	0,41	<0,01	<0,01
Matéria seca do material morto (%)	66,83	65,87	64,19	63,55	0,58	0,0228	0,8907
Matéria orgânica da folha (%)	91,43	90,91	90,35	89,79	0,12	<0,01	0,9095
Matéria orgânica do colmo (%)	93,93	93,15	91,98	93,24	0,15	<0,01	<0,01
Matéria orgânica do material morto (%)	92,29	92,78	92,49	93,09	0,08	<0,01	0,7023

2423 Efeito significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).

2424

2425

Tabela 4. Teores médios de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) e digestibilidade *in vitro* da massa seca da folha e do colmo do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	p-value	
	0,8	1,6	2,4	3,2		Linear	Quadrático
Período Outubro a Dezembro							
FDN folha (%)	69,48	69,94	69,19	69,84	0,45	0,9384	0,9206
FDN colmo (%)	78,18	77,39	77,59	77,04	0,45	0,4294	0,8996
FDA folha (%)	42,97	43,72	42,93	43,73	0,53	0,7525	0,9748
FDA colmo (%)	55,27	54,36	54,69	53,86	0,80	0,5871	0,9748
PB folha (%)	5,10	5,90	7,71	7,81	0,26	<0,01	0,4316
PB colmo (%)	2,70	2,93	3,45	3,44	0,11	<0,01	0,5450
DIVMS folha (%)	67,02	65,85	66,30	66,27	0,69	0,7700	0,6811
DIVMS colmo (%)	42,82	44,31	41,25	43,97	19,18	0,4916	0,5399
Período de Janeiro a Março							
FDN folha (%)	72,49	72,27	69,43	69,44	0,44	<0,01	0,8851
FDN colmo (%)	83,47	82,60	78,41	79,11	0,48	<0,01	0,3509
FDA folha (%)	42,97	41,79	42,56	41,87	0,58	0,6247	0,8343
FDA colmo (%)	63,43	58,91	56,75	53,92	0,69	<0,01	0,4697
PB folha (%)	5,28	7,55	10,84	11,99	0,34	<0,01	0,1447
PB colmo (%)	1,99	2,43	4,83	4,48	0,16	<0,01	0,0502
DIVMS folha (%)	66,25	67,46	68,41	72,60	0,75	<0,01	0,2946
DIVMS colmo (%)	46,58	46,22	48,33	47,76	14,82	0,6266	0,6578

2426 FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente ácido; PB: proteína bruta; DIVMS: digestibilidade *in vivo* da matéria seca. Efeito
 2427 significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).
 2428

2429

Tabela 5. Matéria seca e matéria orgânica da simulação de pastejo do pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	Linear	p-value Quadrático
	0,8	1,6	2,4	3,2			
Período Outubro a Dezembro							
Matéria seca (%)	34,17	34,33	36,09	38,69	0,45	<0,01	0,1986
Matéria orgânica (%)	93,20	92,29	91,51	91,95	0,10	<0,01	<0,01
FDN (%)	69,06	70,03	69,76	71,04	0,31	0,0935	0,9748
FDA (%)	38,83	40,61	41,50	43,80	0,46	<0,01	0,7919
PB (%)	5,66	5,73	6,67	6,06	0,12	0,0607	0,1761
DIVMS (%)	61,50	61,35	66,01	59,62	0,65	0,8747	0,0295
Período de Janeiro a Março							
Matéria seca (%)	33,60	35,89	35,99	41,09	0,53	<0,01	0,1206
Matéria orgânica (%)	92,14	91,57	92,18	92,76	0,09	<0,01	<0,01
FDN (%)	71,64	74,48	74,00	78,29	0,40	<0,01	0,2567
FDA (%)	42,89	47,08	47,76	54,52	0,61	<0,01	0,1369
PB (%)	5,00	5,05	6,53	5,45	0,13	<0,01	0,0120
DIVMS (%)	59,41	56,19	56,20	51,57	0,61	<0,01	0,5102

2430 FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente ácido; PB: proteína bruta; DIVMS: digestibilidade in vivo da matéria seca. Efeito
 2431 significativo pelo teste de Tukey ($p \leq 0,01$).

2432

2433

Tabela 6. Desempenho de novilhos em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação animal sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				EPM	p-value	
	0,8	1,6	2,4	3,2		Linear	Quadrático
TLi (UA ha ⁻¹)	0,8	1,7	2,7	3,6	0,11	<0,01	0,4087
TLf (UA ha ⁻¹)	1,4	2,8	4,4	5,5	0,16	<0,01	<0,01
GMD individual (kg dia ⁻¹)	0,867	0,786	0,779	0,657	0,01	<0,01	0,1825
GMD por área (kg ha ⁻¹ dia ⁻¹)	1,630	2,960	4,410	4,950	0,14	<0,01	<0,01
GPT individual (kg)	150,83	136,75	135,61	114,25	1,67	<0,01	0,1839
GPT área (kg ha ⁻¹)	284,59	516,03	753,87	862,26	24,10	<0,01	<0,01

2434 TLi: taxa de lotação inicial; TLf: taxa de lotação final; GMD: ganho de peso vivo médio; GPT: ganho de peso vivo total. Efeito significativo pelo
 2435 teste de Tukey ($p \leq 0,01$).

2436

2437

Tabela 7. Valores médios dos teores de carbono orgânico total (COT), carbono orgânico particulado (COp) e carbono orgânico associado aos minerais (COam), na camada 0-20 cm em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				Vegetação nativa	Teste F	Média	CV (%)
	0,8	1,6	2,4	3,2				
Outubro 2018								
COT (g kg ⁻¹)	21,59 b	20,04 b	20,99 b	21,59 b	29,94 a	27,50**	22,83	8,24
COp (g kg ⁻¹)	3,24 b	2,55 b	2,69 b	2,87 b	4,65 a	15,03**	3,20	16,83
COam (g kg ⁻¹)	18,35 b	17,50 b	18,30 b	18,72 b	25,29 a	12,62**	19,63	11,22
Abril 2019								
COT (g kg ⁻¹)	20,02 b	18,24 b	19,20 b	21,12 b	30,03 a	51,03**	21,72	7,52
COp (g kg ⁻¹)	2,28 b	1,67 b	2,06 b	1,82 b	6,03 a	62,68**	2,77	20,49
COam (g kg ⁻¹)	17,74 c	16,57 c	17,14 c	19,30 b	24,01 a	27,90**	18,95	7,35

Pelo teste F, ** significativo ($p \leq 0,01$). Médias seguidas pela mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott ($p \leq 0,05$).

2438

2439

Tabela 8. Valores médios dos estoques de carbono orgânico total (Est. COT), carbono orgânico particulado (Est. COp), carbono orgânico associado aos minerais (Est. COam), e, índice de manejo de carbono (IMC), na camada 0-20 cm em pasto de capim-marandu com diferentes taxas de lotação de novilhos sob lotação contínua no Bioma Cerrado.

Variáveis	Taxa de lotação (UA ha ⁻¹)				Vegetação nativa	Teste F	Média	CV (%)
	0,8	1,6	2,4	3,2				
Outubro 2018								
Est. COT (t ha ⁻¹)	27,99 c	28,74 c	34,10 b	34,93 b	43,04 a	28,04**	33,76	8,28
Est. COp (t ha ⁻¹)	4,20 b	3,65 b	4,37 b	4,64 b	6,68 a	13,30**	4,71	16,57
Est. COam (t ha ⁻¹)	23,79 c	25,09 c	29,74 b	30,29 b	36,36 a	13,94**	29,05	11,22
IMC	62,70 b	53,19 c	63,57 b	67,87 b	100,00 a	25,74**	69,47	12,43
Abril 2019								
Est. COT (t ha ⁻¹)	25,95 d	26,16 d	31,20 c	34,17 b	43,18 a	51,21**	32,13	7,55
Est. COp (t ha ⁻¹)	2,96 b	2,39 b	3,34 b	2,95 b	8,66 a	51,27**	4,06	21,85
Est. COam (t ha ⁻¹)	23,00 d	23,76 b	27,85 c	31,22 b	34,51 a	33,45**	28,07	7,38
IMC	30,80 b	24,56 b	35,33 b	29,88 b	100,00 a	58,58**	44,11	22,84

Pelo teste F, ** significativo ($p \leq 0,01$). Médias seguidas pela mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott ($p \leq 0,05$).

2440

2441

2442

Figura 2. Relação entre lotação animal (X), ganho de peso individual (Y) e ganho de peso por área (Z).

Normas para os autores Revista Grass and Forage Science

Author Guidelines

1. SUBMISSION

Authors should kindly note that submission implies that the content has not been published or submitted for publication elsewhere except as a brief abstract in the proceedings of a scientific meeting or symposium.

Once the submission materials have been prepared in accordance with the Author Guidelines, manuscripts should be submitted online at <http://mc.manuscriptcentral.com/gfs>.

The submission system will prompt authors to use an ORCID iD (a unique author identifier) to help distinguish their work from that of other researchers. [Click here](#) to find out more.

[Click here](#) for more details on how to use [ScholarOne Manuscripts](#).

For help with submissions, please contact: GFSeditorialoffice@wiley.com.

Data Protection

By submitting a manuscript to or reviewing for this publication, your name, email address, and affiliation, and other contact details the publication might require, will be used for the regular operations of the publication, including, when necessary, sharing with the publisher (Wiley) and partners for production and publication. The publication and the publisher recognize the importance of protecting the personal information collected from users in the operation of these services, and have practices in place to ensure that steps are taken to maintain the security, integrity, and privacy of the personal data collected and processed. You can learn more at <https://authorservices.wiley.com/statements/data-protection-policy.html>.

2. AIMS AND SCOPE

Grass and Forage Science publishes the results of research and development in all aspects of grass and forage production, management and utilization, reviews of the state of knowledge on relevant topics and book reviews. Authors are also invited to submit papers on non-agricultural aspects of grassland management such as bioenergy, equine, recreational and amenity use and the environmental implications of all grassland systems. The Journal considers papers from all climatic zones. Originality is required in papers submitted for publication but this does not preclude the publication of material of a developmental nature.

As a guide to authors the Editors would make the following suggestions:

- Experiments that are sensitive to environmental interactions, such as quantitative measurements, must be repeated over time and/or space.
- Experiments that primarily describe the results of in vitro or controlled environment research should fully describe the conditions of the experiment and also the practical application of the research must be clear.

- Papers that describe the routine evaluation of new cultivars, inoculant strains, seed coatings or similar will not be considered unless a high level of novelty and broad impact can be demonstrated.

3. MANUSCRIPT CATEGORIES AND REQUIREMENTS

The main document must be uploaded as an editable Word document (.doc, .docx) with continuous line numbering at 1.5 line spacing. All tables, figures, supporting information and bibliographic entries must have a reference in the text. Tables should be included in the main document after the reference list, each on an individual page alongside their legend. A list of figure captions should be included at the end of the main document. Figures should not be included in the main document and should instead be uploaded as individual files.

Note: Authors submitting papers to *Grass and Forage Science* are strongly urged to read *An international terminology for grazing lands and grazing animals* by the Forage and Grazing Terminology Committee. The article should be used as a guide to the correct use of terminology in grazing studies, and can be accessed for free [here](#).

i. Original Articles

A full length research paper that describes novel research that is within the scope of Grass and Forage Science. There is no word limit for Original Articles which should be using the following general structure:

Manuscript structure: Abstract (250 words maximum); Keywords; Introduction; Materials and Methods; Results; Discussion; Conclusion (if applicable)*; Acknowledgements (if applicable); References.

ii. Short Communications

A short communication is a short paper that describes timely results from an experiment testing a novel hypothesis. The short communication is subject to the same review standards as an Original Article with the acknowledgment that the results may be more limited in scope or serve to prompt further research. A short communication may also be suitable for the publication of negative results. The format of the short communication is the same as an original article without additional subheadings, while Results & Discussion should be combined. As a guide a short communication should contain a total of no more than 5 tables and figures.

iii. Methods and Techniques Notes

A methods and techniques note is a paper that describes a new method or technique or a significant improvement in a recognised method. The paper should state the importance of the methodology to grassland or forage science and the situations in which it can be applied. Authors must provide sufficient details of methods and results (including controls, accuracy, precision) to allow the method to be assessed and repeated. Where possible the results of the new method or technology should be compared to existing methods.

Authors should make clear during submission whether the manuscript is to be considered for publication as a full paper, short communication, or methods and techniques note.

iv. Review Article

Full length review papers are welcomed.

Manuscript structure: Abstract (250 words maximum); keywords; Introduction; Content-appropriate headings; References

v. Book Reviews

Book reviews (1000 words maximum) may be commissioned by the Editor.

Manuscript structure: No specified structure.

4. PREPARING THE SUBMISSION

Cover Letters

Cover letters are not mandatory; however, they may be supplied at the author's discretion.

Parts of the Manuscript

The manuscript should be submitted in separate files: main text file including title page and tables; figures; supplementary files.

Main Text File

The text file should be presented in the following order:

- i. Title
- ii. A short running title of less than 40 characters
- iii. The full names of the authors
- iv. The author's institutional affiliations where the work was carried out, with a footnote for the author's present address if different from where the work was carried out
- v. The corresponding author and their contact email address.
- vi. Acknowledgments
- vii. Abstract and keywords
- viii. Main text
- ix. References
- x. Tables (each table complete with title and footnotes)
- xi. Figure legends
- xii. Appendices (if relevant). Figures and supporting information should be supplied as separate files.

Title. The title should be short and informative, containing major keywords related to the content. The title should not contain abbreviations (see [Wiley's best practice SEO tips](#)).

Authorship. For details on eligibility for author listing, please refer to the journal's Authorship policy outlined in the [Editorial Policies and Ethical Considerations](#) section.

Acknowledgements. Contributions from individuals who do not meet the criteria for authorship should be listed, with permission from the contributor, in an Acknowledgements section. Financial and material support should also be mentioned. Thanks to anonymous reviewers are not appropriate.

Conflict of Interest Statement. Authors will be asked to provide a conflict of interest statement during the submission process. See ‘Conflict of Interest’ section in [Editorial Policies and Ethical Considerations](#) for details on what to include in this section. Authors should ensure they liaise with all co-authors to confirm agreement with the final statement.

Abstract

Please provide an abstract of no more than 250 words containing the major keywords.

Keywords

Please provide up to six keywords.

Main Text

For information on structure of manuscripts, please view [Section 3. MANUSCRIPT CATEGORIES AND REQUIREMENTS](#).

If you are submitting an Original Article, please take note of the following additional advice pertaining to structure:

- **Introduction:** The Introduction of the paper should explain briefly the reasons for conducting the investigation and its nature: a full review of the literature is not necessary.
- **Materials and Methods:** The Materials and methods section of the paper should describe the experimental details so that the study could be repeated.
- **Results:** Experimental results should be presented in either tabular or diagrammatic form but not in both forms.
- **Discussion:** The Discussion of the results should conclude with a clear statement of their importance and application.

References

References should be prepared according to the Publication Manual of the American Psychological Association (6th edition). This means in text citations should follow the author-date method whereby the author's last name and the year of publication for the source should appear in the text, for example, (Jones, 1998), (Jones and Smith, 2000), (Jones et al, 2002).

Please note: For peer-review, authors should ensure they use the basic (name, year) method described above. However should a paper be accepted, the typesetters will ensure citations and references follow full APA style and so you may see some changes in citation format during proof stage. This is because according to APA style, citation format changes depending on the number of authors listed on the cited paper. More information on citation format can be found on the APA website.

The complete reference list should appear alphabetically by name at the end of the paper. A sample of the most common entries in reference lists appears below. Please note that a DOI should be provided for all references where available. For more information about APA referencing style, please refer to the [APA FAQ](#). Please note that for journal articles, issue numbers are not included unless each issue in the volume begins with page one.

Journal article

Beers, S. R. , & De Bellis, M. D. (2002). Neuropsychological function in children with maltreatment-related posttraumatic stress disorder. *The American Journal of Psychiatry*, 159, 483–486. doi:10.1176/appi.ajp.159.3.483

Book

Bradley-Johnson, S. (1994). *Psychoeducational assessment of students who are visually impaired or blind: Infancy through high school* (2nd ed.). Austin, TX: Pro-ed.

Internet Document

Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved from <http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs>

Tables

Tables should be self-contained and complement, not duplicate, information contained in the text. They should be supplied as editable files, not pasted as images. Legends should be concise but comprehensive – the table, legend, and footnotes must be understandable without reference to the text. All abbreviations must be defined in footnotes. Footnote symbols: †, ‡, §, ¶, should be used (in that order) and *, **, *** should be reserved for P-values. Statistical measures such as SD or SEM should be identified in the headings. Tables should be numbered consecutively with Arabic numerals and all must be referred to in the main text.

Figure Legends

Legends should be concise but comprehensive – the figure and its legend must be understandable without reference to the text. Include definitions of any symbols used and define/explain all abbreviations and units of measurement. Figures should be numbered consecutively with Arabic numerals and all must be referred to in the main text.

Figures

Although authors are encouraged to send the highest-quality figures possible, for peer-review purposes, a wide variety of formats, sizes, and resolutions are accepted. [Click here](#) for the basic figure requirements for figures submitted with manuscripts for initial peer review, as well as the more detailed post-acceptance figure requirements.

Figures submitted in colour may be reproduced in colour online free of charge. Please note, however, that it is preferable that line figures (e.g. graphs and charts) are supplied in black and white so that they are legible if printed by a reader in black and white. If an author would prefer to have figures printed in colour in hard copies of the journal, a fee will be charged by the Publisher.

Guidelines for Cover Submissions

If you would like to send suggestions for artwork related to your manuscript to be considered to appear on the cover of the journal, please follow these general guidelines: <https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Promotion/journal-cover-image.html>

Additional Files

Appendices

Appendices will be published after the references. For submission they should be supplied as separate files but referred to in the text.

Supporting Information

Supporting information is information that is not essential to the article, but provides greater depth and background. It is hosted online and appears without editing or typesetting. It may include tables, figures, videos, datasets, etc. [Click here](#) for Wiley's FAQs on supporting information.

Note: if data, scripts, or other artefacts used to generate the analyses presented in the paper are available via a publicly available data repository, authors should include a reference to the location of the material within their paper.

General Style Points

The following points provide general advice on formatting and style.

- **Abbreviations:** In general, terms should not be abbreviated unless they are used repeatedly and the abbreviation is helpful to the reader. Initially, use the word in full, followed by the abbreviation in parentheses. Thereafter use the abbreviation only. With regards to composition of fertilisers, the abbreviations N, P, P₂O₅, K and K₂O may be used without definition at the first occurrence, but P and K should not be used to indicate phosphorus and potassium quantities or contents calculated in P₂O₅ and K₂O respectively.
- **Units of measurement:** Measurements should be given in SI or SI-derived units. Visit the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) website at www.bipm.fr for more information about SI units. Proportions, rather than percentages, should be used except where there is a scientific convention to use percentages, e.g. cover and germination rate. The 24-hour clock should be used for time.
- **Numbers:** numbers under 10 are spelt out, except for: measurements with a unit (8mmol/l); age (6 weeks old), or lists with other numbers (11 dogs, 9 cats, 4 gerbils).
- **Trade Names:** Chemical substances should be referred to by the generic name only. Trade names should not be used. Drugs should be referred to by their generic names. If proprietary drugs have been used in the study, refer to these by their generic name, mentioning the proprietary name and the name and location of the manufacturer in parentheses.

Resource Identification Initiative

The journal supports the [Resource Identification Initiative](#), which aims to promote research resource identification, discovery, and reuse. This initiative, led by the [Neuroscience Information Framework](#) and the [Oregon Health & Science University Library](#), provides unique identifiers for antibodies, model organisms, cell lines, and tools including software and databases. These IDs, called Research Resource Identifiers (RRIDs), are machine-readable and can be used to search for all papers where a particular resource was used and to increase access to critical data to help researchers identify suitable reagents and tools.

Authors are asked to use RRIDs to cite the resources used in their research where applicable in the text, similar to a regular citation or Genbank Accession number. For antibodies, authors

should include in the citation the vendor, catalogue number, and RRID both in the text upon first mention in the Methods section. For software tools and databases, please provide the name of the resource followed by the resource website, if available, and the RRID. For model organisms, the RRID alone is sufficient.

Additionally, authors must include the RIIIDs in the list of keywords associated with the manuscript.

To Obtain Research Resource Identifiers (RRIDs):

1. Use the [Resource Identification Portal](#), created by the Resource Identification Initiative Working Group.
2. Search for the research resource (please see the section titled “Search Features and Tips” for more information).
3. Click on the “Cite This” button to obtain the citation and insert the citation into the manuscript text.

If there is a resource that is not found within the Portal, authors are asked to register the resource with the appropriate resource authority. Information on how to do this is provided in the “Resource Citation Guidelines” section of the Portal.

If any difficulties in obtaining identifiers arise, please contact rii-help@scicrunch.org for assistance.

Example Citations:

Antibodies: "Wnt3 was localized using a rabbit polyclonal antibody C64F2 against Wnt3 (Cell Signaling Technology, Cat# 2721S, RRID: AB_2215411)"

Model Organisms: "Experiments were conducted in *c. elegans* strain SP304 (RRID:CGC_SP304)"

Cell lines: "Experiments were conducted in PC12 CLS cells (CLS Cat# 500311/p701_PC-12, RRID:CVCL_0481)"

Tools, Software, and Databases: "Image analysis was conducted with CellProfiler Image Analysis Software, V2.0 (<http://www.cellprofiler.org>, RRID:nif-0000-00280)"

Wiley Author Resources

Manuscript Preparation Tips: Wiley has a range of resources for authors preparing manuscripts for submission available [here](#). In particular, authors may benefit from referring to Wiley’s best practice tips on [Writing for Search Engine Optimization](#).

Editing, Translation, and Formatting Support: [Wiley Editing Services](#) can greatly improve the chances of a manuscript being accepted. Offering expert help in English language editing, translation, manuscript formatting, and figure preparation, Wiley Editing Services ensures that the manuscript is ready for submission.